

Tableau 4.b. Nombre de mesures de prévention (parmi 7) systématiquement adoptées et évolutions selon les conditions de vie liées à l'épidémie de COVID-19 et au confinement (moyennes ; données pondérées). Source : *Enquête CoviPrev*, France métropolitaine, 2020

| | | Nombre de mesures de prévention (parmi 7) adoptées systématiquement ¹ | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Période de confinement | | | | | |
| Période de recueil des données | | 23-25 mars | 30 mars-1er avril | 14-16 avril | 20-22 avril | 28-30 avril | 4-6 mai |
| Numéro de vague d'enquête | | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
| Nombre de personnes interrogées | | 2000 | 2003 | 2010 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Conditions de vie liées à l'épidémie | | Moy. | Moy. | Moy. | Moy. | Moy. | Moy. |
| Nombre moyen (sur 7) de mesures adoptées systématiquement ¹ | | -- | 5,66 | 5,48 | 5,40 | 5,30 | 5,25 |
| Condition de travail | | | *** | ** | | | |
| | Inactifs et chômeurs | -- | 5,84 | 5,63 | 5,42 | 5,37 | 5,27 |
| | Actifs en télétravail | -- | 5,62 | 5,47 | 5,45 | 5,34 | 5,22 |
| | Actifs extérieur domicile | -- | 5,28 | 5,15 | 5,23 | 5,09 | 5,13 |
| | Actifs au chômage partiel | -- | 5,51 | 5,45 | 5,41 | 5,34 | 5,28 |
| | Actifs en arrêt de travail | -- | 5,76 | 5,45 | 5,63 | 5,30 | 5,49 |
| Logement avec forte promiscuité | | | | | * | | ** |
| | Non | -- | 5,68 | 5,50 | 5,44 | 5,32 | 5,29 |
| | Oui | -- | 5,40 | 5,21 | 5,07 | 5,01 | 4,81 |
| Logement avec un espace extérieur | | | *** | ** | *** | | |
| | Non | -- | 5,28 | 5,18 | 4,95 | 5,06 | 5,10 |
| | Oui | -- | 5,72 | 5,52 | 5,46 | 5,33 | 5,27 |
| Avoir un soutien moral ou affectif | | | *** | ** | *** | * | ** |
| | Non | -- | 5,49 | 5,37 | 5,23 | 5,19 | 5,13 |
| | Oui | -- | 5,77 | 5,57 | 5,54 | 5,39 | 5,35 |
| Avoir ou avoir eu un proche malade du COVID-19 ou ayant des symptômes | | | | | | ** | |
| | Non | -- | 5,67 | 5,46 | 5,39 | 5,23 | 5,20 |
| | Oui | -- | 5,60 | 5,52 | 5,45 | 5,48 | 5,36 |
| Avoir ou avoir eu des symptômes du COVID-19 | | | | | | | |
| | Aucun ou autres symptômes | -- | 5,64 | 5,49 | 5,42 | 5,30 | 5,24 |
| | Toux et/ou fièvre sans difficultés respiratoires | -- | 5,67 | 5,43 | 5,48 | 5,26 | 5,21 |
| | Au moins des difficultés respiratoire | -- | 5,92 | 5,25 | 5,06 | 5,41 | 5,49 |
| Durée quotidienne d'exposition aux médias sur le COVID-19 | | | | * | | ** | |
| | Moins d'1 heure | -- | 5,52 | 5,23 | 5,37 | 4,99 | 5,12 |
| | Entre 1 et 2 heures | -- | 5,57 | 5,53 | 5,43 | 5,24 | 5,27 |
| | Entre 3 et 4 heures | -- | 5,77 | 5,61 | 5,46 | 5,38 | 5,41 |
| | Plus de 4 heures par jour | -- | 5,69 | 5,45 | 5,35 | 5,46 | 5,19 |
| Recherche active d'informations sur le COVID-19 | | | *** | *** | * | *** | * |
| | Non | -- | 5,48 | 5,31 | 5,30 | 5,05 | 5,12 |
| | Oui | -- | 5,74 | 5,60 | 5,48 | 5,48 | 5,34 |
| Graves disputes ou climat de violence dans le foyer (15 derniers jours) | | | *** | *** | *** | *** | ** |
| | Non | -- | 5,71 | 5,53 | 5,46 | 5,37 | 5,30 |
| | Oui | -- | 5,17 | 5,04 | 4,97 | 4,73 | 4,85 |
| Anxiété ² | | | | | | | |
| | Pas d'anxiété | | 5,69 | 5,53 | 5,40 | 5,29 | 5,23 |
| | Anxiété probable | | 5,52 | 5,33 | 5,45 | 5,29 | 5,24 |
| | Anxiété certaine | | 5,72 | 5,47 | 5,36 | 5,33 | 5,32 |
| Dépression ² | | | *** | *** | *** | * | |
| | Pas de dépression | -- | 5,77 | 5,59 | 5,61 | 5,39 | 5,24 |
| | Dépression probable | -- | 5,45 | 5,36 | 5,15 | 5,19 | 5,25 |
| | Dépression certaine | -- | 5,57 | 5,20 | 5,21 | 5,14 | 5,26 |
| Peur ressentie | | | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Non, pas du tout | -- | 5,52 | 5,19 | 5,32 | 5,11 | 5,11 |
| | Non, plutôt pas | -- | 5,46 | 5,31 | 5,24 | 5,22 | 4,92 |
| | Oui, plutôt | -- | 5,67 | 5,56 | 5,43 | 5,29 | 5,40 |
| | Oui, tout à fait | -- | 6,06 | 5,88 | 5,92 | 5,84 | 5,95 |

Notes : -- données indisponibles ; Les évolutions entre les vagues sont testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). **Les chiffres (moyennes) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.** * les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables de conditions de vie liées à l'épidémie et au confinement (colonne de gauche) et l'indicateur (nombre de mesures systématiquement adoptées) pour chacune des vagues, *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ Mesures de protection adoptées systématiquement (N=7) : Se laver régulièrement les mains ; Saluer sans serrer la main ; Tousser dans son coude ; Utiliser un mouchoir à usage unique ; Rester confiné à la maison le plus possible ; Limiter toutes formes d'interactions ; Garder une distance d'au moins un mètre.

² HAD : Hospital Anxiety and Depression scale

Lecture du tableau :

Ex. : En V2, le nombre moyen de mesures systématiquement adoptées est significativement différent entre les répondants qui déclarent avoir vécu de graves disputes ou un climat de violence (5,17) et ceux qui n'en ont pas connu, avec en moyenne un nombre plus élevé de mesures systématiquement adoptées par ces derniers (5,71). En V3, ces différences persistent (5,04 vs. 5,53), avec une baisse significative en V3 du nombre de mesures adoptées chez les répondants déclarant ne pas avoir vécu de graves disputes ou climat de violence.