

DIAGNOSTIC, SURVEILLANCE ET ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA LEPTOSPIROSE EN FRANCE

// DIAGNOSIS, SURVEILLANCE, AND EPIDEMIOLOGY OF LEPTOSPIROSIS IN FRANCE

Pascale Bourhy¹, Alexandra Septfonds², Mathieu Picardeau¹ (mpicard@pasteur.fr)

¹ Centre national de référence de la leptospirose, Institut Pasteur, Paris, France

² Santé publique France, Saint-Maurice, France

Soumis le 07.11.2016 // Date of submission: 11.07.2016

Résumé // Abstract

La leptospirose est une zoonose émergente dans le monde, y compris en Europe. Elle reste largement sous-estimée du fait de l'absence de symptômes spécifiques et d'un manque de sensibilisation au sein de la communauté médicale, en particulier en France métropolitaine où son incidence, au cours des années 2014 et 2015, a atteint 1 cas pour 100 000 habitants, incidence la plus élevée observée depuis 1920. La leptospirose est endémique dans de nombreux départements et collectivités d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), où son incidence peut être 50 fois plus élevée qu'en France métropolitaine. Le diagnostic s'effectue principalement par la détection de l'ADN bactérien dans le sang par PCR lors de la première semaine de la maladie ou par la recherche des anticorps à partir de la deuxième semaine. Près d'un siècle après la découverte de l'agent causal de la leptospirose, cette zoonose reste un problème de santé publique important dans les territoires français. La leptospirose est aussi considérée comme une maladie émergente en raison du changement climatique (réchauffement climatique et phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents entraînant des inondations) et de l'urbanisation grandissante (transmission par l'intermédiaire des rats dans les zones insalubres de type bidonvilles).

Leptospirosis is a zoonotic emerging disease worldwide, including in Europe. The incidence of the disease is underestimated due to the absence of non-specific symptoms, and the lack of awareness among the medical community, in particular in mainland France, where its incidence reached 1 case per 100,000 inhabitants between 2014 and 2015, which is the highest incidence since 1920. Leptospirosis is endemic in many French overseas territories (Martinique, Guadeloupe, French Guyana, Reunion Island, New Caledonia, Mayotte, French Polynesia) where its incidence can be 50 times higher than in mainland France. Most cases of leptospirosis are currently detected by PCR amplification of bacterial DNA from the blood during the first week after the onset of symptoms, or by detection of antibodies from the second week of the disease. Leptospirosis remains an important public health issue in French territories one century after discovering the causative agent. Leptospirosis is also considered as an emerging disease due to global climate changes (global warming and more frequent extreme climatic events resulting in flooding) and rapid urbanization (rat-borne transmission in slum areas).

Mots-clés : Leptospirose, Diagnostic, Surveillance épidémiologique

// **Keywords:** Leptospirosis, Diagnosis, Epidemiological surveillance

Introduction

La leptospirose est la maladie zoonotique la plus répandue dans le monde en raison du grand nombre de mammifères réservoirs, sauvages ou domestiques, qui peuvent être porteurs de la bactérie. Elle provoque plus de 1 millions de cas et est responsable d'environ 60 000 décès par an¹. Le fardeau de la leptospirose est donc comparable, voire supérieur à celui d'autres maladies tropicales négligées comme la dengue ou la leishmaniose. En France, pendant les années 2014-2015, un doublement du nombre de cas a été constaté par rapport aux années précédentes en France métropolitaine, avec plus de 600 cas, et une moyenne de 700 cas dans les départements et collectivités d'outre-mer, où les conditions climatiques sont propices au maintien de la bactérie dans l'environnement. Cet article présente les fondements de la surveillance de cette infection émergente

en France métropolitaine et dans les régions et départements d'outre-mer.

La leptospirose, rappel sur la maladie

Les leptospires appartiennent au phylum des spirochètes, qui partagent des caractéristiques morphologiques uniques dans le monde bactérien : les leptospires sont des bactéries spiralées possédant un organe locomoteur interne, les flagelles péripasmiques ou endoflagelles. Le genre *Leptospira* comprend 22 espèces, dont 10 pathogènes, et plus de 300 sérovars regroupés en au moins 24 sérogroupes².

Les leptospires pathogènes sont responsables d'une zoonose de répartition mondiale, la leptospirose, où l'Homme se retrouve être un hôte occasionnel dans un cycle impliquant des animaux sauvages et domestiques. Tous les mammifères sont susceptibles

d'héberger les leptospires pathogènes au niveau des tubules rénaux proximaux. L'infection aiguë et la colonisation chronique représentent les deux pôles d'un large spectre de signes cliniques observés chez les animaux. On distinguera ainsi les animaux porteurs asymptomatiques, principalement les rongeurs, et les animaux sensibles tels que le bétail (avortements, perte de production de lait) et les chiens (formes sévères pouvant entraîner la mort). Il existe une spécificité d'hôtes vis-à-vis de certains sérovars : ainsi, *Canicola* est associé au chien, *Icterohaemorrhagiae* au rat, *Ballum* à la souris domestique, etc.³, mais cette spécificité d'hôte n'est pas exclusive. La transmission est avant tout environnementale, mais d'autres modes de transmission (*in utero*, sexuelle, allaitement maternel) ne sont pas à négliger chez les animaux. L'animal excrète les leptospires dans ses urines et contamine ainsi l'environnement hydrique, propageant la maladie à d'autres animaux ou à l'Homme. Bien que plus rare, l'exposition aux leptospires peut être directe, après contact avec l'urine ou les tissus d'animaux infectés. Dans des conditions environnementales favorables (eau ou sol mouillé à pH neutre ou légèrement alcalin à l'abri des UV), les leptospires peuvent survivre pendant plusieurs semaines⁴. Ils pénètrent dans l'organisme humain au niveau de lésions du revêtement cutané ou par les muqueuses des yeux, de la bouche ou du nez après contact avec de l'eau contaminée.

Après une période d'incubation d'une dizaine de jours, la leptospirose humaine se manifeste par une présentation clinique très polymorphe, depuis la forme fébrile anictérique observée dans la grande majorité des cas jusqu'à une défaillance multiviscérale potentiellement mortelle, caractérisée par une insuffisance rénale, des hémorragies viscérales et un ictère⁵. Les deux classes d'antibiotiques prescrites dans le traitement de la leptospirose sont les β -lactamines et les cyclines. Il n'y a pas de résistance à ces antibiotiques rapportée jusqu'à maintenant, mais l'antibiothérapie doit commencer le plus précocement possible pour éviter les formes les plus graves⁵.

Le diagnostic est souvent tardif au cours de l'infection. En effet, le spectre clinique de la leptospirose pouvant varier d'un état pseudo-grippal à une insuffisance rénale aiguë, ce syndrome peut être confondu avec d'autres maladies telles que la grippe ou, dans les régions tropicales, le paludisme ou la dengue⁶.

Dans les pays industrialisés des zones tempérées, la leptospirose est une maladie qui touche certaines catégories professionnelles exposées (agriculteurs, éleveurs, égoutiers, pisciculteurs) et les adeptes de loisirs en plein air (pêche, rafting, canyoning) par contact avec les eaux douces souillées par les urines d'animaux infectés. Dans les régions tropicales comme les départements (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion) et collectivités (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) français d'outre-mer, la population est plus largement exposée. En France, un vaccin, composé d'une souche du sérovar *Icterohaemorrhagiae* inactivée, est disponible (Spirolept®). Cette vaccination nécessite un rappel tous

les deux ans et ne protège pas contre l'ensemble des sérovars. Malgré tout, le sérovar *Icterohaemorrhagiae* est le plus fréquemment incriminé en clinique humaine dans les formes les plus graves⁷⁻⁹ et cette vaccination est recommandée pour la population à risque^{5,10}.

Le diagnostic biologique de la leptospirose en France

Un panel de tests pour le diagnostic moléculaire ou sérologique de la leptospirose est disponible. Cependant, le choix dans la prescription du test est très dépendant de la cinétique de l'infection, notamment de la date d'apparition des signes cliniques⁶.

Outils diagnostiques

La technique permettant le diagnostic le plus précoce est la PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dans le sang. En effet, les leptospires pathogènes se retrouvent dans la circulation sanguine dès les premiers jours après l'apparition des symptômes ; cependant, la concentration de bactéries dans le sang est en général faible (<10⁶ bactéries/ml) et la bactériémie peut-être de courte durée, surtout si une antibiothérapie a été mise en place. En outre, en l'absence de kit PCR commercial à visée humaine, les laboratoires doivent valider une méthode interne qui ne fait pas toujours l'objet d'une validation technique et clinique rigoureuse.

Au cours de l'évolution de la maladie, la bactériémie tend à diminuer puis disparaître au profit de la réponse immunitaire, où les anticorps de type IgM peuvent être détectés dès le 5^e jour après le début de la maladie. Le diagnostic de choix est alors la sérologie par recherche d'anticorps anti-leptospires à l'aide de tests de type Elisa IgM et/ou le test de micro-agglutination (MAT) pour les immunoglobulines totales. Durant cette phase « immunitaire », la PCR peut aussi être pratiquée sur les urines ou le liquide cérébro-spinal (LCS), lorsque l'antibiothérapie est absente ou administrée depuis moins de 48h.

Le diagnostic bactériologique est peu pratiqué, car il nécessite un milieu de culture spécifique (le milieu EMJH) et le temps de génération des leptospires est particulièrement long, entraînant ainsi une réponse tardive (plusieurs semaines). Même si la culture n'a pas de valeur diagnostique, seul l'isolement de la souche permet une identification complète de la souche infectante au niveau du sérovar à l'aide de techniques sérologiques et moléculaires¹¹⁻¹⁴.

Plusieurs tests bandelettes commercialisés permettent la détection d'anticorps anti-leptospires en quelques heures à partir d'un prélèvement sanguin¹⁵. Ces tests de diagnostic rapide sont particulièrement intéressants dans les pays en développement où il n'existe pas de laboratoire de référence.

Dans un avenir proche, l'utilisation du séquençage à haut débit pour le diagnostic à partir d'échantillons biologiques pourra être envisagée (ou proposée). Cette approche a ainsi récemment permis le diagnostic d'un cas de neuroleptospirose et l'amélioration de l'état du patient après antibiothérapie¹⁶.

Quelles sont les capacités techniques en France ?

En France, les techniques de PCR et de sérologie Elisa IgM sont largement utilisées, notamment depuis leur inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) et leur remboursement en septembre 2014. En revanche, le MAT ne figure plus parmi les actes remboursés. Le changement de la NABM a considérablement modifié le diagnostic de la leptospirose. Ainsi, l'Elisa IgM est maintenant largement utilisé, remplaçant le MAT.

Il existe un réseau de partenaires pratiquant le diagnostic de la leptospirose en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer¹⁷.

En métropole, ces techniques diagnostiques sont principalement utilisées par le Centre national de référence de la leptospirose (CNR – Institut Pasteur, Paris) et les laboratoires privés Biomnis et Cerba. Certains laboratoires hospitaliers réalisent la PCR et bénéficient également de kits commerciaux permettant d'effectuer des sérologies Elisa IgM¹⁷.

Dans les départements et collectivités d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane française, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), différents laboratoires bénéficient des techniques diagnostiques leur permettant d'effectuer un diagnostic de première intention (sérologie Elisa IgM ou PCR et, pour la Nouvelle-Calédonie, le MAT) en se reposant sur le CNR si nécessaire (confirmation des sérologies positives ou douteuses et typage)¹⁷.

Le CNR utilise un test Elisa IgM qui lui est propre¹⁸, le MAT et la PCR. Le CNR est le seul laboratoire en capacité de réaliser le MAT à l'aide de 24 antigènes spécifiques de chacun des sérogroupes de leptospires. Il permet de confirmer les cas séropositifs par Elisa et, dans certains cas, d'identifier le séro groupe. L'interprétation des résultats de MAT est cependant délicate : il peut y avoir de nombreuses réactions croisées entre les antigènes et il faut, dans la plupart des cas, au moins deux prélèvements à deux semaines d'intervalle pour identifier le séro groupe infectant. Le CNR bénéficie également de différentes techniques PCR pour le diagnostic et le génotypage de la souche infectante directement à partir des échantillons biologiques.

Dans les Outre-mer, où l'incidence est élevée, la détection de l'ADN bactérien par PCR sur des prélèvements biologiques précoces tend à supplanter la sérologie suite au changement de nomenclature. La mise en place des techniques PCR en Outre-mer a été un vrai défi pour que le diagnostic de la leptospirose puisse être effectué localement et rapidement (médecine de ville, hôpital) et pour permettre ainsi d'éviter un certain nombre d'hospitalisations avec une prise en charge précoce de ces cas¹⁹.

La disponibilité de ces plateaux techniques, spécifiquement dans les départements et collectivités d'outre-mer, a permis l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de surveillance épidémiologique à visée d'alerte pour la leptospirose.

Surveillance de la leptospirose en France

Depuis 1986, la leptospirose n'est plus une maladie à déclaration obligatoire. Sa surveillance en France est une surveillance passive basée sur :

- l'activité diagnostique du CNR. Tous les ans, le CNR réalise le diagnostic d'environ 4 000 échantillons (en provenance de l'hexagone et d'Outre-mer). Ces diagnostics sont effectués soit en première intention, soit dans le cadre de la confirmation des cas positifs ou douteux envoyés par les laboratoires privés ou hospitaliers pratiquant le diagnostic. Lors de l'envoi des échantillons au CNR, il est demandé de remplir une fiche de renseignements comportant des informations cliniques, biologiques et épidémiologiques permettant de contribuer à la surveillance de la leptospirose au niveau national. Cependant, ces fiches ne sont pas systématiquement renseignées, ou le sont le plus souvent de manière incomplète, ce qui limite le recueil d'informations. Cette implication directe du CNR dans le diagnostic de la maladie facilite la surveillance et la détection d'événements inhabituels (cas groupés, expositions spécifiques), notamment en métropole ;
- l'analyse des données des laboratoires privés Biomnis et Cerba, qui réalisent les deux tiers des diagnostics biologiques. Une convention entre Santé publique France et ces deux laboratoires permet de récupérer tous les mois les résultats des analyses qu'ils ont effectuées. Ces données permettent de compléter les données du CNR et des réseaux de laboratoires hospitaliers (nombre de tests réalisés et de cas positifs). Dans ce cas, les informations cliniques et épidémiologiques ne sont pas disponibles ;
- des partenariats entre le CNR et les professionnels de la santé animale. En effet, ceux-ci jouent un rôle actif dans la surveillance de la zoonose, notamment par la mise en place d'investigations et d'études de la prévalence de la leptospirose chez la faune sauvage²⁰, les rongeurs et les animaux de rente. Ces études permettent de mieux connaître les réservoirs et les souches circulantes pouvant avoir un impact direct sur la santé humaine.

Il existe de plus, dans les départements d'outre-mer, des systèmes de surveillance spécifiques incluant le signalement ou la déclaration des cas de leptospirose par les médecins et laboratoires (Voir les autres articles de ce BEH).

Des collaborations étroites entre différents partenaires (CNR, laboratoires privés et hospitaliers, médecins, Santé publique France, Agences régionales de santé, opérateurs de lutte antivectorielle, Direction générale de l'alimentation, Office national de la chasse et de la faune sauvage, *European Centre for Disease Prevention and Control*) permettent, lors de la détection de cas de leptospirose (cas groupés pour la métropole) ou d'événements

inhabituels, de mettre en place des investigations épidémiologiques et environnementales.

En tant que Centre collaborateur de l'OMS, le CNR participe également aux réflexions sur l'épidémiologie de la leptospirose, la surveillance et l'impact de cette maladie au niveau européen et mondial.

Suite au changement de nomenclature, le remplacement progressif du MAT (non remboursé) par l'Elisa (remboursé) a eu un impact sur la surveillance de la leptospirose en France. En effet, ceci a entraîné une perte d'information sur les sérogroupes infectants circulants en France : contrairement au MAT, ni la PCR ni l'Elisa ne peuvent identifier le sérotype ou le sérovar.

Épidémiologie de la leptospirose en France métropolitaine et Outre-mer

La leptospirose représente un problème de santé publique majeur dans de nombreux pays, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. On estime à plus d'un million le nombre de cas sévères de leptospirose chaque année dans le monde, avec un taux de mortalité de 5 à 20%¹.

La France est un des pays industrialisés qui a l'incidence la plus élevée (incidence annuelle comprise entre 0,5 et 1 cas /100 000 habitants)¹⁷. La leptospirose est une des maladies infectieuses dont l'incidence est susceptible d'être modifiée par le changement climatique en France métropolitaine^{21,22}. Selon les données issues du CNR et de son réseau de laboratoires, on observe une augmentation du nombre de cas, avec une incidence record jamais enregistrée depuis 1920²³ pour les années 2014 et 2015, de 1 cas pour 100 000 habitants (incidence 2 fois plus élevée qu'en 2011) (figure 1). Plus de 85% des cas documentés n'avaient pas voyagé le mois précédent l'apparition des symptômes. La très grande majorité des cas était de sexe masculin.

Les facteurs de risque étaient la fréquentation d'un environnement rural et/ou la pratique de loisirs en plein air, notamment d'activités aquatiques (baignade, kayaking, rafting, canyoning). Une étude rétrospective en Normandie a également montré une prédominance des cas parmi les personnes exerçant une activité professionnelle au moment de la survenue de la maladie (52%)²⁴. Depuis quelques années, plusieurs cas de leptospirose ont été rapportés chez des personnes possédant des rats de compagnie. Pour les autres cas, un voyage en région endémique (Asie du Sud-Est, Antilles ou Océan Indien) était rapporté. Le maximum de cas est habituellement retrouvé entre les mois d'août et septembre. Pour les cas diagnostiqués par le MAT, le sérotype Icterohaemorrhagiae est prédominant, représentant un tiers des cas. Pour la période 2011-2015, les régions Aquitaine, Franche-Comté et Basse-Normandie étaient les plus touchées.

Dans les départements d'outre-mer, l'incidence de la leptospirose est de 10 à 50 fois plus élevée qu'en France métropolitaine (figure 2), avec une majorité de cas pendant la saison des pluies.

En Guadeloupe et Martinique, le nombre de cas est en diminution ces dernières années¹⁷, probablement en raison d'un « relâchement » de l'attention de la communauté médicale suite à l'étude d'incidence de 2011¹⁹ et aux récentes épidémies de dengue, de chikungunya et de Zika. En 2015, le sérotype Icterohaemorrhagiae représentait la grande majorité des sérotypes déterminés par le MAT. Le CNR a participé à plusieurs études pour l'identification des souches circulantes dans ces régions, notamment grâce à l'isolement de nombreuses souches de patients mais aussi par typage direct sur les échantillons biologiques^{8,25-27}.

En Guyane française, le nombre de cas recensés est en nette augmentation depuis 2011 grâce à une sensibilisation croissante de la communauté médicale²⁸. Depuis 2014, la grande majorité des cas

Figure 1

Incidence de la leptospirose en France métropolitaine (1920-2015). Données du CNR de la leptospirose (Institut Pasteur, Paris)





Figure 2

Incidence de la leptospirose dans les régions et collectivités d'outre-mer (2011-2015). Données du CNR de la leptospirose (Institut Pasteur, Paris)



a été diagnostiquée par Elisa IgM. Pour les sérologies positives par MAT, les sérogroupes identifiés appartenant le plus fréquemment à *Icterohaemorrhagiae*.

À Mayotte, grâce à la mobilisation des médecins et biologistes locaux, le diagnostic de la leptospirose a été optimisé et l'isolement des souches est fréquent depuis 2007. C'est ainsi qu'une épidémiologie atypique a été mise en évidence, avec une majorité de cas appartenant au séro groupe Mini et une absence du séro groupe *Icterohaemorrhagiae*, habituellement le plus rencontré en clinique humaine²⁹. Une nouvelle espèce pathogène pour l'Homme, *Leptospira mayottensis*, a également été identifiée³⁰ ; son principal réservoir est le tenrec, un mammifère insectivore d'apparence proche des hérissons³¹.

À La Réunion, le nombre de cas semblait être en diminution en 2015 par rapport aux années précédentes, et ce malgré une pluviométrie élevée. Contrairement à Mayotte, la très grande majorité des sérogroupes identifiés par MAT appartiennent au séro groupe *Icterohaemorrhagiae*.

Pour les collectivités d'outre-mer comme Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, la surveillance est gérée par un système de surveillance indépendant. Les données sont consultables sur les sites officiels des territoires (pour la Nouvelle-Calédonie : <http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/>) et dans des publications récentes comme pour Futuna³² et la Polynésie française³³.

Conclusion

La leptospirose, considérée comme une maladie négligée, est très probablement largement sous-estimée à travers le monde. De nombreux rapports

montrent que cette zoonose est émergente, notamment en Europe³⁴. Les raisons de cette émergence ne sont pas clairement identifiées et sont probablement multiples (réchauffement climatique, notamment hivers plus doux, augmentation des populations de rongeurs, augmentation des activités à risque, etc.). La surveillance de la leptospirose s'est mise en place en France depuis plusieurs décennies et a évolué concomitamment avec le développement et la mise à disposition de nouvelles techniques diagnostiques.

Avec le changement de nomenclature en septembre 2014 et le remboursement de la PCR dans le sang et de la sérologie Elisa IgM, l'accès aux techniques diagnostiques pour les laboratoires de ville et hospitaliers a permis une prise en charge rapide des cas et la mise en place de systèmes de surveillance et de gestion spécifique dans les zones où l'incidence est élevée. Cependant, ces deux techniques ne permettent pas de mettre en évidence le séro groupe ou le génotype en cause dans l'infection. Il est donc important que les laboratoires envoient au CNR les sérologies ou les extraits d'ADN testés positifs pour typage afin de continuer le suivi épidémiologique des souches circulantes.

Le développement de tests de diagnostic rapide permettra de mettre à disposition un test fiable et utilisable facilement dans les pays en développement où le test de référence n'est pas disponible.

La surveillance de la leptospirose en France est basée sur une surveillance passive, non exhaustive. La sensibilisation des professionnels de santé reste donc essentielle. En effet, les signes cliniques initiaux étant peu spécifiques, ceci peut conduire à un retard diagnostique et thérapeutique par confusion avec des diagnostics différentiels tels que la grippe, le paludisme, le chikungunya ou la dengue.

Alors qu'il existe un nombre croissant d'études sur la leptospirose en Outre-mer, il y a un déficit de connaissances sur la leptospirose en France métropolitaine, en particulier sur les modes de transmission et facteurs de risques qui sont peu connus et sur les souches cliniques rarement isolées. Il y a donc un besoin urgent de mieux comprendre l'épidémiologie de la leptospirose en métropole, d'autant plus que le nombre de cas est en forte augmentation depuis quelques années. ■

Références

- [1] Costa F, Hagan JE, Calcagno J, Kane M, Torgerson P, Martinez-Silveira MS, *et al.* Global morbidity and mortality of leptospirosis: A systematic review. *PLoS Negl Trop Dis.* 2015;9(9):e0003898.
- [2] Levett PN. Leptospirosis. *Clin Microbiol Rev.* 2001;14:296-326.
- [3] Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, Matthias MA, Diaz MM, Lovett MA, *et al.* Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. *Lancet Infect Dis.* 2003;3:757-71.
- [4] André-Fontaine G, Aviat F, Thorin C. Water borne leptospirosis: survival and preservation of the virulence of pathogenic *Leptospira* spp. in fresh water. *Curr Microbiol.* 2015;71(1):136-42.
- [5] Bourhy P, Hochedez P, Picardeau M. Leptospirose. Encyclopédie médico-chirurgicale – Maladies infectieuses. 2012;9.
- [6] Bourhy P, Picardeau M. Leptospirose: moyens diagnostiques. Encyclopédie médico-chirurgicale – Biologie médicale. 2016;11.
- [7] Taylor AJ, Paris DH, Newton PN. A systematic review of the mortality from untreated leptospirosis. *PLoS Negl Trop Dis.* 2015;9:e0003866.
- [8] Hochedez P, Theodose R, Olive C, Bourhy P, Hurtrel G, Vignier N, *et al.* Factors associated with severe leptospirosis, Martinique, 2010-2013. *Emerg Infect Dis.* 2015;21:2221-4.
- [9] Tubiana S, Mikulski M, Becam J, Lacassin F, Lefèvre P, Gourinat AC, *et al.* Risk factors and predictors of severe leptospirosis in New Caledonia. *PLoS Negl Trop Dis.* 2013;7:e1991.
- [10] Haut Conseil de la santé publique. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2016. *Bull Epidemiol Hebd.* 2016;(Hors-série). <http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-hors-serie-Calendar-des-vaccinations-et-recommandations-vaccinales-2016>
- [11] Herrmann JL, Bellenger E, Perolat P, Baranton G, Saint Girons I. Pulsed-field gel electrophoresis of *Not I* digests of leptospiral DNA: a new rapid method of serovar identification. *J Clin Microbiol.* 1992;30:1696-702.
- [12] Merien F, Portnoi D, Bourhy P, Charavay F, Berlioz-Arthaud A, Baranton G. A rapid and quantitative method for the detection of *Leptospira* species in human leptospirosis. *FEMS Microbiol Lett.* 2005;249:139-47.
- [13] Salaün L, Mérien F, Gurianova S, Baranton G, Picardeau M. Application of multilocus variable-number tandem-repeat analysis for molecular typing of the agent of leptospirosis. *J Clin Microbiol.* 2006;44:3954-62.
- [14] Ahmed A, Thaipadungpanit J, Boonsilp S, Wuthiekanun V, Nalam K, Spratt BG, *et al.* Comparison of two multilocus sequence based genotyping schemes for *Leptospira* species. *PLoS Negl Trop Dis.* 2011;5:e1374.
- [15] Picardeau M, Bertherat E, Jancloes M, Skouloudis AN, Durski K, Hartskeerl RA. Rapid tests for diagnosis of leptospirosis: current tools and emerging technologies. *Diagn Microbiol Infect Dis.* 2014;78:1-8.
- [16] Wilson MR, Naccache SN, Samayoa E, Biagtan M, Bashir H, Yu GX, *et al.* Actionable diagnosis of neuroleptospirosis by next-generation sequencing. *N Engl J Med.* 2014;370:2408-17.
- [17] Picardeau M, Bourhy P. Rapports annuels du Centre national de référence de la leptospirose, Institut Pasteur, Paris. <https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/leptospirose/rapports-d-activite>
- [18] Bourhy P, Vray M, Picardeau M. Evaluation of an in-house ELISA using the intermediate species *Leptospira fainei* for diagnosis of leptospirosis. *J Med Microbiol.* 2013;62:822-19.
- [19] Cassadou S, Rosine J, Flamand C, Escher M, Ledrans M, Bourhy P, *et al.* Underestimation of leptospirosis incidence in the French West Indies. *PLoS Negl Trop Dis.* 2016;10:e0004668.
- [20] Ayrat F, Djelouadji Z, Raton V, Zilber AL, Gasqui P, Faure E, *et al.* Hedgehogs and mustelid species: Major carriers of pathogenic *Leptospira*, a survey in 28 animal species in France (2012-2015). *PLoS One.* 2016;11:e0162549.
- [21] Dufour B, Moutou F, Hattenberger AM, Rodhain F. Global change: impact, management, risk approach and health measures – the case of Europe. *Rev Sci Tech.* 2008;27:529-50.
- [22] Dupouey J, Faucher B, Edouard S, Richet H, Kodjo A, Drancourt M, *et al.* Human leptospirosis: an emerging risk in Europe? *Comp Immunol Microbiol Infect Dis.* 2014;37:77-83.
- [23] Baranton G, Postic D. Trends in leptospirosis epidemiology in France. Sixty-six years of passive serological surveillance from 1920 to 2003. *Int J Infect Dis.* 2006;10:162-70.
- [24] Watrin M. Étude descriptive des cas de leptospirose diagnostiqués en Normandie sur la période 2010-2014. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2016. 28 p. http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12888
- [25] Bourhy P, Herrmann-Storck C, Theodose R, Olive C, Nicolas M, Hochedez P, *et al.* Serovar diversity of pathogenic *Leptospira* circulating in the French West Indies. *PLoS Negl Trop Dis.* 2013;7:e2114.
- [26] Hochedez P, Escher M, Decoussy H, Pasgrimaud L, Martinez R, Rosine J, *et al.* Outbreak of leptospirosis among canyoning participants, Martinique, 2011. *Euro Surveill.* 2013;18(18):20472.
- [27] Hochedez P, Rosine J, Théodose R, Abel S, Bourhy P, Picardeau M, *et al.* Outbreak of leptospirosis after a race in the tropical forest of Martinique. *Am J Trop Med Hyg.* 2011;84:621-6.
- [28] Epelboin L, Bourhy P, Letournier P, Schaub R, Mosnier E, Berlioz-Arthaud A, *et al.* La leptospirose en Guyane française et sur le bouclier des Guyanes : état des connaissances en 2016. *Bull Soc Path Exot.* 2017. (sous presse).
- [29] Bourhy P, Collet L, Lernout T, Zinini F, Hartskeerl RA, van der Linden H, *et al.* Human *Leptospira* isolates circulating in Mayotte (Indian Ocean) have unique serological and molecular feature. *J Clin Microbiol.* 2012;50:307-11.
- [30] Bourhy P, Collet L, Brisse S, Picardeau M. *Leptospira mayottensis* sp. nov., a pathogenic *Leptospira* species isolated from humans. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2014;64:4061-7.
- [31] Lagadec E, Gomard Y, Le Minter G, Cordonin C, Cardinale E, Ramasindrazana B, *et al.* Identification of *Tenrec ecaudatus*, a wild mammal introduced to Mayotte Island, as a reservoir of the newly identified human pathogenic *Leptospira mayottensis*. *PLoS Negl Trop Dis* 2016;10:e0004933.
- [32] Massenot D, Yvon JF, Couteaux C, Goarant C. An unprecedented high incidence of leptospirosis in Futuna, South Pacific, 2004-2014, evidenced by retrospective analysis of surveillance data. *PLoS One.* 2015;10:e0142063.

[33] Hirschauer C, Daudens E, Coudert C, Frogier E, Melix G, Fleure M, et al. Épidémiologie de la leptospirose en Polynésie française de 2006 à 2008. Bull Epidemiol Hebd. 2009;(48-50):508-11. http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=910

[34] Pijnacker R, Goris MG, Te Wierik MJ, Broens EM, van der Giessen JW, de Rosa M, et al. Marked increase in leptospirosis

infections in humans and dogs in the Netherlands, 2014. Euro Surveill. 2016;21(17).

Citer cet article

Bourhy P, Septfons A, Picardeau M. Diagnostic, surveillance et épidémiologie de la leptospirose en France. Bull Epidemiol Hebd. 2017;(8-9):131-7. http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/8-9/2017_8-9_1.html

> ARTICLE // Article

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA LEPTOSPIROSE À LA RÉUNION, 2004-2015

// EPIDEMIOLOGY OF LEPTOSPIROSIS ON REUNION ISLAND, 2004-2015

Frédéric Pagès¹ (frederic.pages@ars.sante.fr), **Brian Kurtkowiak²**, **Marie-Christine Jaffar-Bandjee³**, **Julien Jaubert⁴**, **Francine Domonte⁵**, **Nicolas Traversier³**, **Sandrine Picot⁴**, **Pascale Bourhy⁵**, **Mathieu Picardeau⁶**, **François Chieze⁵**, **Laurent Filleul¹**

¹ Cellule d'intervention en région Océan Indien, Santé publique France, Saint-Denis de La Réunion, France

² Service de lutte anti-vectorielle, Agence régionale de santé Océan Indien, Saint-Denis de La Réunion, France

³ Laboratoire de biologie, site nord, CHU de La Réunion, France

⁴ Laboratoire de biologie, site sud, CHU de La Réunion, France

⁵ Direction de la veille et sécurité sanitaire, Agence régionale de santé Océan Indien, Saint-Denis de La Réunion, France

⁶ Centre national de référence de la leptospirose, Institut Pasteur, Paris, France

Soumis le 30.11.2016 // Date of submission: 11.30.2016

Résumé // Abstract

Depuis 1953, la leptospirose est reconnue comme un problème de santé publique à La Réunion. En 2004, un système de surveillance spécifique a été mis en place, comprenant la déclaration systématique des cas et la réalisation d'enquêtes environnementales autour des patients hospitalisés. Nous présentons ici la synthèse des données de 12 ans de surveillance.

De 2004 à 2015, 611 cas ont été rapportés (soit 6 cas pour 100 000 habitants). Parmi eux, 568 (93%) ont été hospitalisés, dont 33% en service de réanimation. La létalité annuelle moyenne était de 3%. Les hommes représentaient 93% des cas hospitalisés et 85% des cas non hospitalisés (différence non significative). L'incidence variait selon les années (de 3 à 10 cas pour 100 000 habitants) et selon les communes de l'île (de 2 à 63 cas pour 100 000 habitants). Les activités agricoles professionnelles ou de loisir représentaient 65% des modes de contamination. Les contaminations professionnelles représentaient 20% des cas, principalement dans des professions à haut risque de leptospirose. Les expositions de loisir n'ont pas supplanté les expositions agricoles ou professionnelles, comme c'est le cas dans les pays tempérés.

Selon le nouveau système de surveillance de 2004, le nombre de cas notifiés a régulièrement augmenté depuis cette année. Cette situation est en partie due à la mise en place de ce nouveau système, mais aussi à une réelle augmentation du nombre de cas détectés en raison de l'introduction des méthodes moléculaires de diagnostic et de l'augmentation de l'investigation biologique des syndromes *dengue-like* par les praticiens de l'île depuis la crise du chikungunya en 2006. La possibilité d'une épidémie était aussi toujours présente, en raison d'événements climatiques tels que le cyclone Bejiza en 2014.

De par la gravité de ses formes, la leptospirose demeure un problème de santé publique à La Réunion. La sensibilisation des professionnels de santé sur la maladie et ses facteurs aggravants, ainsi que l'adaptation des mesures de prévention aux populations les plus exposées, avec notamment la vaccination contre la leptospirose à *Icterohaemorrhagiae* pour les professionnels à haut risque, sont des enjeux importants pour diminuer l'incidence et la létalité de la leptospirose à La Réunion.

Since 1953, leptospirosis has been recognized as a public health problem on Reunion Island. In 2004, a specific surveillance system was established, including systematic reporting of cases and environmental investigations around patients. This article presents the data synthesis from 12 years of surveillance.

Between 2004 and 2015, 611 cases were reported (6 cases per 100,000 inhabitants). Of these, 568 (93%) were hospitalized, including 33% in intensive care units. The average annual lethality was 3%. Males accounted for 93% of hospitalized cases, and 85% of non-hospitalized cases (non-significant difference). The incidence