

**Annexe au rapport** – *Surveillance des consommations d'antibiotiques.*  
*Réseau ATB-Raisin. Résultats 2016*

## **RESULTATS 2016 DETAILLES**

### **POUR LES MCO**

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Médecine** pour les **MCO** (N=178)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	32,9	164,4	221,3	308,2	773,2
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,8	30,3
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	1,2	4,1	9,6	67,9
J01CA04	Amoxicilline	5,7	32,8	55,4	82,5	323,5
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	7,3	100,4	145,6	202,7	646,4
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	2,0	6,2	13,5	86,5
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	1,4	5,3	86,1
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,1	0,6	105,4
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	2,2	30,7	46,6	74,2	278,1
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,8	2,7	5,7	37,1
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	27,1	42,9	66,2	278,1
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,8	2,7	5,7	37,1
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,1	1,3	4,9	89,4
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	18,2	34,1	50,4	277,1
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,5	2,4	6,0	67,6
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,4	1,7	4,8	67,6
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,3	55,6
J01DH	Pénèmes	0,0	1,0	3,1	7,2	138,8
J01DH51	Imipénème	0,0	0,5	2,5	6,1	138,8
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,5	10,1
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,5	3,3	69,1
J01E	Sulfamides	0,0	2,0	5,0	8,6	46,9
J01F	MLSK	0,0	9,1	16,6	29,6	218,5
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	2,6	7,1	15,4	139,3
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,9	2,8	50,5
J01FG	Streptogramines	0,0	3,0	6,4	11,3	79,2
J01G	Aminosides	0,0	3,9	7,8	14,0	55,6
J01GB06	Amikacine	0,0	0,7	2,3	5,7	34,2
J01GB03	Gentamicine	0,0	2,0	3,8	8,0	53,3
J01M	Quinolones	6,2	37,4	56,8	88,9	249,4
J01MA	Fluoroquinolones	6,2	37,4	56,8	88,9	249,4
J01MA01	Ofloxacin	0,0	8,7	19,0	36,3	152,3
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	6,7	16,2	30,2	197,5
J01MA12	Levofloxacine	0,0	3,1	9,2	19,8	95,0
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	1,1	3,1	14,8
J01XA	Glycopeptides	0,0	2,0	4,6	10,5	76,5
J01XA01	Vancomycine	0,0	1,7	4,0	9,1	72,8
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,3	18,7
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,7	15,7
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,3	60,6
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	2,2	5,8	12,7	88,9
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,1	0,5	7,6
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	2,0	5,1	9,3	36,6
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	4,7	9,5	18,1	133,4
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,3	2,8	5,8	81,6
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
J01	Consommation ATB systémiques	56,7	321,0	433,0	534,7	1 257,1
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	61,2	325,2	442,9	545,1	1 266,9

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Chirurgie** pour les **MCO** (N=265)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	9,3	136,7	190,1	260,8	1 159,3
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,5	8,9
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,7	3,7	7,5	68,5
J01CA04	Amoxicilline	1,0	25,8	42,3	69,4	519,6
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	0,0	79,6	120,7	173,3	758,4
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	1,8	5,7	12,2	70,4
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	27,1	94,1	145,0	894,6
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,7	4,9	15,8	271,7
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	11,9	23,6	40,3	176,3
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,3	1,4	3,6	71,8
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	11,1	20,9	36,6	128,9
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,3	1,4	3,6	71,8
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,1	1,4	4,4	50,4
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	6,0	13,9	28,7	108,5
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,8	2,3	38,4
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,7	2,1	17,3
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
J01DH	Pénèmes	0,0	0,5	1,9	4,6	33,0
J01DH51	Imipénème	0,0	0,3	1,6	3,9	33,0
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,1	6,7
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	1,5	29,9
J01E	Sulfamides	0,0	1,4	4,0	7,8	104,7
J01F	MLSK	0,0	6,7	11,3	19,0	57,4
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,3	2,1	4,8	29,2
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
J01FF	Lincosamides	0,0	1,8	4,2	7,5	36,4
J01FG	Streptogramines	0,0	1,2	2,7	5,1	35,0
J01G	Aminosides	0,0	12,2	20,8	35,4	126,2
J01GB06	Amikacine	0,0	0,5	2,6	6,1	55,8
J01GB03	Gentamicine	0,0	9,4	16,3	28,5	121,4
J01M	Quinolones	0,0	34,2	52,5	67,7	710,3
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	34,2	52,5	67,7	710,3
J01MA01	Ofloxacine	0,0	10,3	19,0	31,6	154,2
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	4,8	11,4	22,8	155,0
J01MA12	Levofloxacine	0,0	1,8	5,5	11,7	701,3
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	1,7	4,5	28,0
J01XA	Glycopeptides	0,0	3,3	6,5	11,7	95,1
J01XA01	Vancomycine	0,0	3,2	6,3	11,2	81,9
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,2	21,6
J01XX08	Linezolide	0,0	0,0	0,0	0,5	32,9
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,2	55,3
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	3,8	7,9	14,4	183,3
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,1	0,6	70,3
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	1,2	4,0	6,8	160,9
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	6,2	16,5	30,9	121,2
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
J04	Rifampicine	0,0	0,9	5,9	12,4	66,8
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
J01	Consommation ATB systémiques	47,4	361,6	472,4	620,3	2 063,3
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	47,4	373,1	492,1	637,9	2 076,1

## Distribution des consommations d'antibiotiques en Réanimation pour les MCO (N=34)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	245,6	367,2	485,0	539,1	989,8
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	1,4	4,9
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	11,3	24,5	43,6	138,3
J01CA04	Amoxicilline	38,8	110,7	158,2	208,9	427,2
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	41,8	110,3	150,7	196,2	378,6
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,3	5,6	21,1
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	1,3	78,6	126,4	157,5	244,8
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	2,9	12,6	18,5	211,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,3	2,1	59,6
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	33,6	123,6	168,6	236,4	392,1
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,0	0,7	4,9
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	33,0	123,3	168,4	234,4	391,3
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,7	4,9
J01DD01	Cefotaxime	0,0	10,1	33,3	69,2	178,7
J01DD04	Ceftriaxone	1,2	27,4	61,9	115,0	342,5
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	26,8	40,4	61,2	282,1
J01DD02	Ceftazidime	0,0	11,2	21,7	35,1	171,9
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	12,6	44,2	132,1
J01DH	Pénèmes	0,0	54,3	78,3	116,6	429,9
J01DH51	Imipénème	0,0	35,5	55,8	88,4	325,1
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	1,9	22,7	184,4
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	2,9	104,8
J01A	Tetracyclines	0,0	0,0	0,0	3,6	30,7
J01E	Sulfamides	0,0	7,7	14,0	32,8	89,9
J01F	MLSK	2,0	30,9	70,1	109,7	288,1
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	2,0	27,4	56,1	104,1	279,2
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	1,1	5,6	10,7	27,3
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	1,4	4,0	14,3
J01G	Aminosides	11,4	79,6	100,1	131,1	231,2
J01GB06	Amikacine	0,6	46,5	70,8	93,7	168,6
J01GB03	Gentamicine	0,9	18,7	26,3	38,4	91,3
J01M	Quinolones	13,1	79,7	121,9	223,3	338,5
J01MA	Fluoroquinolones	13,1	79,7	121,9	223,3	338,5
J01MA01	Ofloxacin	0,0	2,7	18,3	26,5	112,2
J01MA02	Ciprofloxacine	4,8	20,6	51,3	119,9	226,6
J01MA12	Levofloxacine	0,0	19,8	30,1	70,7	129,9
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,3	3,9	30,4
J01XA	Glycopeptides	0,6	24,3	56,1	87,3	160,3
J01XA01	Vancomycine	0,6	24,3	56,1	86,5	157,4
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	2,4	10,9
J01XX08	Linezolid	0,0	2,5	13,5	28,5	83,7
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	4,5	95,7
J01XB01	Colistine	0,0	4,0	12,0	20,8	148,3
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	4,7	50,8	85,8	108,5	200,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	1,3	3,9	11,5
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,5	3,6	7,5	20,7
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	19,7	31,0	54,2	225,6
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	2,6	14,4	27,6	68,5
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
J01	Consommation ATB systémiques	485,9	1 129,0	1 336,3	1 579,7	2 072,9
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	513,2	1 163,6	1 358,6	1 620,8	2 076,1

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Gynécologie-Obstétrique** pour les **MCO (N=79)**

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	61,8	156,7	215,9	278,1	474,5
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
J01CA04	Amoxicilline	6,5	105,5	173,9	208,2	395,5
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	6,9	31,9	44,9	73,8	160,2
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,1	2,2	13,9	567,1
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,1	21,2
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	4,0	7,3	13,7	49,8
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	1,6	4,3	7,2	39,3
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	1,4	2,6	5,1	33,3
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	1,6	4,3	7,2	39,3
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,5	1,2	15,2
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,7	1,8	3,7	28,6
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01A	Tetracyclines	0,0	0,0	0,0	0,1	23,9
J01E	Sulfamides	0,0	0,0	0,0	0,5	10,1
J01F	MLSK	0,3	3,8	6,1	10,1	22,1
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,5	2,4	5,0	19,8
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,6	2,2	4,3	14,5
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	0,1	0,7	5,4
J01G	Aminosides	0,0	0,6	1,8	4,1	28,4
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,0	0,5	3,9
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,5	1,6	4,0	28,3
J01M	Quinolones	0,0	1,2	3,4	8,1	33,6
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	1,2	3,4	8,1	33,6
J01MA01	Ofloxacin	0,0	0,1	1,6	4,6	21,2
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,9	9,5
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,0	1,1	13,5
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	0,0	0,0	0,1	7,6
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,1	2,3	19,4
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,1	1,0	2,3	14,0
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,2	0,8	2,8	16,0
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	72,8	179,9	246,7	343,2	1 088,2
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	74,9	186,8	249,3	351,3	1 088,2

Distribution des consommations d'antibiotiques en **Pédiatrie** pour les **MCO** (N=26)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	3,1	61,6	112,1	180,1	384,0
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
J01CA04	Amoxicilline	2,1	50,3	74,4	131,2	341,6
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	0,0	0,0	3,6	35,4	158,0
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	4,2	8,6	20,7	42,1	96,0
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,0	2,2	9,1
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	4,0	8,1	20,6	41,2	88,8
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	2,2	9,1
J01DD01	Cefotaxime	2,1	7,0	13,7	22,4	45,7
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,0	0,7	12,2	74,8
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
J01E	Sulfamides	0,0	0,0	0,0	3,0	20,8
J01F	MLSK	0,0	0,0	0,1	6,3	56,8
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolidés)	0,0	0,0	0,0	5,8	48,5
J01FA15	Ketolidés (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
J01G	Aminosides	0,6	2,2	4,0	9,0	32,8
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,3	2,7	18,4
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,7	2,0	5,2	19,6
J01M	Quinolones	0,0	0,0	0,0	0,4	7,4
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	0,0	0,0	0,4	7,4
J01MA01	Ofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,4	5,9
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,2	0,9	7,5
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,2	0,9	7,1
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	0,0	0,2	0,9	7,8
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,0	2,7	30,1
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	9,3	77,1	144,6	254,9	567,4
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	9,3	77,2	144,6	255,3	590,9

## Distribution des consommations d'antibiotiques en SSR pour les MCO (N=83)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	3,3	70,3	96,1	126,5	276,8
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,6	4,9
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,6	2,2	25,0
J01CA04	Amoxicilline	0,0	23,0	35,4	48,7	134,1
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	0,4	35,3	48,6	78,9	220,5
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,5	2,6	14,0
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,2	12,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,8	6,0	11,7	16,0	105,9
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	1,4	2,6	5,5	22,5
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	3,7	7,7	11,7	84,5
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	1,4	2,6	5,5	22,5
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,0	1,0	13,7
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	2,8	6,4	9,4	65,8
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,4	1,4	17,2
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,1	0,8	4,3
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,6	2,0	26,2
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,2	1,6	22,1
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9
J01A	Tétracyclines	0,0	0,0	0,0	3,6	25,4
J01E	Sulfamides	0,0	1,6	5,1	8,2	81,0
J01F	MLSK	0,0	6,1	11,5	18,5	64,2
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,6	2,7	5,1	42,9
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	1,6	4,8	25,8
J01FG	Streptogramines	0,0	2,0	4,0	7,2	18,5
J01G	Aminosides	0,0	0,1	0,7	1,4	130,6
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,2	0,6	5,6
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,2	0,8	126,0
J01M	Quinolones	2,1	20,3	29,1	44,7	109,8
J01MA	Fluoroquinolones	2,1	20,3	29,1	44,7	109,8
J01MA01	Ofloxacin	0,0	6,0	10,5	17,2	42,3
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	3,3	6,9	14,7	59,3
J01MA12	Levofloxacine	0,0	1,9	5,4	9,3	63,5
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,6	2,2	20,9
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,2	0,8	2,8	18,9
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,5	2,6	18,7
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,4	5,5
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	0,5	1,5	4,1	25,2
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,1	0,6	8,4
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,5	1,9	4,3	29,2
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,6	1,6	10,7
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,6	4,8	11,4	27,2
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
J01	Consommation ATB systémiques	9,5	133,6	177,0	220,5	538,1
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	10,0	142,1	181,0	237,3	549,0

## Distribution des consommations d'antibiotiques en SLD pour les MCO (N=7)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	13,1	24,1	44,4	50,7	53,7
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
J01CA04	Amoxicilline	0,0	0,8	5,4	8,1	10,0
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	12,6	18,8	36,9	42,8	51,1
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	0,8	2,6	6,1	7,8
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	0,8	2,2	5,7	7,7
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,6	1,0	5,0	7,4
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01A	Tetracyclines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01E	Sulfamides	0,0	0,7	1,5	2,5	6,2
J01F	MLSK	0,3	2,6	5,0	9,6	68,0
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,5	1,4	5,1	63,2
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
J01FG	Streptogramines	0,0	1,4	3,0	4,9	5,6
J01G	Aminosides	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01M	Quinolones	0,0	0,7	3,9	5,3	10,4
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	0,7	3,9	5,3	9,9
J01MA01	Ofloxacin	0,0	0,3	1,6	2,1	2,3
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,5	1,5	3,9
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,2	1,0	1,5	3,2
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,2	5,5
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,3	0,8	1,8	5,4
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,4	5,0
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
J01	Consommation ATB systémiques	20,2	35,1	62,8	73,2	143,4
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	20,2	41,5	64,0	74,2	144,2



Distribution des consommations d'antibiotiques en **Psychiatrie** pour les **MCO** (N=6)

Code ATC	Familles/Antibiotiques	Nb DDJ/1 000 JH				
		Min	P25	Médiane	P75	Max
J01C	Pénicillines	4,6	17,8	21,3	49,6	99,0
J01CE01+08	Pénicillines G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CE02	Pénicillines V	0,0	0,0	0,3	0,7	3,4
J01CF02+04	Pénicillines M	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
J01CA04	Amoxicilline	0,0	1,6	5,4	9,2	26,5
J01CR02	Amoxicilline ac. clavulanique	3,9	15,1	16,6	38,1	71,8
J01CA12	Pipéracilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR05	Pipéracilline tazobactam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CA13	Ticarcilline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01CR03	Ticarcilline ac. clavulanique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DB+J01DC04	C1G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DC01+02+03	C2G	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9
J01DD+J01DE+J01DC07	C3G	0,0	0,1	0,2	0,6	1,0
J01DD08+13+DC07	C3G orales	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7
J01DD01+02+03+04+J01DE	C3G injectables	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
J01DD01+04	C3G injectables inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7
J01DD01	Cefotaxime	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
J01DD04	Ceftriaxone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
J01DD02+J01DE01	C3G injectables actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DD02	Ceftazidime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH	Pénèmes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH51	Imipénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH02	Méropénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01DH03	Ertapénème	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01A	Tetracyclines	0,0	1,6	4,6	34,8	49,7
J01E	Sulfamides	0,0	0,2	0,8	1,1	2,2
J01F	MLSK	0,0	0,0	2,0	4,0	5,9
J01FA+J01RA (sauf J01FA15)	Macrolides (sauf ketolides)	0,0	0,0	0,0	2,4	3,2
J01FA15	Ketolides (telithromycine)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01FF	Lincosamides	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
J01FG	Streptogramines	0,0	0,0	0,4	2,2	3,4
J01G	Aminosides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01GB06	Amikacine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01GB03	Gentamicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01M	Quinolones	0,0	1,5	7,6	10,9	14,6
J01MA	Fluoroquinolones	0,0	1,5	7,6	10,9	14,6
J01MA01	Ofloxacine	0,0	0,0	0,9	2,5	8,4
J01MA02	Ciprofloxacine	0,0	0,0	0,0	1,8	3,8
J01MA12	Levofloxacine	0,0	0,0	0,0	1,2	11,7
J01MA06	Norfloxacine	0,0	0,0	0,3	0,7	7,3
J01XA	Glycopeptides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA01	Vancomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA02	Teicoplanine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX09	Daptomycine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XB01	Colistine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XA+XX08+XX09+XX11	Anti-SRM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01XX01	Fosfomycine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
P01AB	Imidazoles voie orale	0,0	0,0	0,1	1,8	2,4
J01XD	Imidazoles voie injectable	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
J01B	Phénicoles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J04	Rifampicine	0,0	0,0	0,0	0,5	13,4
A07AA12	Fidaxomicine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J01	Consommation ATB systémiques	35,1	40,5	58,7	74,6	125,7
J01+P01AB+J04+A07AA12	Consommation ATB totale	35,3	50,2	59,1	76,4	128,7