

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE


16 février 2022 / N°154

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 14 février 2023.

Chiffres clés

En semaine 06 (06-12 février 2023)

En comparaison avec S05 (30 jan.-05 fév. 2023)



Au 13 février 2023

En comparaison avec le 06 février 2022



*S06 : données non consolidées. La valeur des indicateurs sera actualisée dans le prochain Point épidémiologique.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 06, les indicateurs virologiques étaient à un niveau faible et continuaient à baisser. Néanmoins, les indicateurs de recours aux soins en ville étaient stables et ceux auprès des urgences en légère augmentation. Les nouvelles hospitalisations et les décès poursuivaient leur diminution.

• Métropole :

- taux d'incidence et de positivité en diminution dans la majorité des classes d'âge et des régions
- stabilisation des taux d'incidence et de positivité chez les 60 ans et plus
- taux d'hospitalisation en baisse dans la majorité des régions
- nombre de décès en diminution

• Outre-mer :

- taux d'incidence et de positivité en diminution dans la majorité des régions
- taux d'hospitalisation à un niveau très faible

Variants

- BA.5 restait majoritaire, mais diminuait (74% des séquences lors de l'enquête Flash S04) ; avec une stabilisation du sous-lignage BQ.1.1 (59% pour Flash S04 vs 60% pour S03)
- Le recombinant XBB a augmenté à 14% (vs 9% pour Flash S03), avec 11% de XBB.1.5 (vs 7%)
- L'ensemble des sous-lignages d'Omicron décrits actuellement présente des caractéristiques similaires

Prévention

- Vaccination au 13 février 2023 (données Vaccin Covid) :
 - 22,2% des 60-79 ans avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron (26,8% parmi les éligibles) ; ils étaient respectivement 24,9% et 28,5% chez les 80 ans et plus ;
 - 27,4% des 60-79 ans et 18,8% des 80 ans et plus avaient reçu une dose datant de moins de 6 et 3 mois respectivement
- Dans le contexte d'une circulation toujours active du SARS-CoV-2 et des virus hivernaux, il reste recommandé de maintenir l'adhésion aux mesures combinées :
 - vaccination à jour contre la COVID-19, notamment par une dose de rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron) pour les éligibles primovaccinés, ainsi que contre la grippe ;
 - maintien de l'application des gestes barrières, notamment en cas de test positif et/ou de symptômes.

Semaine 06 (du 06 au 12 février 2023)

POINT DE SITUATION

En semaine 06, les indicateurs virologiques étaient à un niveau faible et continuaient à diminuer sur le territoire national chez les moins de 60 ans tandis qu'une stabilisation des taux d'incidence et de positivité était globalement observée chez les 60 ans et plus*. Néanmoins, les indicateurs de recours aux soins en ville étaient stables et ceux auprès des urgences en légère augmentation. Les nouvelles hospitalisations et les décès poursuivaient leur diminution. Au 13 février, seuls 22,2% des 60-79 ans et 24,9% des 80 ans et plus avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron. Compte tenu de la circulation toujours active de plusieurs virus respiratoires, un renforcement de la vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe chez les personnes ciblées reste nécessaire. L'adhésion aux gestes barrières et aux autres mesures préconisées reste recommandée, notamment en cas de symptômes ou de test positif, ainsi que pour protéger les personnes vulnérables.

Les taux d'incidence et de positivité poursuivaient leurs diminutions chez les moins de 60 ans et étaient stables chez les 60 ans et plus, malgré une très légère augmentation chez les 80-89 ans. Le taux de dépistage diminuait dans l'ensemble des classes d'âge. Les recours pour suspicion de COVID-19 tous âges étaient en légère hausse aux urgences et stables chez SOS Médecins. En France métropolitaine, les taux d'incidence et de positivité étaient en diminution ou restaient stables selon les régions. Les nouvelles hospitalisations et les décès étaient en diminution dans la majorité des régions. En Outre-mer, les taux d'incidence et de positivité, ainsi que le nombre de nouvelles hospitalisations, étaient en diminution dans la plupart des régions.

Depuis l'émergence d'Omicron fin 2021, une diversification génétique importante et rapide est observée au sein de ce variant et de ses sous-lignages successifs. Cependant, tous les sous-lignages d'Omicron décrits jusqu'ici gardent des caractéristiques très similaires, et restent donc tous inclus au sein de celui-ci. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) restait majoritaire mais continue à diminuer avec 74% des séquences interprétables de l'enquête Flash S04 du 23/01/2023 (vs 78% pour Flash S03). Parmi les sous-lignages de BA.5, la détection de BQ.1.1 (ses sous-lignages inclus) semble se stabiliser avec 59% des séquences interprétables de Flash S04-2023 (vs 60% pour Flash S03). En parallèle, on observait une stabilisation des sous-lignages de BA.2 (11% pour Flash S03 et Flash S04-2023) et une augmentation du recombinant XBB (de 9% pour Flash S03 à 14% pour Flash S04-2023). Parmi les sous-lignages du recombinant XBB, XBB.1.5 augmentait le plus rapidement, de 7% pour Flash S03 à 11% pour Flash S04-2023. Ces dynamiques de circulation entre les sous-lignages d'Omicron observées mi-janvier n'ont pour l'instant pas impacté la dynamique épidémique.

Le niveau des rappels vaccinaux poursuivait sa lente progression. Au 13 février 2023, 22,2% des 60-79 ans et 24,9% des 80 ans et plus avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron (26,8% et 28,5% respectivement parmi les éligibles**). Par ailleurs, 27,4% des 60-79 ans avaient reçu une injection datant de moins de 6 mois** et 18,8% des 80 ans et plus une dose datant de moins de 3 mois***. Les couvertures vaccinales chez les professionnels de santé pour la primo-vaccination complète, la première dose de rappel et le rappel adapté au variant Omicron étaient estimées respectivement à 95,6%, 86,3% et 13,0% chez ceux exerçant en Ehpad, 97,7%, 88,9% et 14,1% chez les libéraux, et 96,6%, 88,4% et 14,5% chez ceux exerçant en établissement de santé****.

* Du fait d'une évolution possible du recours au dépistage, notamment en lien avec la modification du dispositif d'indemnisation dérogatoire des arrêts de travail à compter du 1^{er} février 2023, ces indicateurs peuvent être sous-estimés et doivent être interprétés avec prudence. ** La méthode a été précédemment décrite dans le PE n°145. *** Tous vaccins confondus. **** La méthode a été précédemment décrite dans le PE n°147.

Graphiques et tableaux

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur le tableau de bord et téléchargez le rapport hebdomadaire publié en complément regroupant :

[InfoCovidFrance](#)

- les indicateurs hospitaliers ;
- les indicateurs en ESMS (Établissements sociaux et médico-sociaux) ;
- les données virologiques au niveau national ;
- les données virologiques au niveau régional ;
- les données concernant les variants ;
- les données sur la couverture vaccinale.

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)