

Tuberculosis (BCG)

La vacunación contra la tuberculosis se recomienda con mayor frecuencia a partir del mes de edad y hasta los 15 años en niños con un alto riesgo de tuberculosis.

Difteria-Tétanos-Poliomielitis (DTP)

Los refuerzos para adultos están recomendados a edades fijas —a los 25, 45 y 65 años— y, en lo sucesivo, cada diez años.

Tos ferina

El refuerzo para adultos contra la tos ferina se administra a los 25 años, con posible puesta al día hasta los 39 años. Se recomienda la vacunación contra la tos ferina en mujeres embarazadas a partir del 2.º trimestre del embarazo para proteger al bebé.

Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)

En el caso de los niños que no hayan sido vacunados antes de los 6 meses, es posible administrar una vacuna de puesta al día hasta los 5 años de edad con la vacuna monovalente (de 1 a 3 dosis según la edad).

Hepatitis B

Si la vacuna no se ha administrado durante el 1.º año de vida, se podrá administrar hasta los 15 años, inclusive. A partir de los 16 años, está recomendada únicamente en el caso de las personas con riesgo de hepatitis B.

Neumococo

Pasados los 24 meses de edad, esta vacuna está recomendada para niños y adultos en riesgo.

Sarampión-Paperas-Rubéola (SaRuPa)

Para las personas nacidas después de 1980, estar al día significa haber recibido dos dosis de la vacuna.

Meningococo C

A partir de los 12 meses de edad y hasta los 24 años, inclusive, se recomienda administrar una única dosis a quienes aún no estén vacunados.

Rotavirus

Recomendada para todos los bebés a partir de 2 meses. Se necesitan de dos a tres dosis (por vía oral), dependiendo de la vacuna.

Meningococo B

Es posible la puesta al día hasta la edad de 2 años en el caso de los bebés que no hayan recibido las tres dosis de vacunas recomendadas a los 3, 5 y 12 meses.

Virus del papiloma humano (VPH)

La vacunación está recomendada para niñas y niños de 11 a 14 años con puesta al día hasta los 19 años inclusive. Además, la vacunación está recomendada en el caso de los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) hasta los 26 años de edad.

Gripe

La vacunación está recomendada, cada año, especialmente en el caso de las personas con riesgo de complicaciones: personas de 65 años o más, personas con ciertas enfermedades crónicas, incluidos niños a partir de 6 meses, mujeres embarazadas y personas que padecen obesidad (IMC > 40 kg/m²). La vacuna contra la gripe ahora se ofrecerá a todos los niños de entre 2 y 17 años.

Covid-19

En otoño, además de las personas de riesgo a las que se dirige la vacunación contra la gripe, también se vacuna contra la covid-19 a las personas con trastornos psiquiátricos, demencia o trisomía 21.

En primavera, se recomienda la vacunación a las personas de 80 años o más, a los residentes en EHPAD (residencias para personas mayores dependientes) y USLD (unidades de cuidados de larga duración), así como a las personas inmunodeprimidas de todas las edades.

Herpes zóster

Se recomienda la vacunación a partir de 65 años.

Más información



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

