



## 结核病疫苗 (卡介苗)

针对结核病高危儿童，通常建议从1个月大开始接种结核病疫苗，直到15岁为止。

## 白喉-破伤风-脊髓灰质炎疫苗 (DTP)

建议成人的疫苗补种在25、45、65岁等固定年龄进行，之后每十年接种一次。

## 百日咳

建议成人预防百日咳的疫苗补种在25岁时进行，到39岁之前仍是可行的。建议孕妇在怀孕从第4个月起接种百日咳疫苗，以保护新生儿。

## B型流感嗜血杆菌疫苗 (Hib)

对于6个月前未接种过疫苗的儿童，可以使用单价疫苗进行补种，补种年龄范围直至5岁（1至3剂，视年龄而定）。

## 乙型肝炎疫苗

如果出生第1年内未进行疫苗接种，那么可以在15岁（含）之前接种。16岁及以上人群，仅建议处于乙型肝炎风险中的人接种。

## 肺炎球菌疫苗

大于24个月的人群，建议有风险的儿童和成人接种此疫苗。

## 麻疹-腮腺炎-风疹疫苗 (MMR)

对于1980年后出生的人来说，完成最新的接种意味着已经接种了两剂疫苗。

## C型脑膜炎球菌疫苗

从12个月大到24岁（含），如果尚未接种疫苗，建议单剂接种。

## 轮状病毒疫苗

建议所有2个月以上的婴儿接种。根据不同的疫苗类型，需要两到三剂（口服）。

## B型脑膜炎球菌疫苗

对于在3、5和12个月大时未接种三剂推荐疫苗的婴儿，可以在2岁之前进行补种。

## 人乳头瘤病毒 (HPV)

疫苗接种建议适用于11到14岁的女孩和男孩，并可在包括19岁在内的范围内进行补种。此外，建议26岁以下的男同性恋者 (MSM) 接种疫苗。

## 流感疫苗

建议每年接种疫苗，特别是对于有并发症风险的人群：65岁及以上的老年人、某些慢性病患者，包括6个月以上的儿童、孕妇和肥胖症患者 (BMI > 40 kg m<sup>2</sup>)。从现在开始，建议所有2岁至17岁的儿童全部接种流感疫苗。

## 新冠肺炎

在秋季，除了针对流感接种的高危人群外，患有精神疾病、痴呆症或21三体综合征的人也被列为新冠疫苗接种的目标对象。

在春季，建议对80岁及以上的人、EHPAD（长期护理机构）和USLD（持续护理医院）的居民以及免疫受损的人进行疫苗接种，无论其年龄如何。

## 带状疱疹

疫苗接种建议适用于65岁及以上的人。

了解更多信息



VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

