

Tableau 2.a. Prévalences et évolutions de l'adoption systématique des 4 mesures d'hygiène pendant le confinement selon les profils sociodémographiques (% ; données pondérées). Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020

		Adoption systématique des 4 mesures d'hygiène ¹					
		Période de confinement					
Période de recueil des données		23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai
Numéro de vague d'enquête		V1	V2	V3	V4	V5	V6
Nombre de personnes interrogées		2000	2003	2010	2000	2000	2000
Profils sociodémographiques		%	%	%	%	%	%
Ensemble		--	49,9	46,8	45,9	43,2	44,4
			***	***	***	***	***
Sexe	Homme	--	41,5	38,0	40,2	35,5	35,3
	Femme	--	57,6	54,8	51,1	50,2	52,7
			**		***	***	*
Age	De 18 à 24 ans	--	38,0	40,3	34,1	39,4	40,4
	De 25 à 34 ans	--	48,5	44,8	39,6	33,0	44,0
	De 35 à 49 ans	--	49,9	48,9	49,1	44,6	46,9
	De 50 à 64 ans	--	54,4	48,4	48,5	48,0	48,2
	De 65 ans et plus	--	51,4	46,8	48,9	45,0	39,8
CSP en 3 classes (retraités et chômeurs recodés)							
	CSP +	--	48,3	46,4	46,1	43,8	42,0
	CSP -	--	52,4	47,7	47,9	42,6	47,6
	Inactifs	--	48,7	45,4	38,7	42,8	43,7
Niveau de diplôme							
	Inférieur au Bac	--	51,5	46,2	47,3	43,4	46,4
	Supérieur ou égal au Bac	--	49,3	47,0	45,3	43,1	43,6
Littératie en santé (évaluation de l'information en santé) ²			***	***	***	***	***
	Faible (< médiane)	--	44,1	39,5	39,3	36,6	36,6
	Bonne (≥ médiane)	--	54,4	53,0	51,5	48,9	51,2
Découpage de la France en 5 zones							
	Nord-Ouest	--	47,1	46,3	47,3	41,9	44,7
	Sud-Ouest	--	52,4	50,2	43,6	44,6	44,9
	Sud-Est	--	51,6	47,1	44,9	42,0	45,3
	Nord-Est	--	53,1	43,9	49,0	43,2	43,4
	Ile-de-France	--	44,9	47,1	44,0	44,5	43,9
Catégorie d'agglomération							
	Semi rural, rural	--	50,6	45,5	47,2	43,4	44,5
	Urbain	--	49,2	48,2	44,3	43,0	44,3
Situation financière perçue							
	Bonne situation financière	--	48,5	44,8	44,9	42,4	44,4
	Situation financière juste	--	50,1	49,3	48,1	45,4	44,4
	Situation financière très difficile	--	53,6	48,8	46,0	42,8	44,5
Vit seul							
	Non	--	50,6	47,7	46,7	44,1	45,1
	Oui	--	47,7	43,3	43,1	40,3	41,8
Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins				**			*
	Non	--	49,0	44,7	45,0	43,6	42,7
	Oui	--	52,3	51,7	48,3	42,1	48,5
Antécédents de trouble psychologique							
	Non	--	50,9	47,4	46,2	43,4	44,9
	Oui	--	45,6	44,1	44,5	42,4	42,0
Statut tabagique							
	Fumeur	--	48,7	--	--	45,2	--
	Non-fumeur	--	50,3	--	--	42,7	--
Consommation actuelle d'alcool			***			***	
	Quotidienne	--	37,4	--	--	38,3	--
	Régulière	--	46,8	--	--	36,6	--
	Non régulière	--	50,9	--	--	42,7	--
	Jamais	--	55,3	--	--	50,1	--

Notes : -- données indisponibles ; Les évolutions entre les vagues sont testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de ,05), **Les chiffres (%) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente, Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente**, * les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques (colonne de gauche) et l'adoption des 4 mesures d'hygiène pour chacune des vagues, *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ 4 mesures d'hygiène : Se laver régulièrement les mains ; Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ; Tousser dans son coude ; Utiliser un mouchoir à usage unique.

² La littératie en santé désigne la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information pour prendre des décisions concernant leur santé (échelle Health Literacy Questionnaire).

Lecture du tableau :

Ex. 1 : La proportion de répondants adoptant systématiquement les 4 mesures d'hygiène était de 49,9% en vague 2 (V2). Cette proportion a significativement diminué en vague 3 (46,8%).

Ex. 2 : En V2 l'adoption des 4 mesures d'hygiène n'est pas différente entre les répondants qui ont des enfants de 16 ou moins (52,3%) et ceux qui n'en ont pas (49,0%). En V3, ces comportements sont significativement différents avec une baisse significative de la proportion chez les non parents (44,7% en V3).