

Tableau 5. Prévalences et évolutions des pensées suicidaires selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (% ; données pondérées)
Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021



		Pensées suicidaires ¹ (au cours des 12 derniers mois)											
		Confinement 2						Conf. 3					
Période de recueil des données		4-6 nov. 2020	23-25 nov. 2020	14-16 dec. 2020	18-20 janv. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	21-28 juin 2021	15-21 juillet 2021	31 août-7 sept. 2021	28 sept.-5 oct. 2021
Numéro de vague d'enquête		V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28
Nombre de personnes interrogées		2000	2000	2000	2000	2000	2001	2001	2000	2000	2000	2001	2001
Profils sociodémographiques		%											
Ensemble		--	--	--	--	8,2	9,0	9,4	8,5	9,2	9,1	9,8	9,7
Sexe		* ** **											
Homme		--	--	--	--	9,5	9,2	10,2	7,5	7,3	11,1	9,2	10,6
Femme		--	--	--	--	7,1	8,7	8,7	9,3	10,9	7,3	10,4	8,8
Age		** *** **											
De 18 à 24 ans		--	--	--	--	10,9	18,1	18,1	15,7	20,1	18,8	18,9	17,8
De 25 à 34 ans		--	--	--	--	8,9	10,3	10,4	10,2	9,9	11,9	18,4	15,4
De 35 à 49 ans		--	--	--	--	11,1	12,2	13,0	8,8	11,2	8,6	8,7	10,5
De 50 à 64 ans		--	--	--	--	7,0	7,1	8,2	9,5	6,9	8,0	7,7	6,0
65 ans et plus		--	--	--	--	4,8	2,6	2,5	3,0	4,3	4,9	3,7	5,4
CSP en 2 classes (avec retraités et chômeurs recodés)		***											
CSP +		--	--	--	--	7,1	6,8	7,9	8,1	8,4	7,4	7,9	8,6
CSP -		--	--	--	--	9,1	8,5	9,8	6,5	8,0	8,5	10,2	9,9
Situation professionnelle		** *** **											
Travail		--	--	--	--	9,2	8,9	11,1	8,8	9,2	9,6	10,8	10,5
Etudes		--	--	--	--	10,1	13,6	18,1	21,4	23,4	21,7	20,9	17,5
Chômage		--	--	--	--	14,3	20,7	13,0	15,7	13,4	12,4	16,8	19,5
Retraite		--	--	--	--	4,3	3,2	3,5	3,2	5,3	4,4	3,9	4,9
Inactif		--	--	--	--	9,9	18,7	10,9	13,6	12,4	13,7	13,1	8,8
Situation financière perçue		*** **											
Bonne situation financière		--	--	--	--	5,3	4,6	7,2	6,6	5,7	5,9	6,6	7,8
Situation financière juste		--	--	--	--	7,6	9,3	8,6	8,0	9,8	10,0	11,5	8,1
Situation financière très difficile		--	--	--	--	16,0	20,1	17,4	15,0	18,3	18,0	17,9	17,4
Vit seul		* * * **											
Non		--	--	--	--	7,4	8,3	8,9	7,9	8,4	8,7	8,6	8,1
Oui		--	--	--	--	11,1	11,2	11,0	10,6	11,1	10,3	13,0	14,1
Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins		** **											
Non		--	--	--	--	7,7	8,7	8,6	7,8	8,5	8,0	9,3	9,0
Oui		--	--	--	--	9,4	9,5	11,5	10,2	10,6	11,5	10,9	11,3
Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19 ²		** ** *											
Non		--	--	--	--	6,9	7,5	9,0	8,2	8,5	8,3	8,5	8,6
Oui		--	--	--	--	10,7	11,7	10,1	9,0	10,4	10,3	12,0	11,7
Antécédents de trouble psychologique		*** **											
Non		--	--	--	--	4,7	5,8	6,2	5,2	5,5	5,9	5,2	5,4
Oui		--	--	--	--	22,7	21,8	23,2	22,2	23,1	21,8	26,1	24,7
Conditions de vie liées à l'épidémie		%											
Condition de travail (population active)		**											
En télétravail		--	--	--	--	9,1	7,0	9,2	11,1	--	--	--	--
En entreprise		--	--	--	--	9,1	8,8	11,3	8,0	--	--	--	--
Au chômage partiel		--	--	--	--	7,9	9,0	3,6	15,1	--	--	--	--
En arrêt de travail		--	--	--	--	13,3	16,1	26,7	12,9	--	--	--	--
Logement avec forte promiscuité		* ** **											
Non		--	--	--	--	8	8,4	9,3	7,8	8,3	8,4	8,5	8,8
Oui		--	--	--	--	11,5	15,4	10,0	16,4	18,5	18,0	26,2	21,2
Avoir un soutien moral ou affectif		* * ** *											
Non		--	--	--	--	9,3	8,7	9,2	9,7	8,4	7,6	8,0	8,3
Oui		--	--	--	--	7,2	9,2	9,6	7,1	10,4	11,4	12,4	11,0
Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19		* *** **											
Non		--	--	--	--	7,6	7,6	8,0	7,0	7,8	7,1	7,0	7,8
Oui		--	--	--	--	10,9	15,0	14,6	14,4	14,7	16,0	20,6	17,1

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).

Les pourcentages en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les pourcentages en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.

Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques (colonne de gauche) et les problèmes de sommeil pour chacune des vagues : *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ Question posée à partir de la vague 21 (15-17 février) : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà pensé à vous suicider ? (oui/non)

² Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphysème ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30).

Lecture du tableau :

Ex. : La proportion de personnes en situation d'inactivité professionnelle déclarant des pensées suicidaires présente une évolution défavorable entre la vague 21 (9,9%) et la vague 22 (18,7%). Les pensées suicidaires survenues au cours des 12 derniers mois ont été mesurées à partir de la vague 21.