


ENTRED

Échantillon National Témoin
Représentatif des personnes Diabétiques



Résultats détaillés du questionnaire long patient Par type de diabète et traitement

Réalisé par :

Isabelle ROMON
Sandrine FOSSE
ANNE FAGOT-CAMPAGNA

Pour le comité scientifique ENTRED

Date de mise à jour : 1^{er} Août 2005

Pour commentaires : entred@invs.sante.fr



Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 1. Caractéristiques socio-économiques des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

	ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635		
	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	
	Age (ans)	63.6*	[63.2-64.0]	43.2*	[41.5-44.9]	65.2*	[64.8-65.5]	67.5*	[66.7-68.3]
<45 ans	7.4%	[6.5-8.2]	60.4%	[54.2-66.7]	3.3%	[2.7-4.0]	2.0%	[0.9-3.1]	
45-54 ans	16.6%	[15.4-17.8]	21.3%	[16.0-26.5]	15.9%	[14.7-17.2]	13.2%	[10.6-15.9]	
55-64 ans	25.3%	[23.9-26.7]	8.9%	[5.3-12.6]	26.6%	[25.1-28.1]	22.0%	[18.8-25.3]	
65-74 ans	33.3%	[31.8-34.8]	7.7%	[4.3-11.1]	35.3%	[33.7-36.9]	36.5%	[32.8-40.3]	
75-84 ans	15.4%	[14.2-16.5]	1.7%	[0.0-3.4]	16.5%	[15.3-17.8]	21.3%	[18.1-24.4]	
85 ans et plus	2.1%	[1.7-2.6]			2.3%	[1.8-2.8]	4.9%	[3.2-6.6]	
Hommes	54.2%	[52.6-55.8]	57.4%	[51.1-63.8]	53.8%	[52.1-55.5]	50.6%	[46.7-54.4]	
Vit seul	26.5%	[25.1-28.0]	18.3%	[13.4-23.2]	27.1%	[25.6-28.7]	30.8%	[27.2-34.4]	
Vit en institution	1.7%	[1.2-2.1]	0.9%	[0.0-2.1]	1.7%	[1.3-2.2]	3.1%	[1.7-4.6]	
Niveau d'étude									
	Certificat d'études primaires ou moins	50.3%	[48.5-52.0]	16.4%	[11.6-21.3]	53.1%	[51.3-54.9]	59.3%	[55.2-63.4]
	Brevet des collèges ou niveau 3ème	8.4%	[7.4-9.3]	5.3%	[2.4-8.3]	8.6%	[7.6-9.7]	7.2%	[5.1-9.4]
	Brevet professionnel ou CAP	21.1%	[19.7-22.6]	27.6%	[21.7-33.4]	20.5%	[19.0-22.0]	17.7%	[14.5-20.9]
	BAC	9.7%	[8.7-10.7]	20.9%	[15.6-26.2]	8.8%	[7.8-9.9]	8.1%	[5.9-10.4]
	BAC + 2 ans	10.6%	[9.5-11.6]	29.8%	[23.8-35.8]	9.0%	[7.9-10.0]	7.6%	[5.4-9.8]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 1. Caractéristiques socio-économiques des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%
Situation professionnelle actuelle	En activité	19.2%	[17.9-20.5]	59.0%	[52.7-65.3]	16.1%	[14.8-17.3]	10.4%	[8.0-12.8]
	Au chômage	5.1%	[4.4-5.8]	10.7%	[6.7-14.6]	4.6%	[3.9-5.4]	3.0%	[1.7-4.3]
	Au foyer	4.2%	[3.6-4.9]	6.4%	[3.3-9.5]	4.0%	[3.3-4.7]	3.1%	[1.8-4.5]
	A la retraite	65.3%	[63.8-66.9]	16.2%	[11.5-21.0]	69.4%	[67.8-71.0]	74.6%	[71.3-78.0]
	Sans activité	6.2%	[5.4-7.0]	7.7%	[4.3-11.1]	5.9%	[5.1-6.7]	8.8%	[6.6-11.0]
Activité professionnelle	Ouvriers non qualifiés	11.4%	[10.2-12.6]	9.5%	[5.6-13.5]	11.4%	[10.2-12.6]	12.7%	[9.7-15.7]
	Ouvriers qualifiés	25.7%	[24.1-27.4]	21.0%	[15.4-26.5]	26.1%	[24.4-27.8]	25.4%	[21.5-29.3]
	Employés	22.3%	[20.7-23.8]	32.4%	[26.1-38.7]	21.4%	[19.8-23.0]	20.6%	[17.0-24.2]
	Professions intermédiaires	9.2%	[8.1-10.2]	13.8%	[9.1-18.5]	8.8%	[7.7-9.9]	8.5%	[6.0-11.0]
	Cadres	14.6%	[13.3-15.9]	16.2%	[11.2-21.2]	14.5%	[13.1-15.9]	10.8%	[8.0-13.6]
	Agriculteurs	0.5%	[0.2-0.7]			0.5%	[0.2-0.8]	0.6%	[0.0-1.3]
	Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	7.7%	[6.7-8.7]	4.8%	[1.9-7.6]	8.1%	[7.1-9.2]	10.6%	[7.9-13.4]
Jamais d activité	8.7%	[7.6-9.7]	2.4%	[0.3-4.4]	9.1%	[8.0-10.2]	10.8%	[8.0-13.6]	
Modification d'activité professionnelle à cause du diabète	10.1%	[9.1-11.1]	29.3%	[23.4-35.3]	8.3%	[7.3-9.3]	19.6%	[16.4-22.9]	

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 1. Caractéristiques socio-économiques des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%
Type de modification d'activité	Travail à temps partiel	14.9%	[11.0-18.7]	17.5%	[8.1-26.8]	14.0%	[9.7-18.4]	15.9%	[9.0-22.8]
(plusieurs réponses possibles)	Réorientation professionnelle	15.8%	[11.8-19.8]	36.5%	[24.6-48.4]	11.2%	[7.2-15.1]	11.2%	[5.2-17.2]
	Invalidité ou longue maladie	58.5%	[53.1-63.9]	34.9%	[23.1-46.7]	64.5%	[58.4-70.5]	65.4%	[56.4-74.4]
	Autre	18.6%	[14.3-22.8]	23.8%	[13.3-34.3]	16.9%	[12.2-21.7]	15.0%	[8.2-21.7]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 2. Caractéristiques liées au diabète des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%
Durée du diabète	0-4 ans	28.5%	[27.0-30.0]	14.5%	[10.0-19.0]	29.6%	[28.0-31.2]	13.2%	[10.5-15.9]
	5-9 ans	19.2%	[17.9-20.5]	17.9%	[13.0-22.8]	19.4%	[18.1-20.8]	13.2%	[10.5-15.9]
	10-19 ans	29.3%	[27.8-30.8]	27.2%	[21.5-32.9]	29.3%	[27.7-30.9]	34.6%	[30.8-38.3]
	20 ans et plus	23.0%	[21.6-24.4]	40.4%	[34.2-46.7]	21.6%	[20.2-23.1]	39.0%	[35.1-42.8]
Circonstances de découverte du diabète	Symptômes	19.4%	[18.1-20.7]	64.5%	[58.3-70.7]	15.9%	[14.7-17.2]	22.0%	[18.7-25.3]
	Malaise ou coma	5.7%	[4.9-6.4]	9.1%	[5.4-12.8]	5.5%	[4.7-6.3]	9.2%	[6.9-11.5]
	Complications	9.7%	[8.7-10.7]	2.2%	[0.3-4.0]	10.4%	[9.3-11.5]	8.6%	[6.3-10.8]
	Grossesse	2.0%	[1.6-2.5]	5.2%	[2.3-8.1]	1.8%	[1.3-2.3]	3.0%	[1.6-4.3]
	Analyse sang/urine	56.4%	[54.8-58.1]	15.6%	[10.9-20.3]	60.0%	[58.3-61.7]	46.9%	[42.9-50.8]
	Autres	6.7%	[5.9-7.6]	3.5%	[1.1-5.8]	6.4%	[5.6-7.3]	10.4%	[7.9-12.8]
Antécédents familiaux de diabète		52.6%	[50.8-54.4]	27.3%	[21.5-33.1]	55.1%	[53.2-57.0]	53.0%	[48.6-57.3]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 3. Complications microvasculaires et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%	Fréquences (%)	IC 95%
RETINOPATHIE									
Perte de la vue d'un oeil	Prévalence 2002	3.9%	[3.2-4.5]	3.1%	[0.8-5.4]	4.0%	[3.3-4.7]	6.5%	[4.6-8.5]
	Prévalence 2001	3.4%	[2.8-4.0]	3.1%	[0.8-5.4]	3.5%	[2.9-4.2]	5.6%	[3.7-7.4]
Fond d'oeil fait	Prévalence 2002	82.4%	[81.1-83.6]	97.0%	[94.8-99.2]	81.2%	[79.8-82.5]	91.5%	[89.3-93.7]
	Prévalence 2001	72.1%	[70.6-73.6]	84.6%	[79.9-89.4]	71.1%	[69.5-72.7]	79.7%	[76.5-83.0]
	Incidence 2001	42.6%	[40.9-44.2]	60.6%	[54.2-67.1]	41.0%	[39.3-42.7]	52.2%	[48.2-56.3]
Antécédent de traitement par laser	Prévalence 2002	16.4%	[15.2-17.6]	28.0%	[22.2-33.8]	15.3%	[14.1-16.6]	29.3%	[25.8-32.9]
	Prévalence 2001	14.5%	[13.4-15.7]	26.0%	[20.3-31.6]	13.5%	[12.3-14.7]	26.4%	[22.9-29.8]
NEUROPATHIE									
Antécédent de mal perforant plantaire	Prévalence 2002	7.5%	[6.7-8.4]	6.9%	[3.6-10.1]	7.4%	[6.5-8.3]	14.3%	[11.5-17.0]
	Prévalence 2001	6.0%	[5.2-6.8]	6.5%	[3.3-9.6]	5.9%	[5.1-6.7]	11.1%	[8.6-13.6]
Antécédent d'amputation	Prévalence 2002	1.8%	[1.3-2.2]	2.1%	[0.3-4.0]	1.7%	[1.2-2.1]	5.0%	[3.3-6.7]
	Prévalence 2001	1.4%	[1.0-1.8]	2.1%	[0.3-4.0]	1.3%	[0.9-1.7]	3.9%	[2.4-5.5]
Examen des pieds par le médecin au monofilament en 2001		20.1%	[18.7-21.4]	36.4%	[30.2-42.6]	18.6%	[17.2-19.9]	32.9%	[29.1-36.7]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 3. Complications microvasculaires et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%
Autoexamen des pieds	Tous les jours	31.2%	[29.7-32.8]	32.3%	[26.2-38.4]	31.0%	[29.4-32.6]	40.3%	[36.4-44.3]
	Au moins 1 fois/semaine	34.9%	[33.3-36.5]	36.8%	[30.4-43.1]	34.6%	[32.9-36.3]	36.6%	[32.7-40.5]
	Au moins 1 fois/mois	8.2%	[7.3-9.2]	11.7%	[7.4-15.9]	8.0%	[7.0-8.9]	8.3%	[6.1-10.5]
	Moins d'1 fois/mois	3.5%	[2.9-4.1]	6.7%	[3.4-10.0]	3.4%	[2.7-4.0]	2.0%	[0.9-3.2]
	Jamais	22.1%	[20.7-23.5]	12.6%	[8.2-16.9]	23.0%	[21.6-24.5]	12.7%	[10.0-15.4]
Consultations de podologie/pédicure en 2001	Au moins 1 consultation	31.1%	[29.3-33.0]	30.5%	[24.2-36.9]	31.2%	[29.3-33.2]	47.6%	[42.8-52.3]
	Au moins 3 consultations	13.0%	[11.7-14.4]	8.4%	[4.6-12.2]	13.4%	[12.0-14.9]	23.8%	[19.7-27.8]
- Nombre de consultations		3.3*	[3.1-3.6]	2.5*	[1.7-3.3]	3.4*	[3.1-3.7]	4.0*	[3.3-4.6]
NEPHROPATHIE									
Insuffisance rénale terminale (greffe ou dialyse)	Prévalence 2002	0.9%	[0.6-1.2]	2.6%	[0.5-4.6]	0.7%	[0.4-1.0]	1.8%	[0.7-2.8]
	Prévalence 2001	0.5%	[0.3-0.8]	2.2%	[0.3-4.0]	0.4%	[0.2-0.6]	1.3%	[0.4-2.2]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 4. Facteurs de risque vasculaire, complications cardiovasculaires, et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

	ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%
TABAGISME								
Tabagisme actuel ou passé	49.9%	[48.3-51.6]	57.0%	[50.6-63.4]	49.1%	[47.3-50.8]	46.5%	[42.6-50.5]
Tabagisme actuel	15.9%	[14.7-17.1]	34.8%	[28.6-40.9]	14.3%	[13.0-15.5]	13.2%	[10.6-15.9]
- Durée du tabagisme actuel (ans)	30.3*	[29.1-31.5]	19.6*	[17.5-21.7]	32.4*	[31.0-33.7]	36.5*	[33.2-39.8]
- Nombre de cigarettes par jours	16.7*	[15.8-17.7]	16.4*	[14.8-18.0]	16.6*	[15.5-17.8]	17.3*	[13.9-20.7]
- Arrêt du tabac conseillé par le médecin	74.7%	[70.8-78.5]	84.7%	[76.4-93.0]	73.2%	[68.9-77.6]	72.6%	[62.4-82.8]
- Tentative antérieure d arrêt du tabac	72.5%	[68.5-76.5]	73.2%	[62.9-83.5]	73.1%	[68.7-77.5]	65.2%	[54.0-76.5]
Tabagisme passé	45.0%	[43.1-46.9]	25.6%	[19.6-31.7]	46.6%	[44.6-48.6]	45.6%	[41.0-50.2]
- Délai depuis l'arrêt du tabac (ans)	17.6*	[17.0-18.3]	11.8*	[9.3-14.3]	17.8*	[17.2-18.5]	18.8*	[17.2-20.4]
HYPERTENSION ARTERIELLE								
Hypertension artérielle connue	54.3%	[52.6-55.9]	27.9%	[22.1-33.7]	56.4%	[54.7-58.1]	57.0%	[53.1-60.9]
-Type de traitement								
Médicaments	95.6%	[94.7-96.6]	95.3%	[90.1-100.0]	95.6%	[94.7-96.6]	94.7%	[92.3-97.1]
Régime seul	1.9%	[1.3-2.5]	1.6%	[0.0-4.6]	1.9%	[1.2-2.5]	2.4%	[0.7-4.0]
Pas de traitement	2.5%	[1.8-3.2]	3.1%	[0.0-7.4]	2.5%	[1.8-3.3]	3.0%	[1.2-4.8]
DYSLIPIDEMIE								
Hypercholestérolémie connue	51.2%	[49.6-52.9]	27.4%	[21.6-33.1]	53.2%	[51.5-54.9]	50.1%	[46.1-54.0]
-Type de traitement								
Médicaments	82.7%	[80.9-84.4]	67.2%	[55.7-78.7]	83.1%	[81.3-84.9]	84.6%	[80.5-88.7]
Régime seul	9.6%	[8.3-11.0]	9.4%	[2.2-16.5]	9.7%	[8.2-11.1]	8.1%	[5.0-11.1]
Pas de traitement	7.7%	[6.5-9.0]	23.4%	[13.1-33.8]	7.2%	[6.0-8.5]	7.4%	[4.4-10.4]

Facteur de risque: surpoids, obésité, tabagisme actuel, hypercholestérolémie, hypertension artérielle

\$ Complication microvasculaire: prévalence 2001 de sécheresse de la rétine, perte de la vue d'un oeil, dialyse, greffe rénale, mal perforant plantaire ou amputation

& Complication macrovasculaire: prévalence 2001 d'angor, infarctus du myocarde, pontage ou angioplastie coronaire"

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 4. Facteurs de risque vasculaire, complications cardiovasculaires, et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

	ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635		
	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	
Cholestérolémie mesurée en 2001	84.9%	[83.7-86.1]	76.0%	[70.5-81.5]	85.6%	[84.4-86.8]	87.5%	[84.9-90.1]	
CORONAROPATHIE									
Antécédent d'angor ou d infarctus	Prévalence 2002	16.8%	[15.6-18.0]	7.7%	[4.3-11.1]	17.5%	[16.2-18.8]	26.3%	[22.9-29.8]
	Prévalence 2001	15.3%	[14.1-16.5]	6.9%	[3.6-10.1]	16.0%	[14.7-17.3]	24.3%	[20.9-27.8]
Antécédent de chirurgie ou plastie coronaire	Prévalence 2002	9.7%	[8.7-10.7]	5.6%	[2.6-8.5]	10.0%	[9.0-11.1]	16.0%	[13.1-18.9]
	Prévalence 2001	8.5%	[7.6-9.4]	5.1%	[2.3-8.0]	8.7%	[7.7-9.7]	13.7%	[10.9-16.4]
ECG pratiqué	Prévalence 2002	83.7%	[82.5-84.9]	86.4%	[82.0-90.8]	83.5%	[82.2-84.7]	90.4%	[88.1-92.7]
	Prévalence 2001	74.9%	[73.5-76.4]	78.4%	[73.1-83.8]	74.5%	[73.0-76.0]	81.1%	[77.9-84.2]
	Incidence 2001	36.6%	[35.0-38.2]	39.2%	[32.9-45.6]	36.1%	[34.4-37.8]	46.1%	[42.1-50.1]
AU MOINS UN FACTEUR DE RISQUE#		93.3%	[92.5-94.1]	77.5%	[72.1-82.9]	94.5%	[93.8-95.3]	93.5%	[91.5-95.4]
AU MOINS UNE COMPLICATION\$&		35.2%	[33.6-36.8]	33.9%	[27.7-40.1]	35.2%	[33.5-36.9]	54.4%	[50.3-58.4]
- Au moins une complication microvasculaire\$		22.0%	[20.6-23.4]	29.5%	[23.5-35.4]	21.3%	[19.8-22.7]	38.2%	[34.2-42.1]
- Au moins une complication macrovasculaire&		17.4%	[16.1-18.6]	7.7%	[4.3-11.2]	18.2%	[16.8-19.5]	27.7%	[24.1-31.3]

Facteur de risque: surpoids, obésité, tabagisme actuel, hypercholestérolémie, hypertension artérielle

\$ Complication microvasculaire: prévalence 2001 de séance de laser sur la rétine, perte de la vue d'un oeil, dialyse, greffe rénale, mal perforant plantaire ou amputation

& Complication macrovasculaire: prévalence 2001 d'angor, infarctus du myocarde, pontage ou angioplastie coronaire"

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 5. Activité physique, diététique et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

	ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%
	ACTIVITE PHYSIQUE							
Mobilité (ou activité physique régulière)	85.2%	[84.1-86.4]	89.7%	[85.9-93.6]	84.9%	[83.7-86.1]	80.8%	[77.7-83.9]
Activités ménagères légères dont jardinage et bricolage	68.5%	[66.9-70.0]	72.8%	[66.9-78.6]	68.2%	[66.5-69.8]	64.8%	[61.0-68.7]
- Nombre d'heures par semaine	12.0*	[11.5-12.4]	9.4*	[7.9-11.0]	12.2*	[11.7-12.7]	11.2*	[10.1-12.3]
Loisirs d intensité légère dont promenade déplacements...	52.8%	[51.2-54.5]	57.8%	[51.3-64.2]	52.6%	[50.9-54.4]	51.5%	[47.5-55.6]
- Nombre d'heures par semaine	4.7*	[4.5-5.0]	5.1*	[3.9-6.2]	4.7*	[4.4-5.0]	4.5*	[3.9-5.1]
Activités ménagères ou de loisirs modérées ou soutenues	36.6%	[35.0-38.3]	51.6%	[45.0-58.1]	35.5%	[33.8-37.2]	30.1%	[26.4-33.8]
- Nombre d'heures par semaine	7.9*	[7.3-8.5]	7.8*	[5.8-9.8]	7.9*	[7.3-8.5]	8.2*	[6.6-9.7]
Activité sportive modérée ou soutenue	14.4%	[13.2-15.6]	28.4%	[22.5-34.3]	13.4%	[12.1-14.6]	10.2%	[7.8-12.7]
- Nombre d'heures par semaine	4.3*	[4.0-4.7]	3.6*	[2.8-4.5]	4.4*	[4.0-4.8]	4.9*	[3.7-6.1]
Demande du médecin de faire de l'activité physique	51.2%	[49.6-52.9]	40.3%	[34.0-46.6]	52.2%	[50.5-54.0]	52.5%	[48.4-56.5]
POIDS ET DIETETIQUE								
Indice de masse corporelle (kg/m2)	28.6*	[28.4-28.8]	24.5*	[24.0-25.1]	29.0*	[28.8-29.2]	28.9*	[28.5-29.4]
<25 kg/m2	25.8%	[24.3-27.2]	62.8%	[56.6-69.0]	22.6%	[21.1-24.0]	24.2%	[20.9-27.6]
Surpoids (25-29 kg/m2)	40.4%	[38.8-42.0]	27.8%	[22.0-33.5]	41.5%	[39.8-43.2]	40.7%	[36.8-44.6]
Obésité (≥ 30 kg/m2)	33.9%	[32.3-35.4]	9.4%	[5.7-13.1]	36.0%	[34.3-37.6]	35.1%	[31.3-38.8]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 5. Activité physique, diététique et prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE		TYPE 1		TYPE 2		dont TYPE 2 insulinés	
		N = 3646		N = 235		N = 3324		N = 635	
		Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%
Se pèse	Tous les jours	9.0%	[8.1-10.0]	6.8%	[3.6-10.1]	9.2%	[8.2-10.2]	6.0%	[4.2-7.9]
	Au moins 1 fois/semaine	35.5%	[33.9-37.0]	32.5%	[26.5-38.5]	35.7%	[34.1-37.4]	37.6%	[33.7-41.4]
	Au moins 1 fois/mois	32.7%	[31.2-34.3]	32.1%	[26.1-38.0]	32.8%	[31.1-34.4]	33.3%	[29.6-37.1]
	Moins d'1 fois/mois	14.7%	[13.5-15.9]	19.7%	[14.6-24.8]	14.3%	[13.1-15.5]	15.2%	[12.4-18.0]
	Jamais	8.1%	[7.2-9.0]	9.0%	[5.3-12.6]	8.0%	[7.1-9.0]	7.8%	[5.7-10.0]
Poids estimé	Stable	73.2%	[71.7-74.6]	73.0%	[67.3-78.8]	73.2%	[71.7-74.8]	72.4%	[68.9-75.9]
	En augmentation	12.3%	[11.2-13.4]	18.3%	[13.3-23.3]	11.7%	[10.6-12.8]	16.4%	[13.5-19.3]
	En diminution	12.2%	[11.1-13.3]	7.0%	[3.7-10.2]	12.6%	[11.5-13.8]	8.6%	[6.4-10.8]
	Ne sait pas	2.3%	[1.8-2.8]	1.7%	[0.0-3.4]	2.4%	[1.9-3.0]	2.6%	[1.3-3.9]
Déjà fait dans la vie un régime amaigrissant	39.2%	[37.6-40.8]	19.8%	[14.7-25.0]	40.9%	[39.2-42.6]	36.5%	[32.7-40.3]	
- Régime amaigrissant arrêté	65.8%	[63.1-68.5]	72.1%	[58.7-85.5]	65.8%	[63.0-68.5]	60.9%	[54.1-67.7]	
Demande du médecin de perdre du poids en 2001	50.6%	[49.0-52.3]	20.3%	[15.1-25.4]	53.3%	[51.6-55.1]	47.7%	[43.7-51.7]	
Consultations diététiques en 2001									
Au moins 1 consultation	25.3%	[23.9-26.8]	38.8%	[32.5-45.1]	23.9%	[22.4-25.4]	46.0%	[42.0-49.9]	
Au moins 3 consultations	5.0%	[4.2-5.7]	7.2%	[3.8-10.7]	4.6%	[3.9-5.3]	8.4%	[6.1-10.7]	
- Nombre de consultations	2.0*	[1.9-2.1]	1.8*	[1.5-2.1]	2.0*	[1.9-2.2]	2.0*	[1.7-2.3]	
Prescription écrite d'un régime diététique à cause du diabète	70.3%	[68.8-71.8]	83.7%	[78.9-88.4]	68.9%	[67.3-70.5]	88.2%	[85.7-90.7]	

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 6. Autres caractéristiques et éléments de la prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

	ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635		
	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	
	Hypoglycémies sévères en 2001								
Au moins 1 hypoglycémie sévère	12.3%	[11.2-13.4]	37.2%	[31.0-43.4]	10.2%	[9.1-11.2]	26.5%	[23.0-30.0]	
Au moins 3 hypoglycémies sévères	4.7%	[3.9-5.4]	18.3%	[13.2-23.5]	3.5%	[2.9-4.2]	10.5%	[7.9-13.1]	
- Nombre d'hypoglycémies sévères	5.3*	[4.3-6.3]	8.4*	[5.4-11.3]	4.4*	[3.4-5.4]	4.9*	[3.4-6.4]	
Lecteur glycémique disponible	59.0%	[57.4-60.6]	100.0%		55.2%	[53.5-56.9]	99.5%	[99.0-100.0]	
- Lecteur utilisé	93.3%	[92.3-94.4]	98.3%	[96.6-100.0]	92.5%	[91.3-93.8]	99.3%	[98.7-100.0]	
- Nombre de gluco-tests/semaine	11.8*	[11.3-12.3]	21.7*	[20.1-23.3]	10.1*	[9.6-10.5]	16.2*	[15.5-16.9]	
A déjà entendu parlé de l'HbA1c	48.9%	[47.2-50.5]	87.0%	[82.6-91.3]	45.8%	[44.0-47.5]	55.9%	[52.0-59.9]	
- Connaissance du résultat de l'HbA1c	82.8%	[80.9-84.7]	88.0%	[83.4-92.6]	82.3%	[80.2-84.4]	82.7%	[78.5-87.0]	
Alcool									
Consomme de l'alcool	74.4%	[73.0-75.9]	80.3%	[75.2-85.5]	74.3%	[72.8-75.8]	67.0%	[63.3-70.7]	
Fréquence de la consommation d'alcool	Jamais	27.6%	[26.1-29.0]	20.2%	[15.0-25.4]	27.8%	[26.2-29.3]	35.5%	[31.7-39.3]
	Moins d'1 fois par mois	13.1%	[12.0-14.2]	15.8%	[11.1-20.5]	13.0%	[11.8-14.1]	15.0%	[12.1-17.8]
	Plus d'1 fois par mois	11.9%	[10.9-13.0]	16.2%	[11.4-21.0]	11.7%	[10.6-12.8]	8.9%	[6.6-11.1]
	Plus d'1 fois par semaine	23.7%	[22.3-25.1]	28.1%	[22.2-33.9]	23.6%	[22.1-25.1]	17.9%	[14.9-21.0]
	Tous les jours	23.7%	[22.3-25.1]	19.7%	[14.6-24.9]	24.0%	[22.5-25.5]	22.7%	[19.4-26.0]

Résultats détaillés du questionnaire patient par type de diabète et traitement

**TABLEAU 6. Autres caractéristiques et éléments de la prise en charge des personnes diabétiques traitées.
Questionnaire patient Entred, version longue, N=3646**

		ENSEMBLE N = 3646		TYPE 1 N = 235		TYPE 2 N = 3324		dont TYPE 2 insulinés N = 635	
		Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%	Fréquences (%) ou Moyennes*	IC 95%
- Nombre de verres d'alcool par jour chez les patients buvant tous les jours	1 à 2	54.3%	[50.9-57.7]	42.2%	[27.8-56.7]	54.7%	[51.2-58.3]	67.4%	[59.5-75.3]
	3 à 4	32.4%	[29.2-35.6]	37.8%	[23.6-51.9]	32.4%	[29.1-35.8]	25.9%	[18.5-33.3]
	5 à 6	10.1%	[8.0-12.1]	15.6%	[5.0-26.1]	9.7%	[7.6-11.9]	4.4%	[1.0-7.9]
	7 à 9	2.1%	[1.1-3.1]	2.2%	[0.0-6.5]	2.0%	[1.0-3.0]	1.5%	[0.0-3.5]
	10 ou plus	1.1%	[0.4-1.8]	2.2%	[0.0-6.5]	1.1%	[0.3-1.8]	0.7%	[0.0-2.2]
Existence d'autres maladies que le diabète		55.0%	[53.3-56.6]	36.5%	[30.3-42.7]	56.4%	[54.6-58.1]	56.4%	[52.5-60.4]
Consultations avec un psychologue ou un psychiatre en 2001									
Au moins 1 consultation		6.0%	[5.2-6.8]	18.5%	[13.5-23.4]	5.0%	[4.2-5.7]	6.7%	[4.7-8.7]
Au moins 3 consultations		3.1%	[2.5-3.6]	11.5%	[7.3-15.6]	2.4%	[1.8-2.9]	2.2%	[1.0-3.4]
- Nombre de consultations		8.0*	[6.3-9.6]	8.2*	[4.4-12.0]	7.7*	[5.8-9.7]	4.7*	[2.6-6.8]
Vaccin antigrippal en 2001		65.4%	[63.9-67.0]	58.2%	[51.8-64.5]	66.0%	[64.4-67.7]	77.4%	[74.1-80.6]
Santé jugée	Excellente	2.9%	[2.3-3.4]	3.0%	[0.8-5.3]	2.8%	[2.2-3.3]	2.3%	[1.0-3.5]
	Très bonne	6.3%	[5.5-7.1]	11.3%	[7.2-15.4]	6.0%	[5.1-6.8]	2.6%	[1.3-3.9]
	Bonne	57.6%	[56.0-59.3]	53.0%	[46.6-59.5]	58.2%	[56.5-60.0]	47.3%	[43.2-51.4]
	Médiocre	27.3%	[25.8-28.8]	26.1%	[20.4-31.8]	27.3%	[25.7-28.8]	37.1%	[33.1-41.0]
	Mauvaise	5.9%	[5.1-6.7]	6.5%	[3.3-9.7]	5.8%	[5.0-6.6]	10.7%	[8.2-13.3]