

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 15 - Cantal

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 140	1 458	1 682	998	1 125	460	557
	55-59 ans	3 178	1 448	1 730	269	266	1 179	1 464
	60-64 ans	3 352	1 530	1 822	265	261	1 265	1 561
	65-69 ans	3 881	1 768	2 113	216	200	1 552	1 913
	70-74 ans	2 368	1 028	1 340	101	129	927	1 211
	50-74 ans	15 919	7 232	8 687	1 849	1 981	5 383	6 706
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	180	88	92	66	61	22	31
	55-59 ans	175	78	97	18	24	60	73
	60-64 ans	194	98	96	18	19	80	77
	65-69 ans	229	99	130	15	14	84	116
	70-74 ans	171	75	96	9	11	66	85
	50-74 ans	949	438	511	126	129	312	382
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	128	63	65	44	40	19	25
	55-59 ans	130	56	74	12	17	44	57
	60-64 ans	158	82	76	15	13	67	63
	65-69 ans	182	77	105	11	11	66	94
	70-74 ans	126	57	69	6	4	51	65
	50-74 ans	724	335	389	88	85	247	304
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	52	25	27	22	21	3	6
	55-59 ans	45	22	23	6	7	16	16
	60-64 ans	36	16	20	3	6	13	14
	65-69 ans	47	22	25	4	3	18	22
	70-74 ans	45	18	27	3	7	15	20
	50-74 ans	225	103	122	38	44	65	78
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 088	1 433	1 655	976	1 104	457	551
	55-59 ans	3 133	1 426	1 707	263	259	1 163	1 448
	60-64 ans	3 316	1 514	1 802	262	255	1 252	1 547
	65-69 ans	3 834	1 746	2 088	212	197	1 534	1 891
	70-74 ans	2 323	1 010	1 313	98	122	912	1 191
	50-74 ans	15 694	7 129	8 565	1 811	1 937	5 318	6 628
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	122	65	57	51	41	14	16
	55-59 ans	131	74	57	15	12	59	45
	60-64 ans	154	84	70	17	16	67	54
	65-69 ans	190	108	82	19	7	89	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 15 - Cantal

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	159	94	65	10	18	84	47
	50-74 ans	756	425	331	112	94	313	237
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	122	65	57	51	41	14	16
	55-59 ans	131	74	57	15	12	59	45
	60-64 ans	154	84	70	17	16	67	54
	65-69 ans	189	107	82	19	7	88	75
	70-74 ans	157	93	64	9	18	84	46
	50-74 ans	753	423	330	111	94	312	236
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	108	60	48	46	33	14	15
	55-59 ans	125	72	53	15	10	57	43
	60-64 ans	147	80	67	17	14	63	53
	65-69 ans	178	97	81	16	7	81	74
	70-74 ans	142	83	59	5	15	78	44
	50-74 ans	700	392	308	99	79	293	229
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	105	58	47	44	32	14	15
	55-59 ans	125	72	53	15	10	57	43
	60-64 ans	145	80	65	17	14	63	51
	65-69 ans	174	96	78	16	7	80	71
	70-74 ans	136	79	57	5	14	74	43
	50-74 ans	685	385	300	97	77	288	223
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 15 - Cantal

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	59	48	45	33	14	15
	55-59 ans	125	72	53	15	10	57	43
	60-64 ans	146	80	66	17	14	63	52
	65-69 ans	178	97	81	16	7	81	74
	70-74 ans	139	81	58	5	15	76	43
	50-74 ans	695	389	306	98	79	291	227
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	107	59	48	45	33	14	15
	55-59 ans	125	72	53	15	10	57	43
	60-64 ans	146	80	66	17	14	63	52
	65-69 ans	177	97	80	16	7	81	73
	70-74 ans	139	81	58	5	14	76	44
	50-74 ans	694	389	305	98	78	291	227
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	108	60	48	46	33	14	15
	55-59 ans	126	72	54	15	10	57	44
	60-64 ans	147	80	67	17	14	63	53
	65-69 ans	178	97	81	16	7	81	74
	70-74 ans	142	83	59	5	15	78	44
	50-74 ans	701	392	309	99	79	293	230
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54	25	29	17	20	8	9
	55-59 ans	39	19	20	4	2	15	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	59	27	32	7	4	20	28
	65-69 ans	54	24	30	4	1	20	29
	70-74 ans	40	19	21	0	6	19	15
	50-74 ans	246	114	132	32	33	82	99
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	7	3	7	2	0	1
	55-59 ans	11	4	7	1	1	3	6
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5
	70-74 ans	10	6	4	0	2	6	2
	50-74 ans	45	24	21	8	6	16	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	21	11	10	2	3	9	7
	60-64 ans	21	9	12	1	4	8	8
	65-69 ans	35	18	17	3	0	15	17
	70-74 ans	27	18	9	0	0	18	9
	50-74 ans	112	62	50	11	8	51	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	28	18	10	13	6	5	4
	55-59 ans	44	30	14	7	3	23	11
	60-64 ans	54	36	18	7	5	29	13
	65-69 ans	60	43	17	7	2	36	15
	70-74 ans	48	30	18	4	5	26	13
	50-74 ans	234	157	77	38	21	119	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	14	5	9	2	3	3	6
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	47	25	22	9	8	16	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	24	12	18	7	6	5
	55-59 ans	65	41	24	9	6	32	18
	60-64 ans	75	45	30	8	9	37	21
	65-69 ans	95	61	34	10	2	51	32
	70-74 ans	75	48	27	4	5	44	22
	50-74 ans	346	219	127	49	29	170	98

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 15 - Cantal

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28	18	10	13	6	5	4
	55-59 ans	44	30	14	7	3	23	11
	60-64 ans	54	36	18	7	5	29	13
	65-69 ans	60	43	17	7	2	36	15
	70-74 ans	48	30	18	4	5	26	13
	50-74 ans	234	157	77	38	21	119	56
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	10	6	9	5	1	1
	55-59 ans	27	18	9	3	2	15	7
	60-64 ans	36	24	12	4	4	20	8
	65-69 ans	46	32	14	6	1	26	13
	70-74 ans	36	24	12	3	4	21	8
	50-74 ans	161	108	53	25	16	83	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	13	6	10	5	3	1
	55-59 ans	38	27	11	5	3	22	8
	60-64 ans	43	30	13	5	4	25	9
	65-69 ans	60	42	18	7	1	35	17
	70-74 ans	51	33	18	3	5	30	13
	50-74 ans	211	145	66	30	18	115	48
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	14	5	9	2	3	3	6
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	47	25	22	9	8	16	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	7	6	1	1	1	5	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	14	5	9	2	3	3	6
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	46	25	21	9	8	16	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	7	6	1	1	1	5	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	13	4	9	2	3	2	6
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	43	23	20	8	8	15	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	9	2	7	2	3	0	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	21	7	14	4	7	3	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	22	16	6	4	1	12	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	2	4	2	1	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	4	8	2	4	2	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	7	6	1	1	1	5	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	14	5	9	2	3	3	6
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	45	25	20	9	8	16	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
	50-74 ans	30	19	11	8	8	11	3

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 15 - Cantal

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,0	5,5	6,6	5,4	4,8	5,6
	55-59 ans	5,5	5,4	5,6	6,7	9,0	5,1	5,0
	60-64 ans	5,8	6,4	5,3	6,8	7,3	6,3	4,9
	65-69 ans	5,9	5,6	6,2	6,9	7,0	5,4	6,1
	70-74 ans	7,2	7,3	7,2	8,9	8,5	7,1	7,0
	50-74 ans	6,0	6,1	5,9	6,8	6,5	5,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	2,2	1,9	0,7	1,1
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	2,2	2,6	1,4	1,1
	60-64 ans	1,1	1,0	1,1	1,1	2,3	1,0	0,9
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	1,9	1,5	1,2	1,2
	70-74 ans	1,9	1,8	2,0	3,0	5,4	1,6	1,7
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,1	2,2	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	71,6	70,7	66,7	65,6	86,4	80,6
	55-59 ans	74,3	71,8	76,3	66,7	70,8	73,3	78,1
	60-64 ans	81,4	83,7	79,2	83,3	68,4	83,8	81,8
	65-69 ans	79,5	77,8	80,8	73,3	78,6	78,6	81,0
	70-74 ans	73,7	76,0	71,9	66,7	36,4	77,3	76,5
	50-74 ans	76,3	76,5	76,1	69,8	65,9	79,2	79,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,0	4,5	3,4	5,2	3,7	3,1	2,9
	55-59 ans	4,2	5,2	3,3	5,7	4,6	5,1	3,1
	60-64 ans	4,6	5,5	3,9	6,5	6,3	5,4	3,5
	65-69 ans	5,0	6,2	3,9	9,0	3,6	5,8	4,0
	70-74 ans	6,8	9,3	5,0	10,2	14,8	9,2	3,9
	50-74 ans	4,8	6,0	3,9	6,2	4,9	5,9	3,6
50-74 ans **	4,8	5,8	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	70-74 ans	98,7	98,9	98,5	90,0	100,0	100,0	97,9
	50-74 ans	99,6	99,5	99,7	99,1	100,0	99,7	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,5	92,3	84,2	90,2	80,5	100,0	93,8
	55-59 ans	95,4	97,3	93,0	100,0	83,3	96,6	95,6
	60-64 ans	95,5	95,2	95,7	100,0	87,5	94,0	98,1
	65-69 ans	94,2	90,7	98,8	84,2	100,0	92,0	98,7
	70-74 ans	90,4	89,2	92,2	55,6	83,3	92,9	95,7
	50-74 ans	93,0	92,7	93,3	89,2	84,0	93,9	97,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	96,7	97,9	95,7	97,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,6	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	96,2
	65-69 ans	97,8	99,0	96,3	100,0	100,0	98,8	95,9
	70-74 ans	95,8	95,2	96,6	100,0	93,3	94,9	97,7
	50-74 ans	97,9	98,2	97,4	98,0	97,5	98,3	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	3	3	4
	55-59 ans	4	4	4	5	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	6	6	4	4
	65-69 ans	4	4	4	10	6	3	4
	70-74 ans	4	5	4	6	4	5	4
	50-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	101	108	106	132	83	56
	55-59 ans	96	89	107	84	64	90	117
	60-64 ans	91	90	92	81	128	93	83
	65-69 ans	101	94	108	121	96	89	109
	70-74 ans	93	83	107	71	85	84	114
	50-74 ans	97	91	104	99	111	89	102
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68,5 (54-105)	68,5 (54-107,5)	68 (54,5-103,5)	68 (54-124)	82 (61-131)	76 (55-99)	55 (38-60)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (54-89)	74,5 (55-90,5)	63 (49-84)	70 (39-90)	59 (47-71)	75 (55-91)	66 (49-88)
	60-64 ans	69 (54-102)	70,5 (52,5-102)	64 (55-105)	86 (49-102)	63,5 (56-148)	69 (54-104)	66 (55-102)
	65-69 ans	68,5 (53-104)	67 (50-98)	69 (56-105)	101 (54-162,5)	83 (63-132)	65 (49-88)	68,5 (55-105)
	70-74 ans	72 (49-102)	67 (48-88)	79 (60-117)	72 (71-83)	74 (58-98)	66 (48-89)	83,5 (61-138)
	50-74 ans	69 (54-102)	69 (51-98,5)	69,5 (55-105)	75 (53-111)	72 (58-104)	69 (51-91)	69 (54-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,6	4,6	8,8	5,9	12,2	0,0	0,0
	55-59 ans	3,8	2,7	5,3	0,0	16,7	3,4	2,2
	60-64 ans	2,6	2,4	2,9	0,0	6,3	3,0	1,9
	65-69 ans	3,7	5,6	1,2	10,5	0,0	4,5	1,3
	70-74 ans	3,8	6,4	0,0	30,0	0,0	3,6	0,0
	50-74 ans	4,0	4,5	3,3	7,1	8,5	3,5	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,3	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	98,1
	65-69 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6
	70-74 ans	97,9	97,6	98,3	100,0	93,3	97,4	100,0
	50-74 ans	99,1	99,2	99,0	99,0	98,7	99,3	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,0	41,7	60,4	37,0	60,6	57,1	60,0
	55-59 ans	31,0	26,4	37,0	26,7	20,0	26,3	40,9
	60-64 ans	40,1	33,8	47,8	41,2	28,6	31,7	52,8
	65-69 ans	30,3	24,7	37,0	25,0	14,3	24,7	39,2
	70-74 ans	28,2	22,9	35,6	0,0	40,0	24,4	34,1
	50-74 ans	35,1	29,1	42,7	32,3	41,8	28,0	43,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,3	11,7	6,3	15,2	6,1	0,0	6,7
	55-59 ans	8,7	5,6	13,0	6,7	10,0	5,3	13,6
	60-64 ans	2,7	2,5	3,0	0,0	7,1	3,2	1,9
	65-69 ans	5,6	5,2	6,2	0,0	0,0	6,2	6,8
	70-74 ans	7,0	7,2	6,8	0,0	13,3	7,7	4,5
	50-74 ans	6,4	6,1	6,8	8,1	7,6	5,5	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	6,7	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,3	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,4	10,0	4,2	10,9	3,0	7,1	6,7
	55-59 ans	16,7	15,3	18,5	13,3	30,0	15,8	15,9
	60-64 ans	14,3	11,3	17,9	5,9	28,6	12,7	15,1
	65-69 ans	19,7	18,6	21,0	18,8	0,0	18,5	23,0
	70-74 ans	19,0	21,7	15,3	0,0	0,0	23,1	20,5
	50-74 ans	16,0	15,8	16,2	11,1	10,1	17,4	18,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,9	30,0	20,8	28,3	18,2	35,7	26,7
	55-59 ans	34,9	41,7	25,9	46,7	30,0	40,4	25,0
	60-64 ans	36,7	45,0	26,9	41,2	35,7	46,0	24,5
	65-69 ans	33,7	44,3	21,0	43,8	28,6	44,4	20,3
	70-74 ans	33,8	36,1	30,5	80,0	33,3	33,3	29,5
	50-74 ans	33,4	40,1	24,9	38,4	26,6	40,6	24,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,5	5,0	8,3	6,5	12,1	0,0	0,0
	55-59 ans	6,3	8,3	3,7	6,7	10,0	8,8	2,3
	60-64 ans	5,4	6,3	4,5	11,8	0,0	4,8	5,7
	65-69 ans	7,9	5,2	11,1	12,5	42,9	3,7	8,1
	70-74 ans	7,0	7,2	6,8	20,0	0,0	6,4	9,1
	50-74 ans	6,7	6,4	7,1	9,1	10,1	5,5	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	1,4	1,9	0,0	0,0	1,8	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	65-69 ans	2,2	2,1	2,5	0,0	14,3	2,5	1,4
	70-74 ans	2,8	3,6	1,7	0,0	0,0	3,8	2,3
	50-74 ans	1,7	2,0	1,3	1,0	1,3	2,4	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4
	70-74 ans	1,4	1,2	1,7	0,0	6,7	1,3	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	1,3	0,3	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,7	16,7	7,3	18,4	6,3	13,1	9,1
	55-59 ans	20,7	28,8	14,1	34,2	23,2	27,5	12,4
	60-64 ans	22,6	29,7	16,6	30,5	35,3	29,6	13,6
	65-69 ans	24,8	34,9	16,3	47,2	10,2	33,2	16,9
	70-74 ans	32,3	47,5	20,6	40,8	41,0	48,2	18,5
	50-74 ans	22,0	30,7	14,8	27,1	15,0	32,0	14,8
	50-74 ans **	21,5	29,4	14,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	12,6	6,0	13,3	5,4	10,9	7,3
	55-59 ans	14,0	21,0	8,2	26,6	11,6	19,8	7,6
	60-64 ans	16,3	23,8	10,0	26,7	19,6	23,2	8,4
	65-69 ans	15,6	24,6	8,1	33,0	10,2	23,5	7,9
	70-74 ans	20,7	29,7	13,7	40,8	41,0	28,5	10,9
	50-74 ans	14,9	22,0	9,0	21,0	10,8	22,4	8,4
	50-74 ans **	14,8	21,2	8,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,0	3,6	9,2	4,5	2,2	1,8
	55-59 ans	8,6	12,6	5,3	11,4	7,7	12,9	4,8
	60-64 ans	10,9	15,9	6,7	15,3	15,7	16,0	5,2
	65-69 ans	12,0	18,3	6,7	28,3	5,1	16,9	6,9
	70-74 ans	15,5	23,8	9,1	30,6	32,8	23,0	6,7
	50-74 ans	10,3	15,1	6,2	13,8	8,3	15,6	5,6
	50-74 ans **	9,9	14,2	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,1	3,6	10,2	4,5	6,6	1,8
	55-59 ans	12,1	18,9	6,4	19,0	11,6	18,9	5,5
	60-64 ans	13,0	19,8	7,2	19,1	15,7	20,0	5,8
	65-69 ans	15,6	24,1	8,6	33,0	5,1	22,8	9,0
	70-74 ans	22,0	32,7	13,7	30,6	41,0	32,9	10,9
	50-74 ans	13,4	20,3	7,7	16,6	9,3	21,6	7,2
	50-74 ans **	13,0	19,2	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,1	2,4	3,1	3,6	0,0	0,0
	55-59 ans	2,6	4,2	1,2	3,8	3,9	4,3	0,7
	60-64 ans	2,4	3,3	1,7	7,6	0,0	2,4	1,9
	65-69 ans	3,7	2,9	4,3	9,4	15,2	2,0	3,2
	70-74 ans	4,3	5,9	3,0	10,2	0,0	5,5	3,4
	50-74 ans	3,0	3,5	2,6	5,0	4,1	3,0	2,1
	50-74 ans **	2,9	3,5	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	10,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	50-74 ans	4,3	4,0	4,8	11,1	0,0	0,0	7,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)