

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 905	6 063	6 842	4 412	4 663	1 651	2 179
	55-59 ans	10 696	4 938	5 758	1 180	1 108	3 758	4 650
	60-64 ans	10 612	4 846	5 766	872	835	3 974	4 931
	65-69 ans	10 706	4 850	5 856	628	619	4 222	5 237
	70-74 ans	7 421	3 419	4 002	398	410	3 021	3 592
	50-74 ans	52 340	24 116	28 224	7 490	7 635	16 626	20 589
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	923	473	450	370	337	103	113
	55-59 ans	818	404	414	116	83	288	331
	60-64 ans	710	313	397	65	77	248	320
	65-69 ans	717	303	414	54	60	249	354
	70-74 ans	580	254	326	29	57	225	269
	50-74 ans	3 748	1 747	2 001	634	614	1 113	1 387
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	748	385	363	293	261	92	102
	55-59 ans	690	338	352	90	68	248	284
	60-64 ans	602	273	329	52	52	221	277
	65-69 ans	591	252	339	39	40	213	299
	70-74 ans	432	197	235	16	38	181	197
	50-74 ans	3 063	1 445	1 618	490	459	955	1 159
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	175	88	87	77	76	11	11
	55-59 ans	128	66	62	26	15	40	47
	60-64 ans	108	40	68	13	25	27	43
	65-69 ans	126	51	75	15	20	36	55
	70-74 ans	148	57	91	13	19	44	72
	50-74 ans	685	302	383	144	155	158	228
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 730	5 975	6 755	4 335	4 587	1 640	2 168
	55-59 ans	10 568	4 872	5 696	1 154	1 093	3 718	4 603
	60-64 ans	10 504	4 806	5 698	859	810	3 947	4 888
	65-69 ans	10 580	4 799	5 781	613	599	4 186	5 182
	70-74 ans	7 273	3 362	3 911	385	391	2 977	3 520
	50-74 ans	51 655	23 814	27 841	7 346	7 480	16 468	20 361
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	408	222	186	163	130	59	56
	55-59 ans	403	241	162	65	37	176	125
	60-64 ans	486	285	201	66	34	219	167
	65-69 ans	562	326	236	48	43	278	193

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	433	262	171	33	21	229	150
	50-74 ans	2 292	1 336	956	375	265	961	691
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	408	222	186	163	130	59	56
	55-59 ans	400	239	161	64	37	175	124
	60-64 ans	484	284	200	66	34	218	166
	65-69 ans	557	323	234	48	42	275	192
	70-74 ans	433	262	171	33	21	229	150
	50-74 ans	2 282	1 330	952	374	264	956	688
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	335	187	148	137	102	50	46
	55-59 ans	316	190	126	43	23	147	103
	60-64 ans	391	233	158	48	27	185	131
	65-69 ans	467	268	199	31	35	237	164
	70-74 ans	349	220	129	23	14	197	115
	50-74 ans	1 858	1 098	760	282	201	816	559
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	292	160	132	115	92	45	40
	55-59 ans	263	160	103	36	22	124	81
	60-64 ans	333	195	138	42	23	153	115
	65-69 ans	397	224	173	28	32	196	141
	70-74 ans	291	187	104	19	12	168	92
	50-74 ans	1 576	926	650	240	181	686	469
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	331	185	146	135	101	50	45
	55-59 ans	314	188	126	43	23	145	103
	60-64 ans	391	233	158	48	27	185	131
	65-69 ans	458	263	195	30	35	233	160
	70-74 ans	343	217	126	23	13	194	113
	50-74 ans	1 837	1 086	751	279	199	807	552
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	21	12	9	3	2	9	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	334	186	148	136	102	50	46
	55-59 ans	314	189	125	43	23	146	102
	60-64 ans	389	232	157	48	26	184	131
	65-69 ans	465	267	198	31	35	236	163
	70-74 ans	342	216	126	23	14	193	112
	50-74 ans	1 844	1 090	754	281	200	809	554
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	335	187	148	137	102	50	46
	55-59 ans	317	191	126	43	23	148	103
	60-64 ans	392	233	159	48	27	185	132
	65-69 ans	471	269	202	31	36	238	166
	70-74 ans	349	220	129	23	14	197	115
	50-74 ans	1 864	1 100	764	282	202	818	562
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	132	62	70	46	47	16	23
	55-59 ans	100	45	55	10	8	35	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	102	44	58	5	4	39	54
	65-69 ans	133	56	77	5	10	51	67
	70-74 ans	91	42	49	4	5	38	44
	50-74 ans	558	249	309	70	74	179	235
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	11	4	6	1	5	3
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	14	7	7	0	1	7	6
	65-69 ans	15	7	8	0	3	7	5
	70-74 ans	16	12	4	1	1	11	3
	50-74 ans	70	44	26	8	7	36	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	13	11	2	5	0	6	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	54	36	18	25	10	11	8
	55-59 ans	63	44	19	9	4	35	15
	60-64 ans	80	51	29	17	6	34	23
	65-69 ans	83	52	31	5	5	47	26
	70-74 ans	65	42	23	3	2	39	21
	50-74 ans	345	225	120	59	27	166	93
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	101	61	40	46	31	15	9
	55-59 ans	107	76	31	18	8	58	23
	60-64 ans	141	98	43	19	8	79	35
	65-69 ans	167	101	66	15	12	86	54
	70-74 ans	122	85	37	8	2	77	35
	50-74 ans	638	421	217	106	61	315	156
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	6	11	2	1	4	10
	60-64 ans	39	22	17	7	7	15	10
	65-69 ans	52	39	13	5	3	34	10
	70-74 ans	39	27	12	4	3	23	9
	50-74 ans	163	104	59	26	19	78	40
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	9	6	3	0	0	6	3
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	9	5	4	0	2	5	2
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	36	20	16	2	6	18	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	155	97	58	71	41	26	17
	55-59 ans	170	120	50	27	12	93	38
	60-64 ans	221	149	72	36	14	113	58
	65-69 ans	250	153	97	20	17	133	80
	70-74 ans	187	127	60	11	4	116	56
	50-74 ans	983	646	337	165	88	481	249

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	101	61	40	46	31	15	9
	55-59 ans	107	76	31	18	8	58	23
	60-64 ans	141	98	43	19	8	79	35
	65-69 ans	167	101	66	15	12	86	54
	70-74 ans	122	85	37	8	2	77	35
	50-74 ans	638	421	217	106	61	315	156
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	90	54	36	41	28	13	8
	55-59 ans	102	72	30	17	8	55	22
	60-64 ans	132	90	42	16	8	74	34
	65-69 ans	152	93	59	14	12	79	47
	70-74 ans	110	78	32	8	2	70	30
	50-74 ans	586	387	199	96	58	291	141
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	101	65	36	48	28	17	8
	55-59 ans	110	79	31	18	8	61	23
	60-64 ans	149	104	45	22	8	82	37
	65-69 ans	172	106	66	16	12	90	54
	70-74 ans	129	93	36	9	2	84	34
	50-74 ans	661	447	214	113	58	334	156
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1
	55-59 ans	17	6	11	2	1	4	10
	60-64 ans	39	22	17	7	7	15	10
	65-69 ans	52	39	13	5	3	34	10
	70-74 ans	40	27	13	4	3	23	10
	50-74 ans	164	104	60	26	19	78	41
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1
	55-59 ans	16	6	10	2	1	4	9
	60-64 ans	32	18	14	6	5	12	9
	65-69 ans	50	37	13	5	3	32	10
	70-74 ans	38	25	13	4	3	21	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	152	96	56	25	17	71	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	34	21	13	5	4	16	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	9	5	7	4	2	1
	55-59 ans	14	5	9	1	0	4	9
	60-64 ans	25	15	10	6	5	9	5
	65-69 ans	39	30	9	5	2	25	7
	70-74 ans	25	16	9	1	2	15	7
	50-74 ans	117	75	42	20	13	55	29
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	12	4	8	1	0	3	8
	60-64 ans	16	10	6	4	4	6	2
	65-69 ans	29	21	8	4	2	17	6
	70-74 ans	22	14	8	1	2	13	6
	50-74 ans	90	56	34	16	11	40	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	10	9	1	1	0	8	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	27	19	8	4	2	15	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	7	5	2	3	1	2	1
	65-69 ans	15	11	4	3	1	8	3
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	34	24	10	9	4	15	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	2	3	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	50-74 ans	25	15	10	3	4	12	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	13	5	8	1	0	4	8
	60-64 ans	28	16	12	6	5	10	7
	65-69 ans	40	30	10	5	3	25	7
	70-74 ans	30	19	11	1	3	18	8
	50-74 ans	126	80	46	21	15	59	31
A40- Perdus de vue	50-54 ans	61	30	31	24	23	6	8
	55-59 ans	70	43	27	20	10	23	17
	60-64 ans	74	40	34	15	6	25	28
	65-69 ans	81	50	31	16	6	34	25
	70-74 ans	73	36	37	8	5	28	32
	50-74 ans	359	199	160	83	50	116	110

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 25 - Doubs

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,8	6,6	8,4	7,2	6,2	5,2
	55-59 ans	7,6	8,2	7,2	9,8	7,5	7,7	7,1
	60-64 ans	6,7	6,5	6,9	7,5	9,2	6,2	6,5
	65-69 ans	6,7	6,2	7,1	8,6	9,7	5,9	6,8
	70-74 ans	7,8	7,4	8,1	7,3	13,9	7,4	7,5
	50-74 ans	7,2	7,2	7,1	8,5	8,0	6,7	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	1,7	1,6	0,7	0,5
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	2,2	1,4	1,1	1,0
	60-64 ans	1,0	0,8	1,2	1,5	3,0	0,7	0,9
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	2,4	3,2	0,9	1,1
	70-74 ans	2,0	1,7	2,3	3,3	4,6	1,5	2,0
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	1,9	2,0	1,0	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,0	81,4	80,7	79,2	77,4	89,3	90,3
	55-59 ans	84,4	83,7	85,0	77,6	81,9	86,1	85,8
	60-64 ans	84,8	87,2	82,9	80,0	67,5	89,1	86,6
	65-69 ans	82,4	83,2	81,9	72,2	66,7	85,5	84,5
	70-74 ans	74,5	77,6	72,1	55,2	66,7	80,4	73,2
	50-74 ans	81,7	82,7	80,9	77,3	74,8	85,8	83,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,8	3,8	2,8	3,6	2,6
	55-59 ans	3,8	4,9	2,8	5,6	3,4	4,7	2,7
	60-64 ans	4,6	5,9	3,5	7,7	4,2	5,5	3,4
	65-69 ans	5,3	6,8	4,1	7,8	7,2	6,6	3,7
	70-74 ans	6,0	7,8	4,4	8,6	5,4	7,7	4,3
	50-74 ans	4,4	5,6	3,4	5,1	3,5	5,8	3,4
50-74 ans **	4,4	5,5	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,2	99,4	98,5	100,0	99,4	99,2
	60-64 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	100,0	99,5	99,4
	65-69 ans	99,1	99,1	99,2	100,0	97,7	98,9	99,5
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	99,7	99,6	99,5	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,1	84,2	79,6	84,0	78,5	84,7	82,1
	55-59 ans	79,0	79,5	78,3	67,2	62,2	84,0	83,1
	60-64 ans	80,8	82,0	79,0	72,7	79,4	84,9	78,9
	65-69 ans	83,8	83,0	85,0	64,6	83,3	86,2	85,4
	70-74 ans	80,6	84,0	75,4	69,7	66,7	86,0	76,7
	50-74 ans	81,4	82,6	79,8	75,4	76,1	85,4	81,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,2	85,6	89,2	83,9	90,2	90,0	87,0
	55-59 ans	83,2	84,2	81,7	83,7	95,7	84,4	78,6
	60-64 ans	85,2	83,7	87,3	87,5	85,2	82,7	87,8
	65-69 ans	85,0	83,6	86,9	90,3	91,4	82,7	86,0
	70-74 ans	83,4	85,0	80,6	82,6	85,7	85,3	80,0
	50-74 ans	84,8	84,3	85,5	85,1	90,0	84,1	83,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	130	129	130	130	139	129	109
	55-59 ans	118	116	120	161	100	103	124
	60-64 ans	120	123	116	116	97	124	120
	65-69 ans	121	125	115	174	143	118	109
	70-74 ans	123	124	123	142	142	122	121
	50-74 ans	122	123	120	138	130	118	117
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95 (69-147)	97 (69-150)	95 (69-138,5)	96 (69-153)	108,5 (69-152)	100 (72-142)	90,5 (69-121)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92 (64-137)	94 (66-126)	82,5 (61-152)	103 (76-190)	75 (59-92)	92,5 (64-118)	91 (63-159)
	60-64 ans	92 (70-137)	93 (71-130)	92 (69-143)	95 (67,5-134,5)	84 (68-112)	92 (71-124)	97 (69-148)
	65-69 ans	91 (68-126)	94 (68-133)	90 (67-119)	109 (76-183)	98 (74-131)	92 (68-128)	88,5 (64,5-118)
	70-74 ans	95 (72-120)	93 (72-123)	96,5 (73-119)	80 (62-98)	105,5 (66-148)	96 (73-125)	96 (74-119)
	50-74 ans	93 (69-133)	94 (69-132)	92 (68-133)	96,5 (70-153)	95 (68-133)	93 (69-126)	91 (68-133)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,0	13,5	16,7	14,7	17,7	10,2	14,3
	55-59 ans	17,4	17,8	16,7	30,8	27,0	13,1	13,6
	60-64 ans	15,2	14,0	16,9	22,7	17,6	11,4	16,8
	65-69 ans	14,4	15,3	13,1	33,3	14,0	12,2	13,0
	70-74 ans	16,9	13,7	21,6	24,2	23,8	12,2	21,3
	50-74 ans	15,7	14,9	16,7	22,1	18,9	12,1	15,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,5	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,5	99,2	100,0	100,0	99,3	99,0
	60-64 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	96,3	99,5	100,0
	65-69 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	100,0	99,6	99,4
	70-74 ans	98,0	98,2	97,7	100,0	100,0	98,0	97,4
	50-74 ans	99,2	99,3	99,2	99,6	99,5	99,1	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,4	33,2	47,3	33,6	46,1	32,0	50,0
	55-59 ans	31,5	23,6	43,7	23,3	34,8	23,6	45,6
	60-64 ans	26,0	18,9	36,5	10,4	14,8	21,1	40,9
	65-69 ans	28,2	20,8	38,1	16,1	27,8	21,4	40,4
	70-74 ans	26,1	19,1	38,0	17,4	35,7	19,3	38,3
	50-74 ans	29,9	22,6	40,4	24,8	36,6	21,9	41,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	5,9	2,7	4,4	1,0	10,0	6,5
	55-59 ans	3,2	3,7	2,4	2,3	4,3	4,1	1,9
	60-64 ans	3,6	3,0	4,4	0,0	3,7	3,8	4,5
	65-69 ans	3,2	2,6	4,0	0,0	8,3	2,9	3,0
	70-74 ans	4,6	5,5	3,1	4,3	7,1	5,6	2,6
	50-74 ans	3,8	4,0	3,4	2,8	3,5	4,4	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	2,6	0,0	7,0	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	1,1	1,4	0,8	4,3	0,0	1,0	0,9
	50-74 ans	0,7	1,0	0,3	1,8	0,0	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,1	19,3	12,2	18,2	9,8	22,0	17,4
	55-59 ans	19,9	23,0	15,1	20,9	17,4	23,6	14,6
	60-64 ans	20,4	21,9	18,2	35,4	22,2	18,4	17,4
	65-69 ans	17,6	19,3	15,3	16,1	13,9	19,7	15,7
	70-74 ans	18,6	19,1	17,8	13,0	14,3	19,8	18,3
	50-74 ans	18,5	20,5	15,7	20,9	13,4	20,3	16,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,1	32,6	27,0	33,6	30,4	30,0	19,6
	55-59 ans	33,8	39,8	24,6	41,9	34,8	39,2	22,3
	60-64 ans	36,0	42,1	27,0	39,6	29,6	42,7	26,5
	65-69 ans	35,5	37,5	32,7	48,4	33,3	36,1	32,5
	70-74 ans	35,0	38,6	28,7	34,8	14,3	39,1	30,4
	50-74 ans	34,2	38,3	28,4	37,6	30,2	38,5	27,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	5,3	4,1	5,8	4,9	4,0	2,2
	55-59 ans	5,4	3,1	8,7	4,7	4,3	2,7	9,7
	60-64 ans	9,9	9,4	10,7	14,6	25,9	8,1	7,6
	65-69 ans	11,0	14,5	6,4	16,1	8,3	14,3	6,0
	70-74 ans	11,2	12,3	9,3	17,4	21,4	11,7	7,8
	50-74 ans	8,7	9,5	7,7	9,2	9,4	9,5	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	0,5	2,7	0,7	2,9	0,0	2,2
	55-59 ans	2,8	3,1	2,4	0,0	0,0	4,1	2,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,8	1,7	1,9	0,0	0,0	2,2	2,3
	65-69 ans	1,9	1,9	2,0	0,0	5,6	2,1	1,2
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	4,3	7,1	1,5	0,9
	50-74 ans	1,9	1,8	2,1	0,7	3,0	2,2	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,5	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,8	0,0	0,0	0,7	1,0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	3,7	0,5	0,0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,6
	70-74 ans	1,1	1,4	0,8	0,0	0,0	1,5	0,9
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,2	16,2	8,6	16,4	8,9	15,9	7,8
	55-59 ans	16,1	24,6	8,8	23,4	11,0	25,0	8,3
	60-64 ans	21,0	31,0	12,6	41,9	17,3	28,6	11,9
	65-69 ans	23,6	31,9	16,8	32,6	28,4	31,8	15,4
	70-74 ans	25,7	37,8	15,3	28,6	10,2	39,0	15,9
	50-74 ans	19,0	27,1	12,1	22,5	11,8	29,2	12,2
	50-74 ans **	18,9	26,7	11,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,2	5,9	10,6	6,8	9,1	4,2
	55-59 ans	10,1	15,6	5,4	15,6	7,3	15,6	5,0
	60-64 ans	13,4	20,4	7,5	22,1	9,9	20,0	7,2
	65-69 ans	15,8	21,0	11,4	24,5	20,0	20,5	10,4
	70-74 ans	16,8	25,3	9,5	20,8	5,1	25,9	9,9
	50-74 ans	12,4	17,7	7,8	14,4	8,2	19,1	7,7
	50-74 ans **	12,2	17,4	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,0	5,3	9,5	6,1	7,9	3,7
	55-59 ans	9,7	14,8	5,3	14,7	7,3	14,8	4,8
	60-64 ans	12,6	18,7	7,4	18,6	9,9	18,7	7,0
	65-69 ans	14,4	19,4	10,2	22,8	20,0	18,9	9,1
	70-74 ans	15,1	23,2	8,2	20,8	5,1	23,5	8,5
	50-74 ans	11,3	16,3	7,1	13,1	7,8	17,7	6,9
	50-74 ans **	11,3	16,0	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,9	5,3	11,1	6,1	10,4	3,7
	55-59 ans	10,4	16,2	5,4	15,6	7,3	16,4	5,0
	60-64 ans	14,2	21,6	7,9	25,6	9,9	20,8	7,6
	65-69 ans	16,3	22,1	11,4	26,1	20,0	21,5	10,4
	70-74 ans	17,7	27,7	9,2	23,4	5,1	28,2	9,7
	50-74 ans	12,8	18,8	7,7	15,4	7,8	20,3	7,7
	50-74 ans **	12,7	18,4	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	0,9	1,8	1,1	1,2	0,5
	55-59 ans	1,6	1,2	1,9	1,7	0,9	1,1	2,2
	60-64 ans	3,7	4,6	3,0	8,1	8,6	3,8	2,0
	65-69 ans	4,9	8,1	2,2	8,2	5,0	8,1	1,9
	70-74 ans	5,5	8,0	3,3	10,4	7,7	7,7	2,8
	50-74 ans	3,2	4,4	2,2	3,5	2,5	4,7	2,0
	50-74 ans **	3,0	4,0	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	10,0	16,7	12,5	20,0	0,0	0,0
	55-59 ans	12,5	16,7	10,0	50,0	100,0	0,0	0,0
	60-64 ans	21,9	16,7	28,6	0,0	0,0	25,0	44,4
	65-69 ans	22,0	18,9	30,8	0,0	33,3	21,9	30,0
	70-74 ans	31,6	36,0	23,1	75,0	33,3	28,6	20,0
	50-74 ans	22,4	21,9	23,2	20,0	23,5	22,5	23,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)