

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 593	9 893	10 700	6 797	6 925	3 096	3 775
	55-59 ans	16 051	7 547	8 504	1 515	1 648	6 032	6 856
	60-64 ans	16 160	7 446	8 714	1 401	1 346	6 045	7 368
	65-69 ans	15 882	7 193	8 689	1 044	1 021	6 149	7 668
	70-74 ans	10 369	4 808	5 561	559	541	4 249	5 020
	50-74 ans	79 055	36 887	42 168	11 316	11 481	25 571	30 687
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 127	557	570	424	407	133	163
	55-59 ans	955	466	489	116	121	350	368
	60-64 ans	822	370	452	99	100	271	352
	65-69 ans	768	342	426	71	71	271	355
	70-74 ans	571	248	323	44	36	204	287
	50-74 ans	4 243	1 983	2 260	754	735	1 229	1 525
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	872	426	446	313	316	113	130
	55-59 ans	723	360	363	81	85	279	278
	60-64 ans	646	295	351	64	67	231	284
	65-69 ans	632	274	358	47	56	227	302
	70-74 ans	447	190	257	31	17	159	240
	50-74 ans	3 320	1 545	1 775	536	541	1 009	1 234
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	255	131	124	111	91	20	33
	55-59 ans	232	106	126	35	36	71	90
	60-64 ans	176	75	101	35	33	40	68
	65-69 ans	136	68	68	24	15	44	53
	70-74 ans	124	58	66	13	19	45	47
	50-74 ans	923	438	485	218	194	220	291
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 338	9 762	10 576	6 686	6 834	3 076	3 742
	55-59 ans	15 819	7 441	8 378	1 480	1 612	5 961	6 766
	60-64 ans	15 984	7 371	8 613	1 366	1 313	6 005	7 300
	65-69 ans	15 746	7 125	8 621	1 020	1 006	6 105	7 615
	70-74 ans	10 245	4 750	5 495	546	522	4 204	4 973
	50-74 ans	78 132	36 449	41 683	11 098	11 287	25 351	30 396
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	698	415	283	297	175	118	108
	55-59 ans	610	369	241	105	57	264	184
	60-64 ans	677	377	300	85	55	292	245
	65-69 ans	744	435	309	76	44	359	265

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	575	334	241	53	36	281	205
	50-74 ans	3 304	1 930	1 374	616	367	1 314	1 007
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	698	415	283	297	175	118	108
	55-59 ans	606	367	239	105	56	262	183
	60-64 ans	674	376	298	85	54	291	244
	65-69 ans	739	433	306	76	44	357	262
	70-74 ans	570	331	239	53	36	278	203
	50-74 ans	3 287	1 922	1 365	616	365	1 306	1 000
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	665	394	271	279	168	115	103
	55-59 ans	585	353	232	99	55	254	177
	60-64 ans	639	362	277	81	47	281	230
	65-69 ans	694	400	294	65	43	335	251
	70-74 ans	541	315	226	48	35	267	191
	50-74 ans	3 124	1 824	1 300	572	348	1 252	952
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	657	391	266	277	164	114	102
	55-59 ans	567	344	223	97	54	247	169
	60-64 ans	628	358	270	81	46	277	224
	65-69 ans	669	385	284	60	39	325	245
	70-74 ans	518	300	218	48	34	252	184
	50-74 ans	3 039	1 778	1 261	563	337	1 215	924
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	661	392	269	277	166	115	103
	55-59 ans	577	347	230	98	55	249	175
	60-64 ans	635	361	274	81	47	280	227
	65-69 ans	679	394	285	64	39	330	246
	70-74 ans	537	312	225	48	35	264	190
	50-74 ans	3 089	1 806	1 283	568	342	1 238	941
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	15	6	9	1	4	5	5
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	35	18	17	4	6	14	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	14	8	6	0	3	8	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	660	391	269	278	166	113	103
	55-59 ans	581	352	229	99	55	253	174
	60-64 ans	634	361	273	81	47	280	226
	65-69 ans	683	396	287	65	40	331	247
	70-74 ans	534	311	223	48	35	263	188
	50-74 ans	3 092	1 811	1 281	571	343	1 240	938
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	665	394	271	279	168	115	103
	55-59 ans	588	355	233	99	56	256	177
	60-64 ans	642	363	279	81	48	282	231
	65-69 ans	697	402	295	65	43	337	252
	70-74 ans	546	318	228	48	36	270	192
	50-74 ans	3 138	1 832	1 306	572	351	1 260	955
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	237	112	125	73	76	39	49
	55-59 ans	156	73	83	14	22	59	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	156	63	93	8	10	55	83
	65-69 ans	174	72	102	10	14	62	88
	70-74 ans	123	53	70	5	11	48	59
	50-74 ans	846	373	473	110	133	263	340
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	34	18	16	15	11	3	5
	55-59 ans	35	20	15	4	3	16	12
	60-64 ans	23	14	9	4	3	10	6
	65-69 ans	25	18	7	0	2	18	5
	70-74 ans	20	11	9	2	0	9	9
	50-74 ans	137	81	56	25	19	56	37
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	134	85	49	64	27	21	22
	55-59 ans	115	67	48	19	9	48	39
	60-64 ans	138	83	55	20	5	63	50
	65-69 ans	154	98	56	17	6	81	50
	70-74 ans	123	75	48	9	9	66	39
	50-74 ans	664	408	256	129	56	279	200
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	196	138	58	100	39	38	19
	55-59 ans	216	159	57	48	18	111	39
	60-64 ans	245	154	91	37	21	117	70
	65-69 ans	244	151	93	26	15	125	78
	70-74 ans	187	122	65	20	9	102	56
	50-74 ans	1 088	724	364	231	102	493	262
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	37	21	16	15	10	6	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	20	17	8	4	12	13
	60-64 ans	50	30	20	9	5	21	15
	65-69 ans	76	50	26	9	6	41	20
	70-74 ans	69	44	25	11	6	33	19
	50-74 ans	269	165	104	52	31	113	73
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	20	15	5	5	0	10	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	7	5	2	4	0	1	2
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	33	22	11	11	3	11	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	330	223	107	164	66	59	41
	55-59 ans	331	226	105	67	27	159	78
	60-64 ans	383	237	146	57	26	180	120
	65-69 ans	398	249	149	43	21	206	128
	70-74 ans	310	197	113	29	18	168	95
	50-74 ans	1 752	1 132	620	360	158	772	462

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	196	138	58	100	39	38	19
	55-59 ans	216	159	57	48	18	111	39
	60-64 ans	245	154	91	37	21	117	70
	65-69 ans	244	151	93	26	15	125	78
	70-74 ans	187	122	65	20	9	102	56
	50-74 ans	1 088	724	364	231	102	493	262
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	164	120	44	84	28	36	16
	55-59 ans	179	130	49	39	15	91	34
	60-64 ans	188	119	69	29	14	90	55
	65-69 ans	197	123	74	22	12	101	62
	70-74 ans	146	92	54	17	8	75	46
	50-74 ans	874	584	290	191	77	393	213
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	183	131	52	92	34	39	18
	55-59 ans	219	163	56	50	19	113	37
	60-64 ans	243	158	85	37	20	121	65
	65-69 ans	251	162	89	30	13	132	76
	70-74 ans	190	129	61	20	10	109	51
	50-74 ans	1 086	743	343	229	96	514	247
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	21	16	15	10	6	6
	55-59 ans	37	20	17	8	4	12	13
	60-64 ans	50	30	20	9	5	21	15
	65-69 ans	77	51	26	9	6	42	20
	70-74 ans	70	45	25	12	6	33	19
	50-74 ans	271	167	104	53	31	114	73
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	34	18	16	14	10	4	6
	55-59 ans	35	19	16	8	4	11	12
	60-64 ans	49	29	20	8	5	21	15
	65-69 ans	76	50	26	9	6	41	20
	70-74 ans	68	45	23	12	4	33	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 49 - Maine et Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	262	161	101	51	29	110	72
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	34	18	16	14	10	4	6
	55-59 ans	33	18	15	7	4	11	11
	60-64 ans	46	28	18	8	5	20	13
	65-69 ans	72	47	25	9	6	38	19
	70-74 ans	64	42	22	12	4	30	18
	50-74 ans	249	153	96	50	29	103	67
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	25	13	12	10	8	3	4
	55-59 ans	26	15	11	6	3	9	8
	60-64 ans	41	24	17	5	4	19	13
	65-69 ans	63	41	22	9	5	32	17
	70-74 ans	56	35	21	10	4	25	17
	50-74 ans	211	128	83	40	24	88	59
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	38	25	13	10	5	15	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	15	9	6	1	1	8	5
	65-69 ans	24	16	8	3	1	13	7
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	50-74 ans	70	45	25	14	6	31	19
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	16	12	4	3	1	9	3
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	50-74 ans	59	32	27	8	6	24	21
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	8	6	2	4	1	2	1
	60-64 ans	13	8	5	2	2	6	3
	65-69 ans	18	11	7	2	3	9	4
	70-74 ans	17	11	6	4	2	7	4
	50-74 ans	62	39	23	14	9	25	14
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	20	12	8	4	3	8	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	33	17	16	14	10	3	6
	55-59 ans	34	19	15	8	3	11	12
	60-64 ans	49	29	20	8	5	21	15
	65-69 ans	71	48	23	9	6	39	17
	70-74 ans	67	44	23	12	4	32	19
	50-74 ans	254	157	97	51	28	106	69
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	18	10	15	7	3	3
	55-59 ans	18	12	6	5	1	7	5
	60-64 ans	26	12	14	4	6	8	8
	65-69 ans	37	27	10	7	1	20	9
	70-74 ans	21	11	10	4	0	7	10
	50-74 ans	130	80	50	35	15	45	35

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,6	5,3	6,2	5,9	4,3	4,3
	55-59 ans	5,9	6,2	5,8	7,7	7,3	5,8	5,4
	60-64 ans	5,1	5,0	5,2	7,1	7,4	4,5	4,8
	65-69 ans	4,8	4,8	4,9	6,8	7,0	4,4	4,6
	70-74 ans	5,5	5,2	5,8	7,9	6,7	4,8	5,7
	50-74 ans	5,4	5,4	5,4	6,7	6,4	4,8	5,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,2	1,6	1,3	0,6	0,9
	55-59 ans	1,4	1,4	1,5	2,3	2,2	1,2	1,3
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	2,5	2,5	0,7	0,9
	65-69 ans	0,9	0,9	0,8	2,3	1,5	0,7	0,7
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,3	3,5	1,1	0,9
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,9	1,7	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,4	76,5	78,2	73,8	77,6	85,0	79,8
	55-59 ans	75,7	77,3	74,2	69,8	70,2	79,7	75,5
	60-64 ans	78,6	79,7	77,7	64,6	67,0	85,2	80,7
	65-69 ans	82,3	80,1	84,0	66,2	78,9	83,8	85,1
	70-74 ans	78,3	76,6	79,6	70,5	47,2	77,9	83,6
	50-74 ans	78,2	77,9	78,5	71,1	73,6	82,1	80,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,3	2,7	4,4	2,6	3,8	2,9
	55-59 ans	3,9	5,0	2,9	7,1	3,5	4,4	2,7
	60-64 ans	4,2	5,1	3,5	6,2	4,2	4,9	3,4
	65-69 ans	4,7	6,1	3,6	7,5	4,4	5,9	3,5
	70-74 ans	5,6	7,0	4,4	9,7	6,9	6,7	4,1
	50-74 ans	4,2	5,3	3,3	5,6	3,3	5,2	3,3
50-74 ans **	4,2	5,3	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,5	99,2	100,0	98,2	99,2	99,5
	60-64 ans	99,6	99,7	99,3	100,0	98,2	99,7	99,6
	65-69 ans	99,3	99,5	99,0	100,0	100,0	99,4	98,9
	70-74 ans	99,1	99,1	99,2	100,0	100,0	98,9	99,0
	50-74 ans	99,5	99,6	99,3	100,0	99,5	99,4	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,3	94,9	95,8	93,9	96,0	97,5	95,4
	55-59 ans	96,5	96,2	97,1	94,3	98,2	96,9	96,7
	60-64 ans	94,8	96,3	93,0	95,3	87,0	96,6	94,3
	65-69 ans	93,9	92,4	96,1	85,5	97,7	93,8	95,8
	70-74 ans	94,9	95,2	94,6	90,6	97,2	96,0	94,1
	50-74 ans	95,0	94,9	95,2	92,9	95,3	95,9	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	99,2	98,2	99,3	97,6	99,1	99,0
	55-59 ans	96,9	97,5	96,1	98,0	98,2	97,2	95,5
	60-64 ans	98,3	98,9	97,5	100,0	97,9	98,6	97,4
	65-69 ans	96,4	96,3	96,6	92,3	90,7	97,0	97,6
	70-74 ans	95,7	95,2	96,5	100,0	97,1	94,4	96,3
	50-74 ans	97,3	97,5	97,0	98,4	96,8	97,0	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	107	103	111	108	98	96
	55-59 ans	96	97	94	100	98	96	93
	60-64 ans	95	102	86	110	107	100	82
	65-69 ans	101	99	105	99	103	99	105
	70-74 ans	103	108	97	110	99	107	97
	50-74 ans	100	103	97	107	105	100	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (55-124)	83 (55-124)	80 (54-116)	84 (57-127)	85 (52-135,5)	79 (51-119)	79 (56-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (55-116)	82 (56-115)	80 (54-116,5)	76 (51-123)	76 (43-121)	83 (58-113)	81 (56-116)
	60-64 ans	75 (55-112)	80 (56-121)	70 (52-101)	81 (56-119)	79 (53-125)	79 (56-121)	69 (51-96)
	65-69 ans	81 (57-121)	81 (56-116,5)	81,5 (58-123)	90 (56-118)	75 (54-130)	79 (56-116)	82 (60-123)
	70-74 ans	78 (56-121)	83 (58-122)	76 (54-119)	92 (66-137)	72 (56-122)	81 (57-120)	77 (54-118)
	50-74 ans	79,5 (55-118)	82 (56-120)	77 (55-117)	83 (56-125)	77,5 (52,5-127)	81 (56-117)	76 (55-113)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,0	4,3	3,5	5,1	4,0	2,5	2,8
	55-59 ans	3,0	3,3	2,5	4,8	1,8	2,7	2,7
	60-64 ans	3,8	3,2	4,7	4,7	10,9	2,7	3,3
	65-69 ans	5,0	6,2	3,2	9,2	2,3	5,6	3,4
	70-74 ans	3,7	3,3	4,1	7,5	0,0	2,5	4,9
	50-74 ans	3,9	4,1	3,6	5,7	4,1	3,4	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,2	99,3	99,6	98,8	98,3	100,0
	55-59 ans	99,3	99,7	98,7	100,0	100,0	99,6	98,3
	60-64 ans	99,2	99,7	98,6	100,0	100,0	99,6	98,3
	65-69 ans	98,4	99,0	97,6	100,0	93,0	98,8	98,4
	70-74 ans	98,7	98,7	98,7	100,0	100,0	98,5	98,4
	50-74 ans	99,0	99,3	98,5	99,8	98,6	99,0	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,6	28,4	46,1	26,2	45,2	33,9	47,6
	55-59 ans	26,5	20,6	35,6	14,1	39,3	23,0	34,5
	60-64 ans	24,3	17,4	33,3	9,9	20,8	19,5	35,9
	65-69 ans	25,0	17,9	34,6	15,4	32,6	18,4	34,9
	70-74 ans	22,5	16,7	30,7	10,4	30,6	17,8	30,7
	50-74 ans	27,0	20,4	36,2	19,2	37,9	20,9	35,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,1	4,6	5,9	5,4	6,5	2,6	4,9
	55-59 ans	6,0	5,6	6,4	4,0	5,4	6,3	6,8
	60-64 ans	3,6	3,9	3,2	4,9	6,3	3,5	2,6
	65-69 ans	3,6	4,5	2,4	0,0	4,7	5,3	2,0
	70-74 ans	3,7	3,5	3,9	4,2	0,0	3,3	4,7
	50-74 ans	4,4	4,4	4,3	4,4	5,4	4,4	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,6
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,2	21,6	18,1	22,9	16,1	18,3	21,4
	55-59 ans	19,6	18,9	20,6	19,2	16,1	18,8	22,0
	60-64 ans	21,5	22,9	19,7	24,7	10,4	22,3	21,6
	65-69 ans	22,1	24,4	19,0	26,2	14,0	24,0	19,8
	70-74 ans	22,5	23,6	21,1	18,8	25,0	24,4	20,3
	50-74 ans	21,2	22,3	19,6	22,6	16,0	22,1	20,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,5	35,0	21,4	35,8	23,2	33,0	18,4
	55-59 ans	36,7	44,8	24,5	48,5	32,1	43,4	22,0
	60-64 ans	38,2	42,4	32,6	45,7	43,8	41,5	30,3
	65-69 ans	35,0	37,6	31,5	40,0	34,9	37,1	31,0
	70-74 ans	34,2	38,4	28,5	41,7	25,0	37,8	29,2
	50-74 ans	34,7	39,5	27,9	40,4	29,1	39,1	27,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	5,3	5,9	5,4	6,0	5,2	5,8
	55-59 ans	6,3	5,6	7,3	8,1	7,1	4,7	7,3
	60-64 ans	7,8	8,3	7,2	11,1	10,4	7,4	6,5
	65-69 ans	10,9	12,4	8,8	13,8	14,0	12,2	7,9
	70-74 ans	12,6	13,8	11,0	22,9	16,7	12,2	9,9
	50-74 ans	8,6	9,0	8,0	9,1	8,8	9,0	7,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1,0	0,4	0,7	0,0	1,7	1,0
	55-59 ans	0,9	0,8	0,9	1,0	0,0	0,8	1,1
	60-64 ans	0,8	1,1	0,4	2,5	0,0	0,7	0,4
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,0	0,8	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,5	1,1	1,8	1,2	0,9	1,0
	55-59 ans	1,2	1,4	0,9	4,0	0,0	0,4	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0,0	2,1	1,1	0,0
	65-69 ans	1,0	0,7	1,4	1,5	0,0	0,6	1,6
	70-74 ans	1,1	1,6	0,4	2,1	0,0	1,5	0,5
	50-74 ans	1,1	1,2	0,8	1,9	0,9	0,9	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,7	0,3	1,3	0,0	2,8	0,4	1,0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,2	22,8	10,1	24,5	9,7	19,2	11,0
	55-59 ans	20,9	30,4	12,5	45,3	16,7	26,7	11,5
	60-64 ans	24,0	32,2	17,0	41,7	19,8	30,0	16,4
	65-69 ans	25,3	34,9	17,3	42,2	20,9	33,7	16,8
	70-74 ans	30,3	41,5	20,6	53,1	34,5	40,0	19,1
	50-74 ans	22,4	31,1	14,9	32,4	14,0	30,5	15,2
	50-74 ans **	22,6	31,0	14,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	14,1	5,5	15,0	5,7	12,4	5,1
	55-59 ans	13,7	21,4	6,8	32,4	11,2	18,6	5,8
	60-64 ans	15,3	20,9	10,6	27,1	16,0	19,5	9,6
	65-69 ans	15,5	21,2	10,8	25,5	14,9	20,5	10,2
	70-74 ans	18,3	25,7	11,8	36,6	17,2	24,3	11,3
	50-74 ans	13,9	19,9	8,7	20,8	9,0	19,4	8,6
	50-74 ans **	14,1	20,0	8,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	12,3	4,2	12,6	4,1	11,7	4,3
	55-59 ans	11,3	17,5	5,8	26,4	9,3	15,3	5,0
	60-64 ans	11,8	16,1	8,0	21,2	10,7	15,0	7,5
	65-69 ans	12,5	17,3	8,6	21,6	11,9	16,5	8,1
	70-74 ans	14,3	19,4	9,8	31,1	15,3	17,8	9,2
	50-74 ans	11,2	16,0	7,0	17,2	6,8	15,5	7,0
	50-74 ans **	11,3	16,1	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	13,4	4,9	13,8	5,0	12,7	4,8
	55-59 ans	13,8	21,9	6,7	33,8	11,8	19,0	5,5
	60-64 ans	15,2	21,4	9,9	27,1	15,2	20,1	8,9
	65-69 ans	15,9	22,7	10,3	29,4	12,9	21,6	10,0
	70-74 ans	18,5	27,2	11,1	36,6	19,2	25,9	10,3
	50-74 ans	13,9	20,4	8,2	20,6	8,5	20,3	8,1
	50-74 ans **	14,1	20,5	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,5	2,0	1,6
	55-59 ans	2,3	2,7	2,0	5,4	2,5	2,0	1,9
	60-64 ans	3,1	4,1	2,3	6,6	3,8	3,5	2,1
	65-69 ans	4,9	7,2	3,0	8,8	6,0	6,9	2,6
	70-74 ans	6,8	9,5	4,5	22,0	11,5	7,8	3,8
	50-74 ans	3,5	4,6	2,5	4,8	2,7	4,5	2,4
	50-74 ans **	3,4	4,4	2,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,7	5,3	6,3	12,5	0,0	0,0	8,3
	60-64 ans	6,1	3,4	10,0	0,0	0,0	4,8	13,3
	65-69 ans	5,3	6,0	3,8	0,0	0,0	7,3	5,0
	70-74 ans	5,9	6,7	4,3	0,0	0,0	9,1	5,3
	50-74 ans	5,0	5,0	5,0	2,0	0,0	6,4	6,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)