

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 513	5 906	6 607	4 001	4 252	1 905	2 355
	55-59 ans	11 443	5 264	6 179	1 094	1 187	4 170	4 992
	60-64 ans	12 518	5 635	6 883	1 184	1 093	4 451	5 790
	65-69 ans	12 975	5 863	7 112	913	824	4 950	6 288
	70-74 ans	8 380	3 896	4 484	493	455	3 403	4 029
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 829</b>	<b>26 564</b>	<b>31 265</b>	<b>7 685</b>	<b>7 811</b>	<b>18 879</b>	<b>23 454</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	696	329	367	243	270	86	97
	55-59 ans	606	292	314	82	74	210	240
	60-64 ans	594	245	349	65	73	180	276
	65-69 ans	654	308	346	65	50	243	296
	70-74 ans	491	231	260	35	30	196	230
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 041</b>	<b>1 405</b>	<b>1 636</b>	<b>490</b>	<b>497</b>	<b>915</b>	<b>1 139</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	574	277	297	202	217	75	80
	55-59 ans	511	247	264	62	51	185	213
	60-64 ans	504	207	297	48	54	159	243
	65-69 ans	590	275	315	53	45	222	270
	70-74 ans	416	196	220	29	22	167	198
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 595</b>	<b>1 202</b>	<b>1 393</b>	<b>394</b>	<b>389</b>	<b>808</b>	<b>1 004</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	122	52	70	41	53	11	17
	55-59 ans	95	45	50	20	23	25	27
	60-64 ans	90	38	52	17	19	21	33
	65-69 ans	64	33	31	12	5	21	26
	70-74 ans	75	35	40	6	8	29	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>446</b>	<b>203</b>	<b>243</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>135</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 391	5 854	6 537	3 960	4 199	1 894	2 338
	55-59 ans	11 348	5 219	6 129	1 074	1 164	4 145	4 965
	60-64 ans	12 428	5 597	6 831	1 167	1 074	4 430	5 757
	65-69 ans	12 911	5 830	7 081	901	819	4 929	6 262
	70-74 ans	8 305	3 861	4 444	487	447	3 374	3 997
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 383</b>	<b>26 361</b>	<b>31 022</b>	<b>7 589</b>	<b>7 703</b>	<b>18 772</b>	<b>23 319</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	451	257	194	183	126	74	68
	55-59 ans	470	272	198	75	55	197	143
	60-64 ans	568	345	223	76	56	269	167
	65-69 ans	613	373	240	82	44	291	196

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 50 - Manche

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	531	327	204	52	25	275	179
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 633</b>	<b>1 574</b>	<b>1 059</b>	<b>468</b>	<b>306</b>	<b>1 106</b>	<b>753</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	446	254	192	180	124	74	68
	55-59 ans	462	268	194	74	54	194	140
	60-64 ans	555	337	218	73	54	264	164
	65-69 ans	598	364	234	79	44	285	190
	70-74 ans	513	318	195	52	24	266	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 574</b>	<b>1 541</b>	<b>1 033</b>	<b>458</b>	<b>300</b>	<b>1 083</b>	<b>733</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	421	239	182	171	117	68	65
	55-59 ans	435	253	182	67	47	186	135
	60-64 ans	527	319	208	67	52	252	156
	65-69 ans	564	343	221	73	43	270	178
	70-74 ans	476	293	183	45	22	248	161
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 423</b>	<b>1 447</b>	<b>976</b>	<b>423</b>	<b>281</b>	<b>1 024</b>	<b>695</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	403	228	175	162	114	66	61
	55-59 ans	424	245	179	64	46	181	133
	60-64 ans	503	309	194	63	47	246	147
	65-69 ans	534	325	209	67	39	258	170
	70-74 ans	448	274	174	41	20	233	154
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 312</b>	<b>1 381</b>	<b>931</b>	<b>397</b>	<b>266</b>	<b>984</b>	<b>665</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	417	236	181	168	116	68	65
	55-59 ans	428	246	182	66	47	180	135
	60-64 ans	518	316	202	65	51	251	151
	65-69 ans	546	334	212	70	39	264	173
	70-74 ans	460	284	176	44	22	240	154
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 369</b>	<b>1 416</b>	<b>953</b>	<b>413</b>	<b>275</b>	<b>1 003</b>	<b>678</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0
	60-64 ans	9	3	6	2	1	1	5
	65-69 ans	18	9	9	3	4	6	5
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>17</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	418	237	181	169	117	68	64
	55-59 ans	435	253	182	67	47	186	135
	60-64 ans	527	319	208	67	52	252	156
	65-69 ans	561	342	219	73	42	269	177
	70-74 ans	474	291	183	45	22	246	161
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 415</b>	<b>1 442</b>	<b>973</b>	<b>421</b>	<b>280</b>	<b>1 021</b>	<b>693</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	421	239	182	171	117	68	65
	55-59 ans	438	253	185	67	48	186	137
	60-64 ans	527	319	208	67	52	252	156
	65-69 ans	571	349	222	75	43	274	179
	70-74 ans	482	296	186	45	22	251	164
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 439</b>	<b>1 456</b>	<b>983</b>	<b>425</b>	<b>282</b>	<b>1 031</b>	<b>701</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	167	83	84	60	53	23	31
	55-59 ans	128	55	73	13	19	42	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 50 - Manche

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	159	76	83	14	21	62	62
	65-69 ans	175	84	91	14	20	70	71
	70-74 ans	133	69	64	8	9	61	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>762</b>	<b>367</b>	<b>395</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>258</b>	<b>273</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	29	14	15	9	13	5	2
	55-59 ans	42	16	26	6	5	10	21
	60-64 ans	51	27	24	2	9	25	15
	65-69 ans	41	23	18	4	6	19	12
	70-74 ans	37	23	14	1	0	22	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>64</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	67	42	25	27	16	15	9
	55-59 ans	93	66	27	14	8	52	19
	60-64 ans	91	63	28	14	7	49	21
	65-69 ans	100	64	36	11	4	53	32
	70-74 ans	96	69	27	9	3	60	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>447</b>	<b>304</b>	<b>143</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>229</b>	<b>105</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	119	75	44	59	28	16	16
	55-59 ans	130	92	38	23	10	69	28
	60-64 ans	161	106	55	21	11	85	44
	65-69 ans	178	131	47	33	10	98	37
	70-74 ans	150	88	62	8	9	80	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>738</b>	<b>492</b>	<b>246</b>	<b>144</b>	<b>68</b>	<b>348</b>	<b>178</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	25	17	8	11	2	6	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	36	21	15	10	5	11	10
	60-64 ans	48	37	11	14	2	23	9
	65-69 ans	66	43	23	11	3	32	20
	70-74 ans	51	37	14	16	1	21	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>58</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	0	3	3	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	186	117	69	86	44	31	25
	55-59 ans	224	158	66	37	19	121	47
	60-64 ans	252	169	83	35	18	134	65
	65-69 ans	278	195	83	44	14	151	69
	70-74 ans	246	157	89	17	12	140	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 186</b>	<b>796</b>	<b>390</b>	<b>219</b>	<b>107</b>	<b>577</b>	<b>283</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 50 - Manche

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	119	75	44	59	28	16	16
	55-59 ans	130	92	38	23	10	69	28
	60-64 ans	161	106	55	21	11	85	44
	65-69 ans	178	131	47	33	10	98	37
	70-74 ans	150	88	62	8	9	80	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>738</b>	<b>492</b>	<b>246</b>	<b>144</b>	<b>68</b>	<b>348</b>	<b>178</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	108	69	39	54	25	15	14
	55-59 ans	119	84	35	21	10	63	25
	60-64 ans	143	94	49	19	10	75	39
	65-69 ans	161	120	41	29	8	91	33
	70-74 ans	133	78	55	6	9	72	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>664</b>	<b>445</b>	<b>219</b>	<b>129</b>	<b>62</b>	<b>316</b>	<b>157</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	120	77	43	58	27	19	16
	55-59 ans	131	92	39	25	11	67	28
	60-64 ans	164	107	57	23	11	84	46
	65-69 ans	182	135	47	34	9	101	38
	70-74 ans	160	95	65	9	9	86	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>757</b>	<b>506</b>	<b>251</b>	<b>149</b>	<b>67</b>	<b>357</b>	<b>184</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	25	17	8	11	2	6	6
	55-59 ans	36	21	15	10	5	11	10
	60-64 ans	48	37	11	14	2	23	9
	65-69 ans	66	43	23	11	3	32	20
	70-74 ans	51	37	14	16	1	21	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>58</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	14	8	9	2	5	6
	55-59 ans	32	18	14	9	4	9	10
	60-64 ans	46	36	10	14	2	22	8
	65-69 ans	61	40	21	11	3	29	18
	70-74 ans	49	36	13	16	1	20	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 50 - Manche

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>144</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>54</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	20	13	7	9	2	4	5
	55-59 ans	32	18	14	9	4	9	10
	60-64 ans	45	35	10	13	2	22	8
	65-69 ans	59	38	21	10	3	28	18
	70-74 ans	47	35	12	16	0	19	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>139</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>53</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	7	5	4	1	3	4
	55-59 ans	17	7	10	6	2	1	8
	60-64 ans	28	22	6	10	1	12	5
	65-69 ans	40	23	17	5	3	18	14
	70-74 ans	35	27	8	12	0	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>86</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>39</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	15	11	4	3	2	8	2
	60-64 ans	17	13	4	3	1	10	3
	65-69 ans	19	15	4	5	0	10	4
	70-74 ans	12	8	4	4	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>14</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	6	3	4	0	2	3
	55-59 ans	12	5	7	4	0	1	7
	60-64 ans	11	9	2	4	0	5	2
	65-69 ans	25	16	9	2	1	14	8
	70-74 ans	15	10	5	5	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>25</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	6	2	4	2	2	0	2
	70-74 ans	7	6	1	3	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	11	9	2	4	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	19	12	7	9	2	3	5
	55-59 ans	32	18	14	9	4	9	10
	60-64 ans	45	35	10	13	2	22	8
	65-69 ans	58	37	21	9	3	28	18
	70-74 ans	47	35	12	16	0	19	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>137</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>81</b>	<b>53</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	15	10	9	7	6	3
	55-59 ans	24	14	10	6	7	8	3
	60-64 ans	26	17	9	6	2	11	7
	65-69 ans	29	17	12	5	1	12	11
	70-74 ans	27	18	9	6	2	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>31</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,6	5,6	6,1	6,3	4,5	4,1
	55-59 ans	5,3	5,5	5,1	7,5	6,2	5,0	4,8
	60-64 ans	4,7	4,3	5,1	5,5	6,7	4,0	4,8
	65-69 ans	5,0	5,3	4,9	7,1	6,1	4,9	4,7
	70-74 ans	5,9	5,9	5,8	7,1	6,6	5,8	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	0,9	1,1	1,0	1,2	0,6	0,7
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	1,8	1,9	0,6	0,5
	60-64 ans	0,7	0,7	0,8	1,4	1,7	0,5	0,6
	65-69 ans	0,5	0,6	0,4	1,3	0,6	0,4	0,4
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,2	1,8	0,9	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	82,5	84,2	80,9	83,1	80,4	87,2	82,5
	55-59 ans	84,3	84,6	84,1	75,6	68,9	88,1	88,8
	60-64 ans	84,8	84,5	85,1	73,8	74,0	88,3	88,0
	65-69 ans	90,2	89,3	91,0	81,5	90,0	91,4	91,2
	70-74 ans	84,7	84,8	84,6	82,9	73,3	85,2	86,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,3</b>	<b>85,6</b>	<b>85,1</b>	<b>80,4</b>	<b>78,3</b>	<b>88,3</b>	<b>88,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,4	3,0	4,6	3,0	3,9	2,9
	55-59 ans	4,1	5,2	3,2	7,0	4,7	4,8	2,9
	60-64 ans	4,6	6,2	3,3	6,5	5,2	6,1	2,9
	65-69 ans	4,7	6,4	3,4	9,1	5,4	5,9	3,1
	70-74 ans	6,4	8,5	4,6	10,7	5,6	8,2	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,8	99,0	98,4	98,4	100,0	100,0
	55-59 ans	98,3	98,5	98,0	98,7	98,2	98,5	97,9
	60-64 ans	97,7	97,7	97,8	96,1	96,4	98,1	98,2
	65-69 ans	97,6	97,6	97,5	96,3	100,0	97,9	96,9
	70-74 ans	96,6	97,2	95,6	100,0	96,0	96,7	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>97,9</b>	<b>98,0</b>	<b>97,9</b>	<b>97,3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,4	94,1	94,8	95,0	94,4	91,9	95,6
	55-59 ans	94,2	94,4	93,8	90,5	87,0	95,9	96,4
	60-64 ans	95,0	94,7	95,4	91,8	96,3	95,5	95,1
	65-69 ans	94,3	94,2	94,4	92,4	97,7	94,7	93,7
	70-74 ans	92,8	92,1	93,8	86,5	91,7	93,2	94,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,1</b>	<b>93,9</b>	<b>94,5</b>	<b>92,4</b>	<b>93,7</b>	<b>94,6</b>	<b>94,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	95,4	96,2	94,7	97,4	97,1	93,8
	55-59 ans	97,5	96,8	98,4	95,5	97,9	97,3	98,5
	60-64 ans	95,4	96,9	93,3	94,0	90,4	97,6	94,2
	65-69 ans	94,7	94,8	94,6	91,8	90,7	95,6	95,5
	70-74 ans	94,1	93,5	95,1	91,1	90,9	94,0	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>	<b>93,9</b>	<b>94,7</b>	<b>96,1</b>	<b>95,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	144	147	141	149	138	142	146
	55-59 ans	132	125	143	135	151	121	140
	60-64 ans	117	118	115	122	113	117	115
	65-69 ans	113	116	108	139	122	110	104
	70-74 ans	122	124	120	133	148	122	116
	<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>119</b>	<b>121</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114 (77-175)	113,5 (76-167)	117 (78-179)	114 (76-167)	117 (79-175)	111,5 (76-172)	118 (77-195)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	109 (75-158)	110 (75-154)	108 (75-162)	110 (74-162)	93 (70-162)	110,5 (75-151)	110 (76-164)
	60-64 ans	94 (67-143)	95 (69-141)	93,5 (63-145,5)	93 (67-134)	89 (54,5-151,5)	97,5 (70-145)	94,5 (65,5-138)
	65-69 ans	92 (66-135)	93,5 (67-141)	90 (63-130)	98 (70-162)	99 (76-131)	92 (65-135)	88 (61-130)
	70-74 ans	102,5 (67-147)	103 (67-145)	101 (67-152)	118 (74-157)	98 (78-185)	99 (66-142)	101 (67-147)
	<b>50-74 ans</b>	<b>101 (70-150)</b>	<b>102 (70-147)</b>	<b>100,5 (69-152,5)</b>	<b>107,5 (73-160)</b>	<b>106 (74-162)</b>	<b>98 (69-145)</b>	<b>98 (67-151)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	5,8	5,2	4,9	5,6	8,1	4,4
	55-59 ans	5,1	5,1	5,1	8,0	12,7	4,1	2,1
	60-64 ans	4,6	4,9	4,0	7,9	3,6	4,1	4,2
	65-69 ans	4,7	4,6	5,0	6,1	2,3	4,1	5,6
	70-74 ans	5,1	5,5	4,4	11,5	8,0	4,4	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,2	99,5	98,8	100,0	100,0	98,5
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,7	99,1	100,0	97,7	99,6	99,4
	70-74 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,7	34,7	46,2	35,1	45,3	33,8	47,7
	55-59 ans	29,2	21,7	39,5	19,4	39,6	22,6	39,4
	60-64 ans	30,2	23,8	39,9	20,9	40,4	24,6	39,7
	65-69 ans	30,6	24,1	41,0	18,7	46,5	25,5	39,7
	70-74 ans	27,6	23,3	34,4	17,8	40,9	24,3	33,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,2</b>	<b>25,2</b>	<b>40,2</b>	<b>25,6</b>	<b>43,3</b>	<b>25,0</b>	<b>38,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	5,9	8,2	5,3	11,1	7,4	3,1
	55-59 ans	9,6	6,3	14,1	9,0	10,4	5,4	15,3
	60-64 ans	9,7	8,5	11,5	3,0	17,3	9,9	9,6
	65-69 ans	7,2	6,6	8,1	5,3	14,0	6,9	6,7
	70-74 ans	7,7	7,8	7,5	2,2	0,0	8,8	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>9,9</b>	<b>5,2</b>	<b>11,7</b>	<b>7,9</b>	<b>9,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,8	1,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,5	0,0	1,9	1,2	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,2
	70-74 ans	0,8	0,3	1,6	2,2	0,0	0,0	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,9	17,6	13,7	15,8	13,7	22,1	13,8
	55-59 ans	21,2	26,1	14,6	20,9	16,7	28,0	13,9
	60-64 ans	17,3	19,7	13,5	20,9	13,5	19,4	13,5
	65-69 ans	17,5	18,3	16,2	14,7	9,3	19,3	17,9
	70-74 ans	19,9	23,3	14,5	20,0	13,6	23,9	14,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>20,9</b>	<b>14,5</b>	<b>17,6</b>	<b>13,5</b>	<b>22,2</b>	<b>15,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,3	31,4	24,2	34,5	23,9	23,5	24,6
	55-59 ans	29,7	36,4	20,5	34,3	20,8	37,1	20,4
	60-64 ans	30,6	33,2	26,4	31,3	21,2	33,7	28,2
	65-69 ans	31,2	37,5	21,2	44,0	23,3	35,8	20,7
	70-74 ans	31,1	29,7	33,3	17,8	40,9	31,9	32,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,3</b>	<b>33,8</b>	<b>25,0</b>	<b>33,9</b>	<b>24,1</b>	<b>33,8</b>	<b>25,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	7,1	4,4	6,4	1,7	8,8	9,2
	55-59 ans	8,2	8,3	8,1	14,9	10,4	5,9	7,3
	60-64 ans	9,1	11,6	5,3	20,9	3,8	9,1	5,8
	65-69 ans	11,6	12,3	10,4	14,7	7,0	11,7	11,2
	70-74 ans	10,6	12,5	7,5	35,6	4,5	8,4	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>10,6</b>	<b>7,2</b>	<b>14,6</b>	<b>4,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	0,0	2,6	4,4	0,0
	55-59 ans	1,6	0,8	2,7	0,0	0,0	1,1	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	1,5	0,0	2,0	2,6
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	2,7	0,0	0,4	1,1
	70-74 ans	2,1	2,7	1,1	4,4	0,0	2,4	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0,8	0,5	1,2	0,0	0,0	1,5
	55-59 ans	0,5	0,4	0,5	1,5	2,1	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,3	1,0	1,5	1,9	0,0	0,6
	65-69 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	0,4	0,6
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,0	20,0	10,6	21,7	10,5	16,4	10,7
	55-59 ans	19,7	30,3	10,8	34,5	16,3	29,2	9,5
	60-64 ans	20,3	30,2	12,2	30,0	16,8	30,2	11,3
	65-69 ans	21,5	33,4	11,7	48,8	17,1	30,6	11,0
	70-74 ans	29,6	40,7	20,0	34,9	26,8	41,5	19,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>30,2</b>	<b>12,6</b>	<b>28,9</b>	<b>13,9</b>	<b>30,7</b>	<b>12,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>20,7</b>	<b>29,5</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	12,8	6,7	14,9	6,7	8,4	6,8
	55-59 ans	11,5	17,6	6,2	21,4	8,6	16,6	5,6
	60-64 ans	13,0	18,9	8,1	18,0	10,2	19,2	7,6
	65-69 ans	13,8	22,5	6,6	36,6	12,2	19,9	5,9
	70-74 ans	18,1	22,8	14,0	16,4	20,1	23,7	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>18,7</b>	<b>7,9</b>	<b>19,0</b>	<b>8,8</b>	<b>18,5</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,8</b>	<b>18,1</b>	<b>8,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	11,8	6,0	13,6	6,0	7,9	6,0
	55-59 ans	10,5	16,1	5,7	19,6	8,6	15,2	5,0
	60-64 ans	11,5	16,8	7,2	16,3	9,3	16,9	6,8
	65-69 ans	12,5	20,6	5,8	32,2	9,8	18,5	5,3
	70-74 ans	16,0	20,2	12,4	12,3	20,1	21,3	11,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>16,9</b>	<b>7,1</b>	<b>17,0</b>	<b>8,0</b>	<b>16,8</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,5</b>	<b>16,4</b>	<b>7,1</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,2	6,6	14,6	6,4	10,0	6,8
	55-59 ans	11,5	17,6	6,4	23,3	9,5	16,2	5,6
	60-64 ans	13,2	19,1	8,3	19,7	10,2	19,0	8,0
	65-69 ans	14,1	23,2	6,6	37,7	11,0	20,5	6,1
	70-74 ans	19,3	24,6	14,6	18,5	20,1	25,5	14,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>19,2</b>	<b>8,1</b>	<b>19,6</b>	<b>8,7</b>	<b>19,0</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,1</b>	<b>18,6</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	2,9	1,2	2,8	0,5	3,2	2,6
	55-59 ans	3,2	4,0	2,4	9,3	4,3	2,7	2,0
	60-64 ans	3,9	6,6	1,6	12,0	1,9	5,2	1,6
	65-69 ans	5,1	7,4	3,2	12,2	3,7	6,5	3,2
	70-74 ans	6,1	9,6	3,2	32,9	2,2	6,2	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,9</b>	<b>2,3</b>	<b>8,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	9,1	7,1	12,5	0,0	0,0	20,0	16,7
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,2	2,8	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	3,3	5,0	0,0	9,1	0,0	3,4	0,0
	70-74 ans	4,1	2,8	7,7	0,0	100,0	5,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>8,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)