

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 244	1 933	2 311	1 572	1 800	361	511
	55-59 ans	4 061	1 845	2 216	557	598	1 288	1 618
	60-64 ans	4 925	2 155	2 770	586	614	1 569	2 156
	65-69 ans	5 302	2 422	2 880	533	502	1 889	2 378
	70-74 ans	3 464	1 602	1 862	281	277	1 321	1 585
	50-74 ans	21 996	9 957	12 039	3 529	3 791	6 428	8 248
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	326	155	171	131	140	24	31
	55-59 ans	331	143	188	51	63	92	125
	60-64 ans	350	152	198	47	40	105	158
	65-69 ans	412	184	228	47	40	137	188
	70-74 ans	298	146	152	28	34	118	118
	50-74 ans	1 717	780	937	304	317	476	620
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	223	105	118	88	96	17	22
	55-59 ans	228	101	127	32	33	69	94
	60-64 ans	239	101	138	29	25	72	113
	65-69 ans	311	138	173	35	29	103	144
	70-74 ans	179	77	102	13	19	64	83
	50-74 ans	1 180	522	658	197	202	325	456
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	103	50	53	43	44	7	9
	55-59 ans	103	42	61	19	30	23	31
	60-64 ans	111	51	60	18	15	33	45
	65-69 ans	101	46	55	12	11	34	44
	70-74 ans	119	69	50	15	15	54	35
	50-74 ans	537	258	279	107	115	151	164
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 141	1 883	2 258	1 529	1 756	354	502
	55-59 ans	3 958	1 803	2 155	538	568	1 265	1 587
	60-64 ans	4 814	2 104	2 710	568	599	1 536	2 111
	65-69 ans	5 201	2 376	2 825	521	491	1 855	2 334
	70-74 ans	3 345	1 533	1 812	266	262	1 267	1 550
	50-74 ans	21 459	9 699	11 760	3 422	3 676	6 277	8 084
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	173	109	64	96	55	13	9
	55-59 ans	180	106	74	42	33	64	41
	60-64 ans	242	139	103	48	35	91	68
	65-69 ans	315	193	122	64	33	129	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	224	136	88	24	21	112	67
	50-74 ans	1 134	683	451	274	177	409	274
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	171	109	62	96	53	13	9
	55-59 ans	180	106	74	42	33	64	41
	60-64 ans	240	137	103	47	35	90	68
	65-69 ans	308	189	119	62	33	127	86
	70-74 ans	222	134	88	23	21	111	67
	50-74 ans	1 121	675	446	270	175	405	271
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	155	99	56	86	49	13	7
	55-59 ans	167	96	71	35	33	61	38
	60-64 ans	230	130	100	44	35	86	65
	65-69 ans	283	171	112	58	30	113	82
	70-74 ans	200	121	79	18	16	103	63
	50-74 ans	1 035	617	418	241	163	376	255
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	154	98	56	85	49	13	7
	55-59 ans	165	94	71	34	33	60	38
	60-64 ans	228	129	99	44	35	85	64
	65-69 ans	278	170	108	58	28	112	80
	70-74 ans	195	117	78	17	16	100	62
	50-74 ans	1 020	608	412	238	161	370	251
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	155	99	56	86	49	13	7
	55-59 ans	166	95	71	34	33	61	38
	60-64 ans	229	130	99	44	34	86	65
	65-69 ans	281	171	110	58	30	113	80
	70-74 ans	200	121	79	18	16	103	63
	50-74 ans	1 031	616	415	240	162	376	253
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	155	99	56	86	49	13	7
	55-59 ans	167	96	71	35	33	61	38
	60-64 ans	229	130	99	44	34	86	65
	65-69 ans	281	171	110	58	29	113	81
	70-74 ans	200	121	79	18	16	103	63
	50-74 ans	1 032	617	415	241	161	376	254
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	155	99	56	86	49	13	7
	55-59 ans	168	97	71	36	33	61	38
	60-64 ans	231	131	100	44	35	87	65
	65-69 ans	283	171	112	58	30	113	82
	70-74 ans	200	121	79	18	16	103	63
	50-74 ans	1 037	619	418	242	163	377	255
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66	40	26	34	22	6	4
	55-59 ans	63	30	33	9	13	21	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	77	31	46	12	11	19	35
	65-69 ans	103	57	46	19	11	38	35
	70-74 ans	58	20	38	0	7	20	31
	50-74 ans	367	178	189	74	64	104	125
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	4	7	4	6	0	1
	55-59 ans	9	5	4	5	1	0	3
	60-64 ans	20	11	9	4	1	7	8
	65-69 ans	10	7	3	3	0	4	3
	70-74 ans	17	13	4	1	1	12	3
	50-74 ans	67	40	27	17	9	23	18
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	21	15	6	10	5	5	1
	55-59 ans	26	14	12	2	7	12	5
	60-64 ans	35	26	9	6	2	20	7
	65-69 ans	50	32	18	13	4	19	14
	70-74 ans	36	23	13	1	1	22	12
	50-74 ans	168	110	58	32	19	78	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	41	30	11	29	11	1	0
	55-59 ans	60	44	16	17	11	27	5
	60-64 ans	72	45	27	14	14	31	13
	65-69 ans	81	52	29	13	6	39	23
	70-74 ans	56	41	15	10	4	31	11
	50-74 ans	310	212	98	83	46	129	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	16	12	4	5	2	7	2
	65-69 ans	24	17	7	8	5	9	2
	70-74 ans	23	14	9	5	3	9	6
	50-74 ans	72	48	24	23	13	25	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	15	10	5	3	3	7	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	21	12	9	4	3	8	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	62	45	17	39	16	6	1
	55-59 ans	86	58	28	19	18	39	10
	60-64 ans	107	71	36	20	16	51	20
	65-69 ans	131	84	47	26	10	58	37
	70-74 ans	92	64	28	11	5	53	23
	50-74 ans	478	322	156	115	65	207	91

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	41	30	11	29	11	1	0
	55-59 ans	60	44	16	17	11	27	5
	60-64 ans	72	45	27	14	14	31	13
	65-69 ans	81	52	29	13	6	39	23
	70-74 ans	56	41	15	10	4	31	11
	50-74 ans	310	212	98	83	46	129	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	36	25	11	24	11	1	0
	55-59 ans	52	38	14	15	10	23	4
	60-64 ans	59	38	21	13	11	25	10
	65-69 ans	69	46	23	11	5	35	18
	70-74 ans	50	35	15	9	4	26	11
	50-74 ans	266	182	84	72	41	110	43
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	25	11	24	11	1	0
	55-59 ans	58	42	16	16	11	26	5
	60-64 ans	70	47	23	14	12	33	11
	65-69 ans	77	50	27	12	7	38	20
	70-74 ans	59	43	16	10	4	33	12
	50-74 ans	300	207	93	76	45	131	48
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	16	12	4	5	2	7	2
	65-69 ans	24	17	7	8	5	9	2
	70-74 ans	23	14	9	5	3	9	6
	50-74 ans	72	48	24	23	13	25	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	15	12	3	5	1	7	2
	65-69 ans	19	13	6	5	4	8	2
	70-74 ans	22	14	8	5	3	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	64	43	21	19	11	24	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	8	7	1	4	1	3	0
	70-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
	50-74 ans	23	17	6	8	4	9	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	11	9	2	4	0	5	2
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
	50-74 ans	39	25	14	11	6	14	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	8	2	4	0	4	2
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	11	7	4	3	1	4	3
	50-74 ans	34	22	12	10	5	12	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	14	8	6	3	3	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	8	8	0	2	0	6	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	9	5	4	4	1	1	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	14	12	2	5	1	7	1
	65-69 ans	16	12	4	5	2	7	2
	70-74 ans	21	14	7	5	3	9	4
	50-74 ans	59	42	17	19	9	23	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	9	6	3	2	2	4	1
	70-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
	50-74 ans	28	17	11	10	5	7	6

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 58 - Nièvre

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,0	7,4	8,3	7,8	6,6	6,1
	55-59 ans	8,2	7,8	8,5	9,2	10,5	7,1	7,7
	60-64 ans	7,1	7,1	7,1	8,0	6,5	6,7	7,3
	65-69 ans	7,8	7,6	7,9	8,8	8,0	7,3	7,9
	70-74 ans	8,6	9,1	8,2	10,0	12,3	8,9	7,4
	50-74 ans	7,8	7,8	7,8	8,6	8,4	7,4	7,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,3	2,7	2,4	1,9	1,8
	55-59 ans	2,5	2,3	2,8	3,4	5,0	1,8	1,9
	60-64 ans	2,3	2,4	2,2	3,1	2,4	2,1	2,1
	65-69 ans	1,9	1,9	1,9	2,3	2,2	1,8	1,9
	70-74 ans	3,4	4,3	2,7	5,3	5,4	4,1	2,2
	50-74 ans	2,4	2,6	2,3	3,0	3,0	2,3	2,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,4	67,7	69,0	67,2	68,6	70,8	71,0
	55-59 ans	68,9	70,6	67,6	62,7	52,4	75,0	75,2
	60-64 ans	68,3	66,4	69,7	61,7	62,5	68,6	71,5
	65-69 ans	75,5	75,0	75,9	74,5	72,5	75,2	76,6
	70-74 ans	60,1	52,7	67,1	46,4	55,9	54,2	70,3
	50-74 ans	68,7	66,9	70,2	64,8	63,7	68,3	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	5,8	2,8	6,3	3,1	3,7	1,8
	55-59 ans	4,5	5,9	3,4	7,8	5,8	5,1	2,6
	60-64 ans	5,0	6,6	3,8	8,5	5,8	5,9	3,2
	65-69 ans	6,1	8,1	4,3	12,3	6,7	7,0	3,8
	70-74 ans	6,7	8,9	4,9	9,0	8,0	8,8	4,3
	50-74 ans	5,3	7,0	3,8	8,0	4,8	6,5	3,4
50-74 ans **	5,2	6,7	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	100,0	96,9	100,0	96,4	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,2	98,6	100,0	97,9	100,0	98,9	100,0
	65-69 ans	97,8	97,9	97,5	96,9	100,0	98,4	96,6
	70-74 ans	99,1	98,5	100,0	95,8	100,0	99,1	100,0
	50-74 ans	98,9	98,8	98,9	98,5	98,9	99,0	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	90,8	90,3	89,6	92,5	100,0	77,8
	55-59 ans	92,8	90,6	95,9	83,3	100,0	95,3	92,7
	60-64 ans	95,8	94,9	97,1	93,6	100,0	95,6	95,6
	65-69 ans	91,9	90,5	94,1	93,5	90,9	89,0	95,3
	70-74 ans	90,1	90,3	89,8	78,3	76,2	92,8	94,0
	50-74 ans	92,3	91,4	93,7	89,3	93,1	92,8	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	99,0	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	97,9	100,0	97,1	100,0	98,4	100,0
	60-64 ans	99,1	99,2	99,0	100,0	100,0	98,8	98,5
	65-69 ans	98,2	99,4	96,4	100,0	93,3	99,1	97,6
	70-74 ans	97,5	96,7	98,7	94,4	100,0	97,1	98,4
	50-74 ans	98,6	98,5	98,6	98,8	98,8	98,4	98,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	102	86	103	81	93	124
	55-59 ans	95	102	86	134	105	84	70
	60-64 ans	88	91	83	78	108	98	70
	65-69 ans	89	94	82	100	77	90	84
	70-74 ans	88	88	87	96	111	87	81
	50-74 ans	91	95	84	102	94	90	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (49-110)	77 (48-115)	67 (52-96,5)	79,5 (48-115)	69 (51-96)	74 (64-127)	61 (53-257)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	71 (48-113)	73 (49-119,5)	68 (42-110)	79 (57-236)	90 (54-133)	69 (49-98)	52 (37-93)
	60-64 ans	70 (47-97)	75,5 (48-101)	67 (46,5-90)	70 (45-89,5)	74 (48-135)	76 (49-104)	63 (46-84)
	65-69 ans	71 (52-103)	75 (54-105)	68 (49-101,5)	79 (57-101)	71 (45-91)	73 (52-105)	67,5 (49-102)
	70-74 ans	69,5 (50-109)	70 (48-113)	68 (55-103)	94,5 (59-110)	92 (65,5-146,5)	65 (48-114)	67 (52-90)
	50-74 ans	71 (49-104)	74 (49-110)	68 (49-97)	76 (54-111)	74 (53-113)	72,5 (48-105,5)	64 (47-90)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	4,6	1,6	5,2	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	4,9
	60-64 ans	2,5	3,6	1,0	4,2	0,0	3,3	1,5
	65-69 ans	2,9	3,1	2,5	3,1	6,1	3,1	1,1
	70-74 ans	2,2	0,7	4,5	4,2	9,5	0,0	3,0
	50-74 ans	2,5	2,5	2,4	3,6	2,8	1,7	2,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	97,1	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	100,0	98,2	100,0	96,7	100,0	98,8
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	98,8	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,6	40,4	46,4	39,5	44,9	46,2	57,1
	55-59 ans	37,5	30,9	46,5	25,0	39,4	34,4	52,6
	60-64 ans	33,3	23,7	46,0	27,3	31,4	21,8	53,8
	65-69 ans	36,4	33,3	41,1	32,8	36,7	33,6	42,7
	70-74 ans	29,0	16,5	48,1	0,0	43,8	19,4	49,2
	50-74 ans	35,4	28,8	45,2	30,6	39,3	27,6	49,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	4,0	12,5	4,7	12,2	0,0	14,3
	55-59 ans	5,4	5,2	5,6	13,9	3,0	0,0	7,9
	60-64 ans	8,7	8,4	9,0	9,1	2,9	8,0	12,3
	65-69 ans	3,5	4,1	2,7	5,2	0,0	3,5	3,7
	70-74 ans	8,5	10,7	5,1	5,6	6,3	11,7	4,8
	50-74 ans	6,5	6,5	6,5	7,0	5,5	6,1	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,8	2,1	1,4	5,6	3,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,9	0,8	1,0	2,3	2,9	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,6	0,9	1,7	3,3	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,7	2,1	1,8	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	15,2	10,7	11,6	10,2	38,5	14,3
	55-59 ans	15,5	14,4	16,9	5,6	21,2	19,7	13,2
	60-64 ans	15,2	19,8	9,0	13,6	5,7	23,0	10,8
	65-69 ans	17,7	18,7	16,1	22,4	13,3	16,8	17,1
	70-74 ans	18,0	19,0	16,5	5,6	6,3	21,4	19,0
	50-74 ans	16,2	17,8	13,9	13,2	11,7	20,7	15,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,5	30,3	19,6	33,7	22,4	7,7	0,0
	55-59 ans	35,7	45,4	22,5	47,2	33,3	44,3	13,2
	60-64 ans	31,2	34,4	27,0	31,8	40,0	35,6	20,0
	65-69 ans	28,6	30,4	25,9	22,4	20,0	34,5	28,0
	70-74 ans	28,0	33,9	19,0	55,6	25,0	30,1	17,5
	50-74 ans	29,9	34,2	23,4	34,3	28,2	34,2	20,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,1	5,4	5,8	6,1	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,6
	60-64 ans	6,9	9,2	4,0	11,4	5,7	8,0	3,1
	65-69 ans	8,5	9,9	6,3	13,8	16,7	8,0	2,4
	70-74 ans	11,5	11,6	11,4	27,8	18,8	8,7	9,5
	50-74 ans	6,9	7,8	5,7	9,5	8,0	6,6	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	2,0	3,6	1,2	4,1	7,7	0,0
	55-59 ans	1,2	1,0	1,4	2,8	0,0	0,0	2,6
	60-64 ans	1,3	1,5	1,0	2,3	2,9	1,1	0,0
	65-69 ans	0,7	0,6	0,9	0,0	0,0	0,9	1,2
	70-74 ans	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	1,2	1,8	1,9	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2,0	1,8	2,3	0,0	0,0	14,3
	55-59 ans	1,8	1,0	2,8	0,0	0,0	1,6	5,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,3	1,5	1,0	2,3	2,9	1,1	0,0
	65-69 ans	2,5	1,2	4,5	0,0	6,7	1,8	3,7
	70-74 ans	2,5	4,1	0,0	5,6	0,0	3,9	0,0
	50-74 ans	2,0	1,9	2,2	1,7	1,8	2,1	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	2,9	0,0	0,0
	65-69 ans	1,1	0,6	1,8	1,7	3,3	0,0	1,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,4	1,2	0,0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,0	23,9	7,5	25,5	9,1	16,9	2,0
	55-59 ans	21,7	32,2	13,0	35,3	31,7	30,8	6,3
	60-64 ans	22,2	33,7	13,3	35,2	26,7	33,2	9,5
	65-69 ans	25,2	35,4	16,6	49,9	20,4	31,3	15,9
	70-74 ans	27,5	41,7	15,5	41,4	19,1	41,8	14,8
	50-74 ans	22,3	33,2	13,3	33,6	17,7	33,0	11,3
	50-74 ans **	22,0	32,2	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	15,9	4,9	19,0	6,3	2,8	0,0
	55-59 ans	15,2	24,4	7,4	31,6	19,4	21,3	3,2
	60-64 ans	15,0	21,4	10,0	24,6	23,4	20,2	6,2
	65-69 ans	15,6	21,9	10,3	25,0	12,2	21,0	9,9
	70-74 ans	16,7	26,7	8,3	37,6	15,3	24,5	7,1
	50-74 ans	14,4	21,9	8,3	24,3	12,5	20,6	6,4
	50-74 ans **	14,4	21,6	7,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	13,3	4,9	15,7	6,3	2,8	0,0
	55-59 ans	13,1	21,1	6,5	27,9	17,6	18,2	2,5
	60-64 ans	12,3	18,1	7,7	22,9	18,4	16,3	4,7
	65-69 ans	13,3	19,4	8,1	21,1	10,2	18,9	7,7
	70-74 ans	14,9	22,8	8,3	33,8	15,3	20,5	7,1
	50-74 ans	12,4	18,8	7,1	21,0	11,2	17,5	5,3
	50-74 ans **	12,4	18,4	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	13,3	4,9	15,7	6,3	2,8	0,0
	55-59 ans	14,7	23,3	7,4	29,7	19,4	20,6	3,2
	60-64 ans	14,5	22,3	8,5	24,6	20,0	21,5	5,2
	65-69 ans	14,8	21,0	9,6	23,0	14,3	20,5	8,6
	70-74 ans	17,6	28,0	8,8	37,6	15,3	26,0	7,7
	50-74 ans	14,0	21,3	7,9	22,2	12,2	20,9	5,9
	50-74 ans **	13,9	20,9	7,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,3	3,3	1,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	60-64 ans	3,3	5,7	1,5	8,8	3,3	4,6	0,9
	65-69 ans	4,6	7,2	2,5	15,4	10,2	4,9	0,9
	70-74 ans	6,9	9,1	5,0	18,8	11,5	7,1	3,9
	50-74 ans	3,4	4,9	2,0	6,7	3,5	4,0	1,4
	50-74 ans **	3,0	4,2	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	28,6	25,0	33,3	25,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	26,7	25,0	33,3	20,0	100,0	28,6	0,0
	65-69 ans	42,1	53,8	16,7	80,0	25,0	37,5	0,0
	70-74 ans	40,9	42,9	37,5	40,0	33,3	44,4	40,0
	50-74 ans	35,9	39,5	28,6	42,1	36,4	37,5	20,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)