

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

1/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 14 825 | 7 052 | 7 773 | 5 011 | 5 342 | 2 041 | 2 431 |
| | 55-59 ans | 13 640 | 6 240 | 7 400 | 993 | 1 099 | 5 247 | 6 301 |
| | 60-64 ans | 13 988 | 6 277 | 7 711 | 683 | 715 | 5 594 | 6 996 |
| | 65-69 ans | 14 761 | 6 695 | 8 066 | 589 | 615 | 6 106 | 7 451 |
| | 70-74 ans | 10 229 | 4 711 | 5 518 | 332 | 311 | 4 379 | 5 207 |
| | 50-74 ans | 67 443 | 30 975 | 36 468 | 7 608 | 8 082 | 23 367 | 28 386 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 760 | 399 | 361 | 305 | 264 | 94 | 97 |
| | 55-59 ans | 809 | 362 | 447 | 87 | 91 | 275 | 356 |
| | 60-64 ans | 746 | 342 | 404 | 36 | 47 | 306 | 357 |
| | 65-69 ans | 815 | 382 | 433 | 30 | 44 | 352 | 389 |
| | 70-74 ans | 645 | 297 | 348 | 24 | 22 | 273 | 326 |
| | 50-74 ans | 3 775 | 1 782 | 1 993 | 482 | 468 | 1 300 | 1 525 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 524 | 271 | 253 | 198 | 172 | 73 | 81 |
| | 55-59 ans | 595 | 265 | 330 | 44 | 59 | 221 | 271 |
| | 60-64 ans | 608 | 281 | 327 | 25 | 31 | 256 | 296 |
| | 65-69 ans | 652 | 308 | 344 | 21 | 24 | 287 | 320 |
| | 70-74 ans | 498 | 237 | 261 | 16 | 15 | 221 | 246 |
| | 50-74 ans | 2 877 | 1 362 | 1 515 | 304 | 301 | 1 058 | 1 214 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 236 | 128 | 108 | 107 | 92 | 21 | 16 |
| | 55-59 ans | 214 | 97 | 117 | 43 | 32 | 54 | 85 |
| | 60-64 ans | 138 | 61 | 77 | 11 | 16 | 50 | 61 |
| | 65-69 ans | 163 | 74 | 89 | 9 | 20 | 65 | 69 |
| | 70-74 ans | 147 | 60 | 87 | 8 | 7 | 52 | 80 |
| | 50-74 ans | 898 | 420 | 478 | 178 | 167 | 242 | 311 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 14 589 | 6 924 | 7 665 | 4 904 | 5 250 | 2 020 | 2 415 |
| | 55-59 ans | 13 426 | 6 143 | 7 283 | 950 | 1 067 | 5 193 | 6 216 |
| | 60-64 ans | 13 850 | 6 216 | 7 634 | 672 | 699 | 5 544 | 6 935 |
| | 65-69 ans | 14 598 | 6 621 | 7 977 | 580 | 595 | 6 041 | 7 382 |
| | 70-74 ans | 10 082 | 4 651 | 5 431 | 324 | 304 | 4 327 | 5 127 |
| | 50-74 ans | 66 545 | 30 555 | 35 990 | 7 430 | 7 915 | 23 125 | 28 075 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 495 | 283 | 212 | 203 | 148 | 80 | 64 |
| | 55-59 ans | 491 | 280 | 211 | 57 | 45 | 223 | 166 |
| | 60-64 ans | 668 | 385 | 283 | 58 | 34 | 327 | 249 |
| | 65-69 ans | 744 | 449 | 295 | 42 | 24 | 407 | 271 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 573 | 328 | 245 | 29 | 17 | 299 | 228 |
| | 50-74 ans | 2 971 | 1 725 | 1 246 | 389 | 268 | 1 336 | 978 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 494 | 282 | 212 | 202 | 148 | 80 | 64 |
| | 55-59 ans | 489 | 279 | 210 | 57 | 44 | 222 | 166 |
| | 60-64 ans | 666 | 383 | 283 | 58 | 34 | 325 | 249 |
| | 65-69 ans | 734 | 445 | 289 | 42 | 23 | 403 | 266 |
| | 70-74 ans | 560 | 320 | 240 | 28 | 16 | 292 | 224 |
| | 50-74 ans | 2 943 | 1 709 | 1 234 | 387 | 265 | 1 322 | 969 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 464 | 268 | 196 | 191 | 134 | 77 | 62 |
| | 55-59 ans | 457 | 262 | 195 | 54 | 40 | 208 | 155 |
| | 60-64 ans | 636 | 366 | 270 | 52 | 33 | 314 | 237 |
| | 65-69 ans | 692 | 421 | 271 | 38 | 20 | 383 | 251 |
| | 70-74 ans | 515 | 294 | 221 | 25 | 13 | 269 | 208 |
| | 50-74 ans | 2 764 | 1 611 | 1 153 | 360 | 240 | 1 251 | 913 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 456 | 263 | 193 | 186 | 131 | 77 | 62 |
| | 55-59 ans | 454 | 260 | 194 | 54 | 39 | 206 | 155 |
| | 60-64 ans | 630 | 362 | 268 | 51 | 33 | 311 | 235 |
| | 65-69 ans | 682 | 414 | 268 | 37 | 20 | 377 | 248 |
| | 70-74 ans | 512 | 293 | 219 | 25 | 13 | 268 | 206 |
| | 50-74 ans | 2 734 | 1 592 | 1 142 | 353 | 236 | 1 239 | 906 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 458 | 264 | 194 | 187 | 132 | 77 | 62 |
| | 55-59 ans | 455 | 261 | 194 | 54 | 39 | 207 | 155 |
| | 60-64 ans | 633 | 364 | 269 | 51 | 33 | 313 | 236 |
| | 65-69 ans | 685 | 416 | 269 | 37 | 20 | 379 | 249 |
| | 70-74 ans | 513 | 294 | 219 | 25 | 13 | 269 | 206 |
| | 50-74 ans | 2 744 | 1 599 | 1 145 | 354 | 237 | 1 245 | 908 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 459 | 265 | 194 | 188 | 132 | 77 | 62 |
| | 55-59 ans | 455 | 261 | 194 | 54 | 39 | 207 | 155 |
| | 60-64 ans | 633 | 364 | 269 | 52 | 33 | 312 | 236 |
| | 65-69 ans | 687 | 418 | 269 | 37 | 20 | 381 | 249 |
| | 70-74 ans | 514 | 294 | 220 | 25 | 13 | 269 | 207 |
| | 50-74 ans | 2 748 | 1 602 | 1 146 | 356 | 237 | 1 246 | 909 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 464 | 268 | 196 | 191 | 134 | 77 | 62 |
| | 55-59 ans | 458 | 263 | 195 | 54 | 40 | 209 | 155 |
| | 60-64 ans | 636 | 366 | 270 | 52 | 33 | 314 | 237 |
| | 65-69 ans | 697 | 422 | 275 | 38 | 21 | 384 | 254 |
| | 70-74 ans | 523 | 297 | 226 | 26 | 14 | 271 | 212 |
| | 50-74 ans | 2 778 | 1 616 | 1 162 | 361 | 242 | 1 255 | 920 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 149 | 71 | 78 | 51 | 58 | 20 | 20 |
| | 55-59 ans | 136 | 64 | 72 | 10 | 16 | 54 | 56 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

4/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 153 | 56 | 97 | 8 | 12 | 48 | 85 |
| | 65-69 ans | 171 | 74 | 97 | 9 | 9 | 65 | 88 |
| | 70-74 ans | 117 | 55 | 62 | 6 | 2 | 49 | 60 |
| | 50-74 ans | 726 | 320 | 406 | 84 | 97 | 236 | 309 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 55 | 30 | 25 | 20 | 18 | 10 | 7 |
| | 55-59 ans | 36 | 14 | 22 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| | 60-64 ans | 58 | 31 | 27 | 4 | 3 | 27 | 24 |
| | 65-69 ans | 48 | 28 | 20 | 2 | 4 | 26 | 16 |
| | 70-74 ans | 42 | 24 | 18 | 1 | 3 | 23 | 15 |
| | 50-74 ans | 239 | 127 | 112 | 30 | 32 | 97 | 80 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 83 | 48 | 35 | 34 | 22 | 14 | 13 |
| | 55-59 ans | 98 | 63 | 35 | 15 | 5 | 48 | 30 |
| | 60-64 ans | 164 | 96 | 68 | 10 | 7 | 86 | 61 |
| | 65-69 ans | 180 | 117 | 63 | 8 | 4 | 109 | 59 |
| | 70-74 ans | 136 | 70 | 66 | 6 | 3 | 64 | 63 |
| | 50-74 ans | 661 | 394 | 267 | 73 | 41 | 321 | 226 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 148 | 103 | 45 | 73 | 28 | 30 | 17 |
| | 55-59 ans | 155 | 97 | 58 | 21 | 15 | 76 | 43 |
| | 60-64 ans | 201 | 144 | 57 | 22 | 7 | 122 | 50 |
| | 65-69 ans | 222 | 155 | 67 | 17 | 3 | 138 | 64 |
| | 70-74 ans | 172 | 107 | 65 | 10 | 5 | 97 | 60 |
| | 50-74 ans | 898 | 606 | 292 | 143 | 58 | 463 | 234 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 25 | 13 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 28 | 21 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 |
| | 60-64 ans | 49 | 34 | 15 | 6 | 3 | 28 | 12 |
| | 65-69 ans | 68 | 43 | 25 | 2 | 1 | 41 | 24 |
| | 70-74 ans | 49 | 37 | 12 | 2 | 1 | 35 | 11 |
| | 50-74 ans | 219 | 148 | 71 | 25 | 13 | 123 | 58 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 231 | 151 | 80 | 107 | 50 | 44 | 30 |
| | 55-59 ans | 253 | 160 | 93 | 36 | 20 | 124 | 73 |
| | 60-64 ans | 365 | 240 | 125 | 32 | 14 | 208 | 111 |
| | 65-69 ans | 402 | 272 | 130 | 25 | 7 | 247 | 123 |
| | 70-74 ans | 308 | 177 | 131 | 16 | 8 | 161 | 123 |
| | 50-74 ans | 1 559 | 1 000 | 559 | 216 | 99 | 784 | 460 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 148 | 103 | 45 | 73 | 28 | 30 | 17 |
| | 55-59 ans | 155 | 97 | 58 | 21 | 15 | 76 | 43 |
| | 60-64 ans | 201 | 144 | 57 | 22 | 7 | 122 | 50 |
| | 65-69 ans | 222 | 155 | 67 | 17 | 3 | 138 | 64 |
| | 70-74 ans | 172 | 107 | 65 | 10 | 5 | 97 | 60 |
| | 50-74 ans | 898 | 606 | 292 | 143 | 58 | 463 | 234 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 127 | 90 | 37 | 64 | 22 | 26 | 15 |
| | 55-59 ans | 132 | 86 | 46 | 17 | 13 | 69 | 33 |
| | 60-64 ans | 171 | 122 | 49 | 20 | 6 | 102 | 43 |
| | 65-69 ans | 180 | 129 | 51 | 15 | 3 | 114 | 48 |
| | 70-74 ans | 138 | 87 | 51 | 7 | 4 | 80 | 47 |
| | 50-74 ans | 748 | 514 | 234 | 123 | 48 | 391 | 186 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 150 | 107 | 43 | 76 | 26 | 31 | 17 |
| | 55-59 ans | 157 | 104 | 53 | 24 | 14 | 80 | 39 |
| | 60-64 ans | 220 | 154 | 66 | 23 | 9 | 131 | 57 |
| | 65-69 ans | 251 | 182 | 69 | 20 | 5 | 162 | 64 |
| | 70-74 ans | 189 | 113 | 76 | 10 | 6 | 103 | 70 |
| | 50-74 ans | 967 | 660 | 307 | 153 | 60 | 507 | 247 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 25 | 13 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 28 | 21 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 |
| | 60-64 ans | 49 | 34 | 15 | 6 | 3 | 28 | 12 |
| | 65-69 ans | 68 | 43 | 25 | 2 | 1 | 41 | 24 |
| | 70-74 ans | 50 | 37 | 13 | 2 | 1 | 35 | 12 |
| | 50-74 ans | 220 | 148 | 72 | 25 | 13 | 123 | 59 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 23 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 25 | 18 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| | 60-64 ans | 47 | 33 | 14 | 6 | 3 | 27 | 11 |
| | 65-69 ans | 66 | 41 | 25 | 2 | 1 | 39 | 24 |
| | 70-74 ans | 48 | 36 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 63 - Puy-de-Dôme

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 209 | 139 | 70 | 24 | 13 | 115 | 57 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 23 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 24 | 17 | 7 | 4 | 0 | 13 | 7 |
| | 60-64 ans | 47 | 33 | 14 | 6 | 3 | 27 | 11 |
| | 65-69 ans | 63 | 38 | 25 | 2 | 1 | 36 | 24 |
| | 70-74 ans | 46 | 35 | 11 | 2 | 1 | 33 | 10 |
| | 50-74 ans | 203 | 134 | 69 | 24 | 13 | 110 | 56 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 17 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 24 | 18 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| | 65-69 ans | 43 | 25 | 18 | 1 | 1 | 24 | 17 |
| | 70-74 ans | 29 | 20 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| | 50-74 ans | 130 | 82 | 48 | 15 | 10 | 67 | 38 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| | 60-64 ans | 23 | 15 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| | 65-69 ans | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| | 70-74 ans | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| | 50-74 ans | 74 | 53 | 21 | 9 | 3 | 44 | 18 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| | 65-69 ans | 25 | 15 | 10 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| | 50-74 ans | 62 | 42 | 20 | 7 | 3 | 35 | 17 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 33 | 18 | 15 | 5 | 4 | 13 | 11 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 30 | 21 | 9 | 2 | 1 | 19 | 8 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 23 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 25 | 18 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| | 60-64 ans | 47 | 33 | 14 | 6 | 3 | 27 | 11 |
| | 65-69 ans | 64 | 40 | 24 | 2 | 1 | 38 | 23 |
| | 70-74 ans | 48 | 36 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 |
| | 50-74 ans | 207 | 138 | 69 | 24 | 13 | 114 | 56 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 23 | 11 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| | 65-69 ans | 25 | 16 | 9 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| | 70-74 ans | 31 | 21 | 10 | 3 | 1 | 18 | 9 |
| | 50-74 ans | 121 | 74 | 47 | 20 | 16 | 54 | 31 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 6,1 | 4,9 | 4,6 | 4,0 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 8,8 | 8,3 | 5,2 | 5,6 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 6,6 | 5,5 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 7,2 | 5,8 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 5,6 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,3 | 2,9 | 1,0 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 1,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 68,9 | 67,9 | 70,1 | 64,9 | 65,2 | 77,7 | 83,5 |
| | 55-59 ans | 73,5 | 73,2 | 73,8 | 50,6 | 64,8 | 80,4 | 76,1 |
| | 60-64 ans | 81,5 | 82,2 | 80,9 | 69,4 | 66,0 | 83,7 | 82,9 |
| | 65-69 ans | 80,0 | 80,6 | 79,4 | 70,0 | 54,5 | 81,5 | 82,3 |
| | 70-74 ans | 77,2 | 79,8 | 75,0 | 66,7 | 68,2 | 81,0 | 75,5 |
| | 50-74 ans | 76,2 | 76,4 | 76,0 | 63,1 | 64,3 | 81,4 | 79,6 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 4,1 | 2,8 | 4,0 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 3,7 | 4,6 | 2,9 | 6,0 | 4,2 | 4,3 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 6,2 | 3,7 | 8,6 | 4,9 | 5,9 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 6,8 | 3,7 | 7,2 | 4,0 | 6,7 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 7,1 | 4,5 | 9,0 | 5,6 | 6,9 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 5,6 | 3,5 | 5,2 | 3,4 | 5,8 | 3,5 |
| 50-74 ans ** | 4,4 | 5,5 | 3,4 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 100,0 | 97,8 | 99,6 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 99,7 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 100,0 |
| | 65-69 ans | 98,7 | 99,1 | 98,0 | 100,0 | 95,8 | 99,0 | 98,2 |
| | 70-74 ans | 97,7 | 97,6 | 98,0 | 96,6 | 94,1 | 97,7 | 98,2 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 99,1 | 99,0 | 99,5 | 98,9 | 99,0 | 99,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 93,9 | 95,0 | 92,5 | 94,6 | 90,5 | 96,3 | 96,9 |
| | 55-59 ans | 93,5 | 93,9 | 92,9 | 94,7 | 90,9 | 93,7 | 93,4 |
| | 60-64 ans | 95,5 | 95,6 | 95,4 | 89,7 | 97,1 | 96,6 | 95,2 |
| | 65-69 ans | 94,3 | 94,6 | 93,8 | 90,5 | 87,0 | 95,0 | 94,4 |
| | 70-74 ans | 92,0 | 91,9 | 92,1 | 89,3 | 81,3 | 92,1 | 92,9 |
| | 50-74 ans | 93,9 | 94,3 | 93,4 | 93,0 | 90,6 | 94,6 | 94,2 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 98,3 | 98,1 | 98,5 | 97,4 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 99,3 | 99,2 | 99,5 | 100,0 | 97,5 | 99,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 99,1 | 98,9 | 99,3 | 98,1 | 100,0 | 99,0 | 99,2 |
| | 65-69 ans | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 97,4 | 100,0 | 98,4 | 98,8 |
| | 70-74 ans | 99,4 | 99,7 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,0 |
| | 50-74 ans | 98,9 | 98,8 | 99,0 | 98,1 | 98,3 | 99,0 | 99,2 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 130 | 137 | 119 | 138 | 128 | 137 | 102 |
| | 55-59 ans | 132 | 123 | 143 | 143 | 129 | 118 | 147 |
| | 60-64 ans | 125 | 135 | 113 | 157 | 111 | 131 | 113 |
| | 65-69 ans | 123 | 126 | 118 | 122 | 112 | 126 | 119 |
| | 70-74 ans | 128 | 125 | 131 | 151 | 118 | 122 | 132 |
| | 50-74 ans | 127 | 129 | 124 | 140 | 124 | 126 | 124 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 102,5 (71,5-147) | 103 (74-149,5) | 99,5 (66,5-146) | 103 (74-150) | 105,5 (69-156) | 103 (73-147) | 97,5 (57-131) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 97 (74-146) | 96,5 (74-146) | 98 (74-150) | 102 (83-154) | 105,5 (65-152,5) | 95,5 (69-145,5) | 98 (74-145) |
| | 60-64 ans | 93 (69-130) | 95 (69-140) | 90,5 (71-123) | 102 (69-152,5) | 83 (64-132) | 94,5 (68-137) | 91 (72-123) |
| | 65-69 ans | 97 (68-138) | 99 (69-142) | 92 (67-137) | 106 (69-132) | 98,5 (60-141,5) | 98 (68-145) | 92 (67-136) |
| | 70-74 ans | 97 (67-139) | 91 (66-136) | 103 (70-146) | 82 (56-139) | 103 (81-137) | 92 (67-133) | 102,5 (69-149,5) |
| | 50-74 ans | 97 (69-139) | 97 (69-142) | 96 (69-138) | 103 (74-145,5) | 100 (68-147,5) | 96 (68-140) | 96 (69-136) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 4,6 | 3,9 | 5,7 | 3,9 | 7,4 | 3,8 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 2,2 | 4,0 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 6,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 4,8 | 8,3 | 3,4 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 6,4 | 4,1 | 10,3 | 5,9 | 6,0 | 3,9 |
| | 50-74 ans | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 5,1 | 6,0 | 4,0 | 3,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 98,4 | 98,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 100,0 | 97,5 | 99,5 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,6 |
| | 65-69 ans | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 97,4 | 100,0 | 99,5 | 99,2 |
| | 70-74 ans | 99,8 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 98,9 | 98,8 | 99,6 | 99,6 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 32,1 | 26,5 | 39,8 | 26,7 | 43,3 | 26,0 | 32,3 |
| | 55-59 ans | 29,7 | 24,3 | 36,9 | 18,5 | 40,0 | 25,8 | 36,1 |
| | 60-64 ans | 24,1 | 15,3 | 35,9 | 15,4 | 36,4 | 15,3 | 35,9 |
| | 65-69 ans | 24,5 | 17,5 | 35,3 | 23,7 | 42,9 | 16,9 | 34,6 |
| | 70-74 ans | 22,4 | 18,5 | 27,4 | 23,1 | 14,3 | 18,1 | 28,3 |
| | 50-74 ans | 26,1 | 19,8 | 34,9 | 23,3 | 40,1 | 18,8 | 33,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 11,9 | 11,2 | 12,8 | 10,5 | 13,4 | 13,0 | 11,3 |
| | 55-59 ans | 7,9 | 5,3 | 11,3 | 5,6 | 10,0 | 5,3 | 11,6 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 8,5 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 8,6 | 10,1 |
| | 65-69 ans | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 5,3 | 19,0 | 6,8 | 6,3 |
| | 70-74 ans | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 3,8 | 21,4 | 8,5 | 7,1 |
| | 50-74 ans | 8,6 | 7,9 | 9,6 | 8,3 | 13,2 | 7,7 | 8,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 16,4 | 18,2 | 21,0 |
| | 55-59 ans | 21,4 | 24,0 | 17,9 | 27,8 | 12,5 | 23,0 | 19,4 |
| | 60-64 ans | 25,8 | 26,2 | 25,2 | 19,2 | 21,2 | 27,4 | 25,7 |
| | 65-69 ans | 25,8 | 27,7 | 22,9 | 21,1 | 19,0 | 28,4 | 23,2 |
| | 70-74 ans | 26,0 | 23,6 | 29,2 | 23,1 | 21,4 | 23,6 | 29,7 |
| | 50-74 ans | 23,8 | 24,4 | 23,0 | 20,2 | 16,9 | 25,6 | 24,6 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 31,9 | 38,4 | 23,0 | 38,2 | 20,9 | 39,0 | 27,4 |
| | 55-59 ans | 33,8 | 36,9 | 29,7 | 38,9 | 37,5 | 36,4 | 27,7 |
| | 60-64 ans | 31,6 | 39,3 | 21,1 | 42,3 | 21,2 | 38,9 | 21,1 |
| | 65-69 ans | 31,9 | 36,7 | 24,4 | 44,7 | 14,3 | 35,9 | 25,2 |
| | 70-74 ans | 32,9 | 36,0 | 28,8 | 38,5 | 35,7 | 35,8 | 28,3 |
| | 50-74 ans | 32,3 | 37,5 | 25,1 | 39,6 | 24,0 | 36,9 | 25,4 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,4 | 4,9 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 2,6 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 8,0 | 3,6 | 7,4 | 0,0 | 8,1 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 9,3 | 5,6 | 11,5 | 9,1 | 8,9 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 5,3 | 4,8 | 10,7 | 9,4 |
| | 70-74 ans | 9,4 | 12,5 | 5,3 | 7,7 | 7,1 | 12,9 | 5,2 |
| | 50-74 ans | 7,9 | 9,2 | 6,1 | 6,9 | 5,4 | 9,8 | 6,3 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | 0,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 15,8 | 21,8 | 10,4 | 21,8 | 9,5 | 21,8 | 12,4 |
| | 55-59 ans | 18,8 | 26,0 | 12,8 | 37,9 | 18,7 | 23,9 | 11,7 |
| | 60-64 ans | 26,4 | 38,6 | 16,4 | 47,6 | 20,0 | 37,5 | 16,0 |
| | 65-69 ans | 27,5 | 41,1 | 16,3 | 43,1 | 11,8 | 40,9 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 30,5 | 38,1 | 24,1 | 49,4 | 26,3 | 37,2 | 24,0 |
| | 50-74 ans | 23,4 | 32,7 | 15,5 | 29,1 | 12,5 | 33,9 | 16,4 |
| | 50-74 ans ** | 23,0 | 31,5 | 15,2 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,1 | 14,9 | 5,9 | 14,9 | 5,3 | 14,9 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 11,5 | 15,8 | 8,0 | 22,1 | 14,1 | 14,6 | 6,9 |
| | 60-64 ans | 14,5 | 23,2 | 7,5 | 32,7 | 10,0 | 22,0 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 15,2 | 23,4 | 8,4 | 29,3 | 5,0 | 22,8 | 8,7 |
| | 70-74 ans | 17,1 | 23,0 | 12,0 | 30,9 | 16,4 | 22,4 | 11,7 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 19,8 | 8,1 | 19,2 | 7,3 | 20,0 | 8,3 |
| | 50-74 ans ** | 13,4 | 19,2 | 8,0 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,7 | 13,0 | 4,8 | 13,1 | 4,2 | 12,9 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 9,8 | 14,0 | 6,3 | 17,9 | 12,2 | 13,3 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 12,3 | 19,6 | 6,4 | 29,8 | 8,6 | 18,4 | 6,2 |
| | 65-69 ans | 12,3 | 19,5 | 6,4 | 25,9 | 5,0 | 18,9 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 13,7 | 18,7 | 9,4 | 21,6 | 13,2 | 18,5 | 9,2 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 16,8 | 6,5 | 16,6 | 6,1 | 16,9 | 6,6 |
| | 50-74 ans ** | 11,2 | 16,4 | 6,5 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 10,3 | 15,5 | 5,6 | 15,5 | 5,0 | 15,3 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 11,7 | 16,9 | 7,3 | 25,3 | 13,1 | 15,4 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 15,9 | 24,8 | 8,6 | 34,2 | 12,9 | 23,6 | 8,2 |
| | 65-69 ans | 17,2 | 27,5 | 8,6 | 34,5 | 8,4 | 26,8 | 8,7 |
| | 70-74 ans | 18,7 | 24,3 | 14,0 | 30,9 | 19,7 | 23,8 | 13,7 |
| | 50-74 ans | 14,5 | 21,6 | 8,5 | 20,6 | 7,6 | 21,9 | 8,8 |
| | 50-74 ans ** | 14,3 | 20,8 | 8,4 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 3,4 | 1,0 | 4,2 | 0,0 | 3,3 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 5,5 | 2,0 | 8,9 | 4,3 | 5,1 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 6,5 | 3,1 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 5,0 | 8,0 | 2,4 | 6,2 | 3,3 | 8,1 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 4,8 | 2,0 | 3,4 | 1,6 | 5,3 | 2,1 |
| | 50-74 ans ** | 3,1 | 4,5 | 1,9 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 4,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 4,2 | 2,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1,8 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)