

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28 017	13 835	14 182	9 616	9 685	4 219	4 497
	55-59 ans	22 811	10 895	11 916	1 985	2 118	8 910	9 798
	60-64 ans	22 477	10 508	11 969	1 453	1 458	9 055	10 511
	65-69 ans	20 299	9 462	10 837	1 112	1 082	8 350	9 755
	70-74 ans	13 256	6 159	7 097	613	628	5 546	6 469
	50-74 ans	106 860	50 859	56 001	14 779	14 971	36 080	41 030
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 383	1 218	1 165	930	871	288	294
	55-59 ans	1 928	953	975	232	206	721	769
	60-64 ans	1 746	818	928	132	136	686	792
	65-69 ans	1 518	689	829	95	103	594	726
	70-74 ans	1 145	527	618	53	65	474	553
	50-74 ans	8 720	4 205	4 515	1 442	1 381	2 763	3 134
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 584	825	759	630	555	195	204
	55-59 ans	1 323	650	673	144	124	506	549
	60-64 ans	1 229	597	632	82	79	515	553
	65-69 ans	1 043	472	571	50	65	422	506
	70-74 ans	739	358	381	38	34	320	347
	50-74 ans	5 918	2 902	3 016	944	857	1 958	2 159
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	799	393	406	300	316	93	90
	55-59 ans	605	303	302	88	82	215	220
	60-64 ans	517	221	296	50	57	171	239
	65-69 ans	475	217	258	45	38	172	220
	70-74 ans	406	169	237	15	31	154	206
	50-74 ans	2 802	1 303	1 499	498	524	805	975
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 218	13 442	13 776	9 316	9 369	4 126	4 407
	55-59 ans	22 206	10 592	11 614	1 897	2 036	8 695	9 578
	60-64 ans	21 960	10 287	11 673	1 403	1 401	8 884	10 272
	65-69 ans	19 824	9 245	10 579	1 067	1 044	8 178	9 535
	70-74 ans	12 850	5 990	6 860	598	597	5 392	6 263
	50-74 ans	104 058	49 556	54 502	14 281	14 447	35 275	40 055
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	978	582	396	399	289	183	107
	55-59 ans	919	566	353	122	72	444	281
	60-64 ans	1 043	640	403	118	65	522	338
	65-69 ans	1 110	692	418	104	67	588	351

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	872	510	362	63	40	447	322
	50-74 ans	4 922	2 990	1 932	806	533	2 184	1 399
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	972	577	395	395	288	182	107
	55-59 ans	914	562	352	121	72	441	280
	60-64 ans	1 033	633	400	118	65	515	335
	65-69 ans	1 098	685	413	104	67	581	346
	70-74 ans	854	498	356	60	40	438	316
	50-74 ans	4 871	2 955	1 916	798	532	2 157	1 384
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	892	527	365	360	266	167	99
	55-59 ans	853	528	325	111	64	417	261
	60-64 ans	951	583	368	105	51	478	317
	65-69 ans	1 010	629	381	89	63	540	318
	70-74 ans	796	465	331	55	38	410	293
	50-74 ans	4 502	2 732	1 770	720	482	2 012	1 288
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	878	522	356	357	261	165	95
	55-59 ans	835	517	318	105	62	412	256
	60-64 ans	923	564	359	101	50	463	309
	65-69 ans	967	605	362	84	59	521	303
	70-74 ans	763	447	316	52	36	395	280
	50-74 ans	4 366	2 655	1 711	699	468	1 956	1 243
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	9	8	1	8	0	0	1
	55-59 ans	21	14	7	1	1	13	6
	60-64 ans	25	16	9	5	2	11	7
	65-69 ans	29	17	12	1	2	16	10
	70-74 ans	21	15	6	1	0	14	6
	50-74 ans	105	70	35	16	5	54	30
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	11	6	5	2	1	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	886	525	361	359	264	166	97
	55-59 ans	850	525	325	111	64	414	261
	60-64 ans	934	573	361	103	50	470	311
	65-69 ans	996	620	376	87	63	533	313
	70-74 ans	779	458	321	53	37	405	284
	50-74 ans	4 445	2 701	1 744	713	478	1 988	1 266
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	17	10	7	2	1	8	6
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	17	7	10	2	1	5	9
	50-74 ans	57	31	26	7	4	24	22
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	892	527	365	360	266	167	99
	55-59 ans	853	528	325	111	64	417	261
	60-64 ans	951	583	368	105	51	478	317
	65-69 ans	1 010	629	381	89	63	540	318
	70-74 ans	796	465	331	55	38	410	293
	50-74 ans	4 502	2 732	1 770	720	482	2 012	1 288
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	893	528	365	360	266	168	99
	55-59 ans	853	528	325	111	64	417	261
	60-64 ans	954	584	370	105	51	479	319
	65-69 ans	1 014	632	382	89	63	543	319
	70-74 ans	802	467	335	55	38	412	297
	50-74 ans	4 516	2 739	1 777	720	482	2 019	1 295
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	368	181	187	128	139	53	48
	55-59 ans	281	143	138	30	21	113	117

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	278	136	142	24	15	112	127
	65-69 ans	259	120	139	17	24	103	115
	70-74 ans	228	115	113	10	12	105	101
	50-74 ans	1 414	695	719	209	211	486	508
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	76	50	26	29	17	21	9
	55-59 ans	69	35	34	7	6	28	28
	60-64 ans	49	28	21	2	5	26	16
	65-69 ans	63	44	19	6	3	38	16
	70-74 ans	45	26	19	0	4	26	15
	50-74 ans	302	183	119	44	35	139	84
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	149	97	52	67	31	30	21
	55-59 ans	166	103	63	24	15	79	48
	60-64 ans	234	157	77	13	9	144	68
	65-69 ans	234	142	92	21	12	121	80
	70-74 ans	179	103	76	15	10	88	66
	50-74 ans	962	602	360	140	77	462	283
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	230	158	72	111	56	47	16
	55-59 ans	261	192	69	36	19	156	50
	60-64 ans	298	207	91	53	13	154	78
	65-69 ans	348	249	99	32	13	217	86
	70-74 ans	265	170	95	21	10	149	85
	50-74 ans	1 402	976	426	253	111	723	315
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	40	26	14	16	11	10	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	50	38	12	10	2	28	10
	60-64 ans	73	48	25	11	7	37	18
	65-69 ans	86	62	24	12	7	50	17
	70-74 ans	64	42	22	8	2	34	20
	50-74 ans	313	216	97	57	29	159	68
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	23	13	10	6	10	7	0
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
	60-64 ans	15	5	10	0	2	5	8
	65-69 ans	12	5	7	0	2	5	5
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	84	45	39	10	15	35	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	9	7	2	1	2	6	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	29	18	11	6	4	12	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	379	255	124	178	87	77	37
	55-59 ans	427	295	132	60	34	235	98
	60-64 ans	532	364	168	66	22	298	146
	65-69 ans	582	391	191	53	25	338	166
	70-74 ans	444	273	171	36	20	237	151
	50-74 ans	2 364	1 578	786	393	188	1 185	598

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	230	158	72	111	56	47	16
	55-59 ans	261	192	69	36	19	156	50
	60-64 ans	298	207	91	53	13	154	78
	65-69 ans	348	249	99	32	13	217	86
	70-74 ans	265	170	95	21	10	149	85
	50-74 ans	1 402	976	426	253	111	723	315
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	206	144	62	101	48	43	14
	55-59 ans	237	172	65	34	17	138	48
	60-64 ans	270	191	79	47	13	144	66
	65-69 ans	321	232	89	31	12	201	77
	70-74 ans	234	149	85	20	8	129	77
	50-74 ans	1 268	888	380	233	98	655	282
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	227	159	68	110	53	49	15
	55-59 ans	270	199	71	39	19	160	52
	60-64 ans	324	231	93	53	13	178	80
	65-69 ans	377	268	109	39	13	229	96
	70-74 ans	282	179	103	22	11	157	92
	50-74 ans	1 480	1 036	444	263	109	773	335
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	40	26	14	16	11	10	3
	55-59 ans	50	38	12	10	2	28	10
	60-64 ans	73	48	25	11	7	37	18
	65-69 ans	86	62	24	12	7	50	17
	70-74 ans	64	42	22	8	2	34	20
	50-74 ans	313	216	97	57	29	159	68
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	35	24	11	15	9	9	2
	55-59 ans	41	31	10	8	1	23	9
	60-64 ans	68	46	22	10	6	36	16
	65-69 ans	74	55	19	10	4	45	15
	70-74 ans	62	40	22	8	2	32	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	280	196	84	51	22	145	62
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	35	24	11	15	9	9	2
	55-59 ans	41	31	10	8	1	23	9
	60-64 ans	67	45	22	10	6	35	16
	65-69 ans	74	55	19	10	4	45	15
	70-74 ans	62	40	22	8	2	32	20
	50-74 ans	279	195	84	51	22	144	62
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	27	16	11	10	9	6	2
	55-59 ans	29	21	8	7	1	14	7
	60-64 ans	53	32	21	9	6	23	15
	65-69 ans	55	40	15	7	3	33	12
	70-74 ans	50	32	18	7	2	25	16
	50-74 ans	214	141	73	40	21	101	52
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	8	0	5	0	3	0
	55-59 ans	12	10	2	1	0	9	2
	60-64 ans	14	13	1	1	0	12	1
	65-69 ans	19	15	4	3	1	12	3
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	50-74 ans	65	54	11	11	1	43	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	8	0	4	0	4	0
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	26	14	12	4	3	10	9
	65-69 ans	24	17	7	2	1	15	6
	70-74 ans	27	19	8	3	0	16	8
	50-74 ans	96	64	32	16	5	48	27
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 67 - Bas-Rhin

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	8	5	1	2	7	3
	65-69 ans	13	10	3	2	1	8	2
	70-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
	50-74 ans	51	35	16	8	6	27	10
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	12	3	9	3	8	0	1
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	13	10	3	2	0	8	3
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	54	32	22	10	9	22	13
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	10	3	6	1	4	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	34	23	11	14	9	9	2
	55-59 ans	41	31	10	8	1	23	9
	60-64 ans	66	44	22	10	6	34	16
	65-69 ans	72	54	18	10	4	44	14
	70-74 ans	62	40	22	8	2	32	20
	50-74 ans	275	192	83	50	22	142	61
A40- Perdus de vue	50-54 ans	49	31	18	21	13	10	5
	55-59 ans	35	20	15	5	4	15	11
	60-64 ans	48	33	15	9	5	24	10
	65-69 ans	46	31	15	11	1	20	14
	70-74 ans	28	17	11	4	0	13	11
	50-74 ans	206	132	74	50	23	82	51

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,5	8,8	8,2	9,7	9,0	6,8	6,5
	55-59 ans	8,5	8,7	8,2	11,7	9,7	8,1	7,8
	60-64 ans	7,8	7,8	7,8	9,1	9,3	7,6	7,5
	65-69 ans	7,5	7,3	7,6	8,5	9,5	7,1	7,4
	70-74 ans	8,6	8,6	8,7	8,6	10,4	8,5	8,5
	50-74 ans	8,2	8,3	8,1	9,8	9,2	7,7	7,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,8	2,9	3,1	3,3	2,2	2,0
	55-59 ans	2,7	2,8	2,5	4,4	3,9	2,4	2,2
	60-64 ans	2,3	2,1	2,5	3,4	3,9	1,9	2,3
	65-69 ans	2,3	2,3	2,4	4,0	3,5	2,1	2,3
	70-74 ans	3,1	2,7	3,3	2,4	4,9	2,8	3,2
	50-74 ans	2,6	2,6	2,7	3,4	3,5	2,2	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,5	67,7	65,2	67,7	63,7	67,7	69,4
	55-59 ans	68,6	68,2	69,0	62,1	60,2	70,2	71,4
	60-64 ans	70,4	73,0	68,1	62,1	58,1	75,1	69,8
	65-69 ans	68,7	68,5	68,9	52,6	63,1	71,0	69,7
	70-74 ans	64,5	67,9	61,7	71,7	52,3	67,5	62,7
	50-74 ans	67,9	69,0	66,8	65,5	62,1	70,9	68,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	2,9	4,3	3,1	4,4	2,4
	55-59 ans	4,1	5,3	3,0	6,4	3,5	5,1	2,9
	60-64 ans	4,7	6,2	3,5	8,4	4,6	5,9	3,3
	65-69 ans	5,6	7,5	4,0	9,7	6,4	7,2	3,7
	70-74 ans	6,8	8,5	5,3	10,5	6,7	8,3	5,1
	50-74 ans	4,7	6,0	3,5	5,6	3,7	6,2	3,5
50-74 ans **	4,7	6,0	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,1	99,7	99,0	99,7	99,5	100,0
	55-59 ans	99,5	99,3	99,7	99,2	100,0	99,3	99,6
	60-64 ans	99,0	98,9	99,3	100,0	100,0	98,7	99,1
	65-69 ans	98,9	99,0	98,8	100,0	100,0	98,8	98,6
	70-74 ans	97,9	97,6	98,3	95,2	100,0	98,0	98,1
	50-74 ans	99,0	98,8	99,2	99,0	99,8	98,8	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,8	91,3	92,4	91,1	92,4	91,8	92,5
	55-59 ans	93,3	94,0	92,3	91,7	88,9	94,6	93,2
	60-64 ans	92,1	92,1	92,0	89,0	78,5	92,8	94,6
	65-69 ans	92,0	91,8	92,3	85,6	94,0	92,9	91,9
	70-74 ans	93,2	93,4	93,0	91,7	95,0	93,6	92,7
	50-74 ans	92,4	92,5	92,4	90,2	90,6	93,3	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	99,1	97,5	99,2	98,1	98,8	96,0
	55-59 ans	97,9	97,9	97,8	94,6	96,9	98,8	98,1
	60-64 ans	97,1	96,7	97,6	96,2	98,0	96,9	97,5
	65-69 ans	95,7	96,2	95,0	94,4	93,7	96,5	95,3
	70-74 ans	95,9	96,1	95,5	94,5	94,7	96,3	95,6
	50-74 ans	97,0	97,2	96,7	97,1	97,1	97,2	96,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	101	98	104	99	95	96
	55-59 ans	89	88	92	76	102	91	90
	60-64 ans	87	89	83	84	79	90	84
	65-69 ans	87	87	87	99	86	85	87
	70-74 ans	85	86	83	100	103	85	81
	50-74 ans	90	90	89	96	96	88	86
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (47-106)	75 (47-107)	74 (49-105)	77 (47-107,5)	75 (49-109)	71 (45-107)	69 (47-100)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (45-101)	69 (43,5-103)	73 (46-99)	62 (38-103)	76 (49-116,5)	70 (47-103)	72 (45-97)
	60-64 ans	68 (43-94)	68 (42-95)	68 (45-92,5)	71 (46-97)	68 (41-84)	67 (42-93)	68 (45-93)
	65-69 ans	67 (42-98)	66 (42-98)	67 (42-97)	67 (44-106)	60 (31-92)	66 (42-97)	68 (46-98)
	70-74 ans	68 (41-97)	68 (40-101)	68 (41-94)	70 (38-116)	72 (53-122)	68 (40-98)	67 (41-93)
	50-74 ans	69 (44-99)	69 (43-101)	69 (45-98)	73 (43,5-105)	73 (46-104)	68 (42-98)	68 (44-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,0	5,3	4,5	5,3	4,5	5,5	4,7
	55-59 ans	3,8	3,5	4,2	4,1	5,6	3,4	3,9
	60-64 ans	4,6	5,2	3,7	7,6	7,7	4,6	3,0
	65-69 ans	4,1	4,5	3,6	10,6	1,5	3,4	4,0
	70-74 ans	3,2	3,3	3,0	6,3	0,0	2,9	3,4
	50-74 ans	4,2	4,4	3,8	6,2	4,3	3,8	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,2	34,3	51,2	35,6	52,3	31,5	48,5
	55-59 ans	32,9	27,1	42,5	27,0	32,8	27,1	44,8
	60-64 ans	29,1	23,3	38,4	22,9	29,4	23,4	39,8
	65-69 ans	25,5	19,0	36,4	19,1	38,1	19,0	36,1
	70-74 ans	28,4	24,6	33,7	18,2	31,6	25,5	34,0
	50-74 ans	31,3	25,4	40,5	29,0	43,8	24,1	39,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	9,5	7,1	8,1	6,4	12,5	9,1
	55-59 ans	8,1	6,6	10,5	6,3	9,4	6,7	10,7
	60-64 ans	5,1	4,8	5,7	1,9	9,8	5,4	5,0
	65-69 ans	6,2	7,0	5,0	6,7	4,8	7,0	5,0
	70-74 ans	5,6	5,6	5,7	0,0	10,5	6,3	5,1
	50-74 ans	6,7	6,7	6,7	6,1	7,3	6,9	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,7	18,4	14,2	18,6	11,7	17,9	21,2
	55-59 ans	19,5	19,5	19,4	21,6	23,4	18,9	18,4
	60-64 ans	24,5	26,9	20,8	12,4	17,6	30,1	21,3
	65-69 ans	23,1	22,5	24,1	23,6	19,0	22,3	25,1
	70-74 ans	22,3	22,1	22,7	27,3	26,3	21,4	22,2
	50-74 ans	21,3	22,0	20,3	19,4	16,0	22,9	21,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,8	29,9	19,7	30,8	21,1	28,0	16,2
	55-59 ans	30,6	36,4	21,2	32,4	29,7	37,4	19,2
	60-64 ans	31,2	35,4	24,6	50,5	25,5	32,2	24,5
	65-69 ans	34,3	39,4	25,9	36,0	20,6	40,0	27,0
	70-74 ans	33,0	36,4	28,4	38,2	26,3	36,2	28,6
	50-74 ans	31,0	35,6	24,0	35,1	23,0	35,8	24,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,9	3,8	4,4	4,1	6,0	3,0
	55-59 ans	5,9	7,2	3,7	9,0	3,1	6,7	3,8
	60-64 ans	7,7	8,2	6,8	10,5	13,7	7,7	5,6
	65-69 ans	8,5	9,8	6,3	13,5	11,1	9,2	5,3
	70-74 ans	8,0	9,0	6,6	14,5	5,3	8,3	6,7
	50-74 ans	6,9	7,9	5,5	7,9	6,0	7,9	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	2,5	2,7	1,7	3,8	4,2	0,0
	55-59 ans	2,6	2,8	2,2	2,7	1,6	2,9	2,3
	60-64 ans	1,6	0,9	2,7	0,0	3,9	1,0	2,5
	65-69 ans	1,2	0,8	1,8	0,0	3,2	0,9	1,6
	70-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,8	0,0	1,5	1,7
	50-74 ans	1,9	1,6	2,2	1,4	3,1	1,7	1,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,4	1,1	0,6	0,8	0,0	2,0
	55-59 ans	0,2	0,4	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	1,9	0,0	0,2	0,6
	65-69 ans	0,9	1,1	0,5	1,1	3,2	1,1	0,0
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	1,0	1,0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	19,0	9,0	19,1	9,3	18,7	8,4
	55-59 ans	19,2	27,9	11,4	31,6	16,7	27,0	10,2
	60-64 ans	24,2	35,4	14,4	47,0	15,7	33,5	14,2
	65-69 ans	29,4	42,3	18,1	49,7	23,9	41,3	17,4
	70-74 ans	34,6	45,6	24,9	60,2	33,5	44,0	24,1
	50-74 ans	22,7	31,8	14,4	27,5	13,0	33,6	14,9
	50-74 ans **	22,8	31,8	14,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	11,8	5,2	11,9	6,0	11,4	3,6
	55-59 ans	11,8	18,1	5,9	19,0	9,3	17,9	5,2
	60-64 ans	13,6	20,1	7,8	37,8	9,3	17,3	7,6
	65-69 ans	17,6	26,9	9,4	30,0	12,5	26,5	9,0
	70-74 ans	20,6	28,4	13,8	35,1	16,8	27,6	13,6
	50-74 ans	13,5	19,7	7,8	17,7	7,7	20,5	7,9
	50-74 ans **	13,5	19,6	7,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,7	4,5	10,8	5,1	10,4	3,2
	55-59 ans	10,7	16,2	5,6	17,9	8,3	15,9	5,0
	60-64 ans	12,3	18,6	6,8	33,5	9,3	16,2	6,4
	65-69 ans	16,2	25,1	8,4	29,1	11,5	24,6	8,1
	70-74 ans	18,2	24,9	12,4	33,4	13,4	23,9	12,3
	50-74 ans	12,2	17,9	7,0	16,3	6,8	18,6	7,0
	50-74 ans **	12,2	17,8	7,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,8	4,9	11,8	5,7	11,9	3,4
	55-59 ans	12,2	18,8	6,1	20,6	9,3	18,4	5,4
	60-64 ans	14,8	22,5	8,0	37,8	9,3	20,0	7,8
	65-69 ans	19,0	29,0	10,3	36,6	12,5	28,0	10,1
	70-74 ans	21,9	29,9	15,0	36,8	18,4	29,1	14,7
	50-74 ans	14,2	20,9	8,1	18,4	7,5	21,9	8,4
	50-74 ans **	14,3	20,8	8,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,9	1,0	1,7	1,2	2,4	0,7
	55-59 ans	2,3	3,6	1,0	5,3	1,0	3,2	1,0
	60-64 ans	3,3	4,7	2,1	7,8	5,0	4,2	1,8
	65-69 ans	4,3	6,7	2,3	11,2	6,7	6,1	1,8
	70-74 ans	5,0	7,0	3,2	13,4	3,4	6,3	3,2
	50-74 ans	3,0	4,4	1,8	4,0	2,0	4,5	1,7
	50-74 ans **	3,0	4,3	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,5	2,2	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)