

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 69 - Rhône

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	31 514	16 632	14 882	12 439	11 821	4 193	3 061
	55-59 ans	25 264	11 433	13 831	3 364	4 000	8 069	9 831
	60-64 ans	24 112	10 400	13 712	2 641	3 051	7 759	10 661
	65-69 ans	23 730	10 245	13 485	2 141	2 552	8 104	10 933
	70-74 ans	17 572	7 803	9 769	1 248	1 512	6 555	8 257
	<b>50-74 ans</b>	<b>122 192</b>	<b>56 513</b>	<b>65 679</b>	<b>21 833</b>	<b>22 936</b>	<b>34 680</b>	<b>42 743</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 443	1 358	1 085	1 116	902	242	183
	55-59 ans	2 048	936	1 112	333	386	603	726
	60-64 ans	1 751	728	1 023	235	292	493	731
	65-69 ans	1 731	753	978	191	213	562	765
	70-74 ans	1 534	659	875	134	158	525	717
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 507</b>	<b>4 434</b>	<b>5 073</b>	<b>2 009</b>	<b>1 951</b>	<b>2 425</b>	<b>3 122</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 687	942	745	738	600	204	145
	55-59 ans	1 469	685	784	207	249	478	535
	60-64 ans	1 257	535	722	151	179	384	543
	65-69 ans	1 300	573	727	135	129	438	598
	70-74 ans	1 047	439	608	74	83	365	525
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 760</b>	<b>3 174</b>	<b>3 586</b>	<b>1 305</b>	<b>1 240</b>	<b>1 869</b>	<b>2 346</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	756	416	340	378	302	38	38
	55-59 ans	579	251	328	126	137	125	191
	60-64 ans	494	193	301	84	113	109	188
	65-69 ans	431	180	251	56	84	124	167
	70-74 ans	487	220	267	60	75	160	192
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 747</b>	<b>1 260</b>	<b>1 487</b>	<b>704</b>	<b>711</b>	<b>556</b>	<b>776</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	30 758	16 216	14 542	12 061	11 519	4 155	3 023
	55-59 ans	24 685	11 182	13 503	3 238	3 863	7 944	9 640
	60-64 ans	23 618	10 207	13 411	2 557	2 938	7 650	10 473
	65-69 ans	23 299	10 065	13 234	2 085	2 468	7 980	10 766
	70-74 ans	17 085	7 583	9 502	1 188	1 437	6 395	8 065
	<b>50-74 ans</b>	<b>119 445</b>	<b>55 253</b>	<b>64 192</b>	<b>21 129</b>	<b>22 225</b>	<b>34 124</b>	<b>41 967</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	990	617	373	471	304	146	69
	55-59 ans	909	509	400	179	137	330	263
	60-64 ans	955	521	434	168	102	353	332
	65-69 ans	1 108	617	491	151	115	466	376

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 69 - Rhône

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	911	464	447	86	80	378	367
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 873</b>	<b>2 728</b>	<b>2 145</b>	<b>1 055</b>	<b>738</b>	<b>1 673</b>	<b>1 407</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	986	615	371	469	302	146	69
	55-59 ans	906	508	398	179	136	329	262
	60-64 ans	951	518	433	166	102	352	331
	65-69 ans	1 099	613	486	151	113	462	373
	70-74 ans	898	455	443	83	78	372	365
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 840</b>	<b>2 709</b>	<b>2 131</b>	<b>1 048</b>	<b>731</b>	<b>1 661</b>	<b>1 400</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	877	544	333	407	270	137	63
	55-59 ans	833	466	367	154	125	312	242
	60-64 ans	857	472	385	139	91	333	294
	65-69 ans	1 008	564	444	134	98	430	346
	70-74 ans	810	408	402	68	64	340	338
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 385</b>	<b>2 454</b>	<b>1 931</b>	<b>902</b>	<b>648</b>	<b>1 552</b>	<b>1 283</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	862	533	329	397	266	136	63
	55-59 ans	818	456	362	150	124	306	238
	60-64 ans	835	461	374	135	88	326	286
	65-69 ans	983	553	430	130	94	423	336
	70-74 ans	786	399	387	65	59	334	328
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 284</b>	<b>2 402</b>	<b>1 882</b>	<b>877</b>	<b>631</b>	<b>1 525</b>	<b>1 251</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	1	4	1	1	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	842	518	324	388	262	130	62
	55-59 ans	785	429	356	140	122	289	234
	60-64 ans	813	447	366	131	86	316	280
	65-69 ans	932	514	418	118	92	396	326
	70-74 ans	746	370	376	58	57	312	319
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 118</b>	<b>2 278</b>	<b>1 840</b>	<b>835</b>	<b>619</b>	<b>1 443</b>	<b>1 221</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	35	26	9	19	8	7	1
	55-59 ans	48	37	11	14	3	23	8
	60-64 ans	44	25	19	8	5	17	14
	65-69 ans	76	50	26	16	6	34	20
	70-74 ans	64	38	26	10	7	28	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>267</b>	<b>176</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>109</b>	<b>62</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	7	4	3	3	1	1	2
	70-74 ans	9	4	5	0	3	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	866	538	328	401	265	137	63
	55-59 ans	827	463	364	152	124	311	240
	60-64 ans	850	468	382	138	90	330	292
	65-69 ans	1 001	561	440	133	97	428	343
	70-74 ans	803	406	397	67	63	339	334
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 347</b>	<b>2 436</b>	<b>1 911</b>	<b>891</b>	<b>639</b>	<b>1 545</b>	<b>1 272</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	881	546	335	409	271	137	64
	55-59 ans	837	468	369	155	126	313	243
	60-64 ans	862	474	388	139	92	335	296
	65-69 ans	1 015	568	447	137	99	431	348
	70-74 ans	819	412	407	68	67	344	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 414</b>	<b>2 468</b>	<b>1 946</b>	<b>908</b>	<b>655</b>	<b>1 560</b>	<b>1 291</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	303	158	145	117	117	41	28
	55-59 ans	256	103	153	35	56	68	97

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	239	100	139	35	35	65	104
	65-69 ans	260	100	160	23	40	77	120
	70-74 ans	180	72	108	12	14	60	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 238</b>	<b>533</b>	<b>705</b>	<b>222</b>	<b>262</b>	<b>311</b>	<b>443</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	46	29	17	18	15	11	2
	55-59 ans	36	15	21	6	8	9	13
	60-64 ans	30	19	11	5	2	14	9
	65-69 ans	34	16	18	5	3	11	15
	70-74 ans	26	13	13	4	1	9	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>51</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	170	107	63	82	52	25	11
	55-59 ans	154	88	66	23	20	65	46
	60-64 ans	164	92	72	24	22	68	50
	65-69 ans	190	123	67	22	15	101	52
	70-74 ans	174	89	85	7	7	82	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>852</b>	<b>499</b>	<b>353</b>	<b>158</b>	<b>116</b>	<b>341</b>	<b>237</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	256	181	75	137	61	44	14
	55-59 ans	277	198	79	65	26	133	53
	60-64 ans	313	196	117	51	19	145	98
	65-69 ans	372	243	129	61	21	182	108
	70-74 ans	293	162	131	27	23	135	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 511</b>	<b>980</b>	<b>531</b>	<b>341</b>	<b>150</b>	<b>639</b>	<b>381</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	50	37	13	28	9	9	4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	72	41	31	19	9	22	22
	60-64 ans	82	49	33	17	12	32	21
	65-69 ans	117	66	51	18	14	48	37
	70-74 ans	106	56	50	13	16	43	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>427</b>	<b>249</b>	<b>178</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>154</b>	<b>118</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	15	8	7	5	4	3	3
	55-59 ans	12	6	6	3	1	3	5
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	8	3	5	3	3	0
	55-59 ans	12	7	5	1	4	6	1
	60-64 ans	11	5	6	3	2	2	4
	65-69 ans	13	5	8	4	4	1	4
	70-74 ans	17	9	8	3	4	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	7	6	7	5	0	1
	55-59 ans	6	1	5	1	2	0	3
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	429	290	139	221	114	69	25
	55-59 ans	437	290	147	89	48	201	99
	60-64 ans	484	291	193	77	41	214	152
	65-69 ans	568	367	201	83	39	284	162
	70-74 ans	473	254	219	36	32	218	187
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 391</b>	<b>1 492</b>	<b>899</b>	<b>506</b>	<b>274</b>	<b>986</b>	<b>625</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 69 - Rhône

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	256	181	75	137	61	44	14
	55-59 ans	277	198	79	65	26	133	53
	60-64 ans	313	196	117	51	19	145	98
	65-69 ans	372	243	129	61	21	182	108
	70-74 ans	293	162	131	27	23	135	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 511</b>	<b>980</b>	<b>531</b>	<b>341</b>	<b>150</b>	<b>639</b>	<b>381</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	210	148	62	115	52	33	10
	55-59 ans	231	164	67	59	23	105	44
	60-64 ans	255	158	97	42	18	116	79
	65-69 ans	301	198	103	51	16	147	87
	70-74 ans	238	132	106	23	18	109	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 235</b>	<b>800</b>	<b>435</b>	<b>290</b>	<b>127</b>	<b>510</b>	<b>308</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	239	171	68	132	58	39	10
	55-59 ans	271	196	75	67	25	129	50
	60-64 ans	308	193	115	51	21	142	94
	65-69 ans	366	246	120	58	18	188	102
	70-74 ans	302	168	134	28	20	140	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 486</b>	<b>974</b>	<b>512</b>	<b>336</b>	<b>142</b>	<b>638</b>	<b>370</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	50	37	13	28	9	9	4
	55-59 ans	72	41	31	19	9	22	22
	60-64 ans	82	49	33	17	12	32	21
	65-69 ans	117	66	51	18	14	48	37
	70-74 ans	106	56	50	13	16	43	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>427</b>	<b>249</b>	<b>178</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>154</b>	<b>118</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	49	36	13	27	9	9	4
	55-59 ans	64	35	29	17	8	18	21
	60-64 ans	77	47	30	16	11	31	19
	65-69 ans	107	60	47	15	13	45	34
	70-74 ans	93	47	46	10	14	37	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 69 - Rhône

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>390</b>	<b>225</b>	<b>165</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>140</b>	<b>110</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	48	35	13	27	9	8	4
	55-59 ans	61	32	29	16	8	16	21
	60-64 ans	76	47	29	16	11	31	18
	65-69 ans	103	57	46	13	13	44	33
	70-74 ans	89	45	44	10	13	35	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>216</b>	<b>161</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>134</b>	<b>107</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	29	19	10	16	7	3	3
	55-59 ans	35	15	20	6	6	9	14
	60-64 ans	39	21	18	8	7	13	11
	65-69 ans	68	35	33	9	8	26	25
	70-74 ans	57	25	32	6	10	19	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	19	16	3	11	2	5	1
	55-59 ans	26	17	9	10	2	7	7
	60-64 ans	37	26	11	8	4	18	7
	65-69 ans	35	22	13	4	5	18	8
	70-74 ans	32	20	12	4	3	16	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>149</b>	<b>101</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>32</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	16	9	7	8	5	1	2
	55-59 ans	16	6	10	3	3	3	7
	60-64 ans	20	11	9	4	3	7	6
	65-69 ans	32	17	15	6	4	11	11
	70-74 ans	29	13	16	4	5	9	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>37</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	3	1	0	2
	65-69 ans	11	8	3	1	1	7	2
	70-74 ans	13	5	8	2	2	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	10	8	2	7	1	1	1
	55-59 ans	10	5	5	1	2	4	3
	60-64 ans	10	5	5	1	3	4	2
	65-69 ans	20	8	12	1	3	7	9
	70-74 ans	10	2	8	0	3	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	48	35	13	27	9	8	4
	55-59 ans	60	31	29	15	8	16	21
	60-64 ans	76	47	29	16	11	31	18
	65-69 ans	104	58	46	13	13	45	33
	70-74 ans	89	45	44	10	13	35	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>216</b>	<b>161</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>135</b>	<b>107</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	11	3	10	3	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	5	5	0	4	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	8	2	6	1	4	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 69 - Rhône

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	8,2	7,3	9,0	7,6	5,8	6,0
	55-59 ans	8,1	8,2	8,0	9,9	9,7	7,5	7,4
	60-64 ans	7,3	7,0	7,5	8,9	9,6	6,4	6,9
	65-69 ans	7,3	7,3	7,3	8,9	8,3	6,9	7,0
	70-74 ans	8,7	8,4	9,0	10,7	10,4	8,0	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	3,0	2,6	0,9	1,2
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	3,7	3,4	1,5	1,9
	60-64 ans	2,0	1,9	2,2	3,2	3,7	1,4	1,8
	65-69 ans	1,8	1,8	1,9	2,6	3,3	1,5	1,5
	70-74 ans	2,8	2,8	2,7	4,8	5,0	2,4	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,1	69,4	68,7	66,1	66,5	84,3	79,2
	55-59 ans	71,7	73,2	70,5	62,2	64,5	79,3	73,7
	60-64 ans	71,8	73,5	70,6	64,3	61,3	77,9	74,3
	65-69 ans	75,1	76,1	74,3	70,7	60,6	77,9	78,2
	70-74 ans	68,3	66,6	69,5	55,2	52,5	69,5	73,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,1</b>	<b>71,6</b>	<b>70,7</b>	<b>65,0</b>	<b>63,6</b>	<b>77,1</b>	<b>75,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,6	3,9	2,6	3,5	2,3
	55-59 ans	3,7	4,6	3,0	5,5	3,5	4,2	2,7
	60-64 ans	4,0	5,1	3,2	6,6	3,5	4,6	3,2
	65-69 ans	4,8	6,1	3,7	7,2	4,7	5,8	3,5
	70-74 ans	5,3	6,1	4,7	7,2	5,6	5,9	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,7	99,5	99,6	99,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,8	99,5	100,0	99,3	99,7	99,6
	60-64 ans	99,6	99,4	99,8	98,8	100,0	99,7	99,7
	65-69 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	98,3	99,1	99,2
	70-74 ans	98,6	98,1	99,1	96,5	97,5	98,4	99,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,9	88,5	89,8	86,8	89,4	93,8	91,3
	55-59 ans	91,9	91,7	92,2	86,0	91,9	94,8	92,4
	60-64 ans	90,1	91,1	88,9	83,7	89,2	94,6	88,8
	65-69 ans	91,7	92,0	91,4	88,7	86,7	93,1	92,8
	70-74 ans	90,2	89,7	90,7	81,9	82,1	91,4	92,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>	<b>86,1</b>	<b>88,6</b>	<b>93,4</b>	<b>91,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	98,0	98,8	97,5	98,5	99,3	100,0
	55-59 ans	98,2	97,9	98,6	97,4	99,2	98,1	98,3
	60-64 ans	97,4	97,7	97,1	97,1	96,7	97,9	97,3
	65-69 ans	97,5	98,0	96,8	97,0	95,9	98,4	97,1
	70-74 ans	97,0	97,8	96,3	95,6	92,2	98,2	97,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>97,2</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>	<b>97,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	120	121	118	123	119	112	112
	55-59 ans	101	104	98	111	112	100	91
	60-64 ans	103	104	103	120	100	97	104
	65-69 ans	103	104	102	103	109	104	100
	70-74 ans	103	108	98	114	98	107	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>103</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (55-124)	82 (54-123,5)	86 (57-124)	81 (54-126)	86 (57-128,5)	82,5 (55,5-119)	78,5 (60-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	77 (52-111)	79 (53-115)	74 (50-108,5)	83 (55-119)	81,5 (56-117,5)	76 (50-111)	72 (49-105)
	60-64 ans	77 (54-111)	78 (53-111)	75,5 (54-111)	86 (54-122)	81 (58-112)	76 (53-106)	75 (53-111)
	65-69 ans	76 (52-113)	79,5 (52-112,5)	75 (52-115)	83 (50,5-117)	72 (48-117)	79 (52-110)	75 (54-113)
	70-74 ans	80 (55-113)	80 (56-117)	78,5 (54,5-109)	86 (62,5-119)	81 (55-106)	80 (55-116)	77,5 (54,5-109)
	<b>50-74 ans</b>	<b>78 (54-114)</b>	<b>80 (54-116)</b>	<b>76 (54-112)</b>	<b>83 (54-120)</b>	<b>81 (55-119)</b>	<b>78 (53-111)</b>	<b>76 (53-109)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,4	1,8	0,8	2,1	1,0	0,7	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,5	1,1	0,7	0,6	0,4
	60-64 ans	0,5	1,0	0,0	2,4	0,0	0,3	0,0
	65-69 ans	0,5	0,6	0,2	0,7	0,0	0,6	0,3
	70-74 ans	0,9	0,4	1,3	1,2	5,0	0,3	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,9	98,5	98,5	98,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	98,7	99,2	99,7	99,2
	60-64 ans	99,2	99,2	99,2	99,3	98,9	99,1	99,3
	65-69 ans	99,3	99,5	99,1	99,3	99,0	99,5	99,1
	70-74 ans	99,1	99,5	98,8	98,5	98,4	99,7	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>99,0</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,4	28,9	43,3	28,6	43,2	29,9	43,8
	55-59 ans	30,6	22,0	41,5	22,6	44,4	21,7	39,9
	60-64 ans	27,7	21,1	35,8	25,2	38,0	19,4	35,1
	65-69 ans	25,6	17,6	35,8	16,8	40,4	17,9	34,5
	70-74 ans	22,0	17,5	26,5	17,6	20,9	17,4	27,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,0</b>	<b>21,6</b>	<b>36,2</b>	<b>24,4</b>	<b>40,0</b>	<b>19,9</b>	<b>34,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	5,3	5,1	4,4	5,5	8,0	3,1
	55-59 ans	4,3	3,2	5,7	3,9	6,3	2,9	5,3
	60-64 ans	3,5	4,0	2,8	3,6	2,2	4,2	3,0
	65-69 ans	3,3	2,8	4,0	3,6	3,0	2,6	4,3
	70-74 ans	3,2	3,2	3,2	5,9	1,5	2,6	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	60-64 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,3	19,6	18,8	20,0	19,2	18,2	17,2
	55-59 ans	18,4	18,8	17,9	14,8	15,9	20,8	18,9
	60-64 ans	19,0	19,4	18,6	17,3	23,9	20,3	16,9
	65-69 ans	18,7	21,7	15,0	16,1	15,2	23,4	14,9
	70-74 ans	21,2	21,6	20,9	10,3	10,4	23,8	22,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,3</b>	<b>20,2</b>	<b>18,1</b>	<b>17,4</b>	<b>17,7</b>	<b>21,9</b>	<b>18,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,1	33,2	22,4	33,5	22,5	32,1	21,9
	55-59 ans	33,1	42,3	21,4	41,9	20,6	42,5	21,8
	60-64 ans	36,3	41,4	30,2	36,7	20,7	43,3	33,1
	65-69 ans	36,7	42,8	28,9	44,5	21,2	42,2	31,0
	70-74 ans	35,8	39,3	32,2	39,7	34,3	39,2	31,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,2</b>	<b>39,7</b>	<b>27,3</b>	<b>37,6</b>	<b>22,9</b>	<b>41,0</b>	<b>29,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	6,8	3,9	6,8	3,3	6,6	6,3
	55-59 ans	8,6	8,8	8,4	12,3	7,1	7,0	9,1
	60-64 ans	9,5	10,3	8,5	12,2	13,0	9,6	7,1
	65-69 ans	11,5	11,6	11,4	13,1	14,1	11,1	10,6
	70-74 ans	12,9	13,6	12,3	19,1	23,9	12,5	10,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>10,5</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>	<b>9,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	1,5	2,1	1,2	1,5	2,2	4,7
	55-59 ans	1,4	1,3	1,6	1,9	0,8	1,0	2,1
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	1,4	0,0	0,3	0,7
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0,7	0,0	0,7	1,1
	70-74 ans	0,9	0,7	1,0	0,0	0,0	0,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,2	1,1	2,2	0,0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	0,6	3,2	1,9	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	2,2	2,2	0,6	1,4
	65-69 ans	1,3	0,9	1,8	2,9	4,0	0,2	1,1
	70-74 ans	2,1	2,2	2,0	4,4	6,0	1,7	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	1,3	1,8	1,7	1,8	0,0	1,6
	55-59 ans	0,7	0,2	1,4	0,6	1,6	0,0	1,2
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	0,0	0,0	1,2	0,7
	65-69 ans	0,7	0,5	0,9	0,7	1,0	0,5	0,9
	70-74 ans	0,4	0,2	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	17,9	9,6	18,3	9,9	16,6	8,3
	55-59 ans	17,7	25,9	10,9	27,5	12,4	25,3	10,3
	60-64 ans	20,5	28,5	14,4	30,1	14,0	28,0	14,5
	65-69 ans	24,4	36,5	15,2	39,8	15,8	35,6	15,0
	70-74 ans	27,7	33,5	23,0	30,3	22,3	34,1	23,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>27,0</b>	<b>14,0</b>	<b>23,9</b>	<b>12,3</b>	<b>28,9</b>	<b>14,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>20,1</b>	<b>27,0</b>	<b>13,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,2	5,2	11,4	5,3	10,6	4,6
	55-59 ans	11,2	17,7	5,9	20,1	6,7	16,7	5,5
	60-64 ans	13,3	19,2	8,7	19,9	6,5	19,0	9,4
	65-69 ans	16,0	24,1	9,7	29,3	8,5	22,8	10,0
	70-74 ans	17,1	21,4	13,8	22,7	16,0	21,1	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,7</b>	<b>17,7</b>	<b>8,3</b>	<b>16,1</b>	<b>6,7</b>	<b>18,7</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,7</b>	<b>17,8</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,1	4,3	9,5	4,5	7,9	3,3
	55-59 ans	9,4	14,7	5,0	18,2	6,0	13,2	4,6
	60-64 ans	10,8	15,5	7,2	16,4	6,1	15,2	7,5
	65-69 ans	12,9	19,7	7,8	24,5	6,5	18,4	8,1
	70-74 ans	13,9	17,4	11,2	19,4	12,5	17,0	10,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>14,5</b>	<b>6,8</b>	<b>13,7</b>	<b>5,7</b>	<b>14,9</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>14,6</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	10,5	4,7	10,9	5,0	9,4	3,3
	55-59 ans	11,0	17,5	5,6	20,7	6,5	16,2	5,2
	60-64 ans	13,0	18,9	8,6	19,9	7,1	18,6	9,0
	65-69 ans	15,7	24,4	9,1	27,8	7,3	23,6	9,5
	70-74 ans	17,7	22,2	14,1	23,6	13,9	21,9	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>17,6</b>	<b>8,0</b>	<b>15,9</b>	<b>6,4</b>	<b>18,7</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,6</b>	<b>17,7</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	0,9	2,3	0,8	2,2	1,3
	55-59 ans	2,9	3,7	2,3	5,9	2,3	2,8	2,3
	60-64 ans	3,5	4,8	2,5	6,6	4,1	4,2	2,0
	65-69 ans	5,0	6,6	3,9	8,6	5,7	6,0	3,4
	70-74 ans	6,2	7,4	5,3	10,9	11,1	6,7	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	2,0	2,8	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
	55-59 ans	4,7	8,6	0,0	5,9	0,0	11,1	0,0
	60-64 ans	1,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	5,3
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	3,2	2,1	4,3	0,0	7,1	2,7	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)