

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 899	4 296	4 603	3 052	3 129	1 244	1 474
	55-59 ans	8 063	3 711	4 352	830	868	2 881	3 484
	60-64 ans	8 416	3 778	4 638	671	705	3 107	3 933
	65-69 ans	8 740	4 071	4 669	607	583	3 464	4 086
	70-74 ans	6 027	2 865	3 162	288	295	2 577	2 867
	50-74 ans	40 145	18 721	21 424	5 448	5 580	13 273	15 844
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	725	350	375	282	266	68
55-59 ans		665	314	351	77	80	237	271
60-64 ans		680	314	366	57	55	257	311
65-69 ans		605	287	318	53	50	234	268
70-74 ans		449	209	240	22	23	187	217
50-74 ans		3 124	1 474	1 650	491	474	983	1 176
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	525	251	274	196	187	55
	55-59 ans	513	248	265	53	53	195	212
	60-64 ans	534	246	288	38	37	208	251
	65-69 ans	493	234	259	41	38	193	221
	70-74 ans	342	162	180	15	15	147	165
	50-74 ans	2 407	1 141	1 266	343	330	798	936
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	200	99	101	86	79	13
55-59 ans		152	66	86	24	27	42	59
60-64 ans		146	68	78	19	18	49	60
65-69 ans		112	53	59	12	12	41	47
70-74 ans		107	47	60	7	8	40	52
50-74 ans		717	333	384	148	144	185	240
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	8 699	4 197	4 502	2 966	3 050	1 231
	55-59 ans	7 911	3 645	4 266	806	841	2 839	3 425
	60-64 ans	8 270	3 710	4 560	652	687	3 058	3 873
	65-69 ans	8 628	4 018	4 610	595	571	3 423	4 039
	70-74 ans	5 920	2 818	3 102	281	287	2 537	2 815
	50-74 ans	39 428	18 388	21 040	5 300	5 436	13 088	15 604
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	348	204	144	143	102	61
55-59 ans		346	187	159	43	29	144	130
60-64 ans		430	247	183	50	28	197	155
65-69 ans		492	284	208	55	35	229	173
50-74 ans		1 616	722	794	246	194	621	450

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	374	215	159	34	11	181	148
	50-74 ans	1 990	1 137	853	325	205	812	648
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	346	202	144	141	102	61	42
	55-59 ans	344	186	158	43	29	143	129
	60-64 ans	430	247	183	50	28	197	155
	65-69 ans	490	282	208	55	35	227	173
	70-74 ans	370	212	158	34	11	178	147
	50-74 ans	1 980	1 129	851	323	205	806	646
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	309	180	129	122	92	58	37
	55-59 ans	319	170	149	41	29	129	120
	60-64 ans	383	214	169	39	25	175	144
	65-69 ans	443	255	188	49	33	206	155
	70-74 ans	340	192	148	30	11	162	137
	50-74 ans	1 794	1 011	783	281	190	730	593
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	295	172	123	120	86	52	37
	55-59 ans	310	165	145	40	29	125	116
	60-64 ans	368	206	162	39	24	167	138
	65-69 ans	410	239	171	46	27	193	144
	70-74 ans	319	184	135	27	10	157	125
	50-74 ans	1 702	966	736	272	176	694	560
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	307	179	128	122	91	57	37
	55-59 ans	318	170	148	41	29	129	119
	60-64 ans	377	211	166	39	25	172	141
	65-69 ans	430	249	181	48	31	201	150
	70-74 ans	331	190	141	30	11	160	130
	50-74 ans	1 763	999	764	280	187	719	577
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	13	6	7	1	2	5	5
	70-74 ans	9	2	7	0	0	2	7
	50-74 ans	31	12	19	1	3	11	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	305	178	127	122	90	56	37
	55-59 ans	318	169	149	41	29	128	120
	60-64 ans	378	212	166	39	25	173	141
	65-69 ans	433	249	184	48	32	201	152
	70-74 ans	333	190	143	29	11	161	132
	50-74 ans	1 767	998	769	279	187	719	582
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	310	181	129	123	92	58	37
	55-59 ans	322	172	150	41	29	131	121
	60-64 ans	383	214	169	39	25	175	144
	65-69 ans	445	257	188	49	33	208	155
	70-74 ans	344	195	149	30	11	165	138
	50-74 ans	1 804	1 019	785	282	190	737	595
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	142	69	73	49	49	20	24
	55-59 ans	118	55	63	12	15	43	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	136	58	78	8	11	50	67
	65-69 ans	162	72	90	17	18	55	72
	70-74 ans	117	59	58	7	1	52	57
	50-74 ans	675	313	362	93	94	220	268
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	32	18	14	13	11	5	3
	55-59 ans	20	11	9	1	1	10	8
	60-64 ans	32	20	12	4	1	16	11
	65-69 ans	24	18	6	2	1	16	5
	70-74 ans	28	15	13	3	0	12	13
	50-74 ans	136	82	54	23	14	59	40
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	21	9	16	6	5	3
	55-59 ans	56	29	27	8	6	21	21
	60-64 ans	59	36	23	4	5	32	18
	65-69 ans	73	37	36	8	5	29	31
	70-74 ans	63	40	23	5	3	35	20
	50-74 ans	281	163	118	41	25	122	93
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	66	47	19	29	16	18	3
	55-59 ans	87	56	31	17	5	39	26
	60-64 ans	107	69	38	16	6	53	32
	65-69 ans	119	91	28	14	4	77	24
	70-74 ans	85	49	36	13	2	36	34
	50-74 ans	464	312	152	89	33	223	119
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	14	10	2	2	12	8
	60-64 ans	36	23	13	5	2	18	11
	65-69 ans	42	24	18	5	3	19	15
	70-74 ans	28	19	9	1	3	18	6
	50-74 ans	151	93	58	22	15	71	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	28	19	9	5	0	14	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	15	10	5	2	0	8	5
	70-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
	50-74 ans	48	27	21	6	4	21	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	96	68	28	45	22	23	6
	55-59 ans	143	85	58	25	11	60	47
	60-64 ans	166	105	61	20	11	85	50
	65-69 ans	192	128	64	22	9	106	55
	70-74 ans	148	89	59	18	5	71	54
	50-74 ans	745	475	270	130	58	345	212

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	66	47	19	29	16	18	3
	55-59 ans	87	56	31	17	5	39	26
	60-64 ans	107	69	38	16	6	53	32
	65-69 ans	119	91	28	14	4	77	24
	70-74 ans	85	49	36	13	2	36	34
	50-74 ans	464	312	152	89	33	223	119
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	60	44	16	27	14	17	2
	55-59 ans	76	49	27	16	5	33	22
	60-64 ans	96	64	32	14	6	50	26
	65-69 ans	100	76	24	12	4	64	20
	70-74 ans	69	40	29	11	2	29	27
	50-74 ans	401	273	128	80	31	193	97
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	69	50	19	30	16	20	3
	55-59 ans	89	60	29	18	5	42	24
	60-64 ans	113	75	38	18	6	57	32
	65-69 ans	119	89	30	13	4	76	26
	70-74 ans	80	46	34	12	3	34	31
	50-74 ans	470	320	150	91	34	229	116
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	24	14	10	2	2	12	8
	60-64 ans	36	23	13	5	2	18	11
	65-69 ans	42	24	18	5	3	19	15
	70-74 ans	28	19	9	1	3	18	6
	50-74 ans	151	93	58	22	15	71	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	23	13	10	2	2	11	8
	60-64 ans	34	22	12	4	2	18	10
	65-69 ans	40	22	18	4	3	18	15
	70-74 ans	26	18	8	1	3	17	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 80 - Somme

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	144	88	56	20	15	68	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	9	3	6	0	2	3	4
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	19	7	12	3	1	4	11
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	50-74 ans	53	27	26	9	6	18	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	8	7	5	4	3	3
	55-59 ans	14	10	4	2	0	8	4
	60-64 ans	23	16	7	3	1	13	6
	65-69 ans	20	14	6	1	2	13	4
	70-74 ans	17	11	6	0	2	11	4
	50-74 ans	89	59	30	11	9	48	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	11	6	5	1	0	5	5
	65-69 ans	11	9	2	1	1	8	1
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	43	30	13	4	3	26	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	12	10	2	2	1	8	1
	65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	47	29	18	7	6	22	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	27	20	7	2	0	18	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	22	12	10	2	2	10	8
	60-64 ans	33	22	11	4	2	18	9
	65-69 ans	37	21	16	4	3	17	13
	70-74 ans	23	15	8	1	3	14	5
	50-74 ans	136	83	53	20	15	63	38
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	17	11	15	8	2	3
	55-59 ans	18	12	6	1	0	11	6
	60-64 ans	34	21	13	6	3	15	10
	65-69 ans	36	21	15	5	2	16	13
	70-74 ans	21	15	6	3	0	12	6
	50-74 ans	137	86	51	30	13	56	38

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,1	8,1	9,2	8,5	5,5	7,4
	55-59 ans	8,2	8,5	8,1	9,3	9,2	8,2	7,8
	60-64 ans	8,1	8,3	7,9	8,5	7,8	8,3	7,9
	65-69 ans	6,9	7,0	6,8	8,7	8,6	6,8	6,6
	70-74 ans	7,4	7,3	7,6	7,6	7,8	7,3	7,6
	50-74 ans	7,8	7,9	7,7	9,0	8,5	7,4	7,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,2	2,8	2,5	1,0	1,5
	55-59 ans	1,9	1,8	2,0	2,9	3,1	1,5	1,7
	60-64 ans	1,7	1,8	1,7	2,8	2,6	1,6	1,5
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	2,0	2,1	1,2	1,2
	70-74 ans	1,8	1,6	1,9	2,4	2,7	1,6	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,7	2,6	1,4	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,4	71,7	73,1	69,5	70,3	80,9	79,8
	55-59 ans	77,1	79,0	75,5	68,8	66,3	82,3	78,2
	60-64 ans	78,5	78,3	78,7	66,7	67,3	80,9	80,7
	65-69 ans	81,5	81,5	81,4	77,4	76,0	82,5	82,5
	70-74 ans	76,2	77,5	75,0	68,2	65,2	78,6	76,0
	50-74 ans	77,0	77,4	76,7	69,9	69,6	81,2	79,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,0	4,9	3,2	4,8	3,3	5,0	2,9
	55-59 ans	4,4	5,1	3,7	5,3	3,4	5,1	3,8
	60-64 ans	5,2	6,7	4,0	7,7	4,1	6,4	4,0
	65-69 ans	5,7	7,1	4,5	9,2	6,1	6,7	4,3
	70-74 ans	6,3	7,6	5,1	12,1	3,8	7,1	5,3
	50-74 ans	5,0	6,2	4,1	6,1	3,8	6,2	4,2
50-74 ans **	5,0	6,0	4,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,0	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,5	99,4	100,0	100,0	99,3	99,2
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	70-74 ans	98,9	98,6	99,4	100,0	100,0	98,3	99,3
	50-74 ans	99,5	99,3	99,8	99,4	100,0	99,3	99,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,3	89,1	89,6	86,5	90,2	95,1	88,1
	55-59 ans	92,7	91,4	94,3	95,3	100,0	90,2	93,0
	60-64 ans	89,1	86,6	92,3	78,0	89,3	88,8	92,9
	65-69 ans	90,4	90,4	90,4	89,1	94,3	90,7	89,6
	70-74 ans	91,9	90,6	93,7	88,2	100,0	91,0	93,2
	50-74 ans	90,6	89,5	92,0	87,0	92,7	90,6	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,5	95,6	95,3	98,4	93,5	89,7	100,0
	55-59 ans	97,2	97,1	97,3	97,6	100,0	96,9	96,7
	60-64 ans	96,1	96,3	95,9	100,0	96,0	95,4	95,8
	65-69 ans	92,6	93,7	91,0	93,9	81,8	93,7	92,9
	70-74 ans	93,8	95,8	91,2	90,0	90,9	96,9	91,2
	50-74 ans	94,9	95,5	94,0	96,8	92,6	95,1	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	89	71	95	73	77	68
	55-59 ans	86	89	83	83	113	91	76
	60-64 ans	84	90	77	91	105	90	72
	65-69 ans	83	85	80	85	107	84	74
	70-74 ans	80	86	73	84	67	86	73
	50-74 ans	83	88	77	90	89	87	73
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (46-94)	67 (47-103,5)	61 (45-88)	70 (47-112)	60,5 (43,5-88)	63 (47-90)	61 (47-86)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	68 (50-104)	76 (54-111)	65 (46-88)	64 (50-105)	76 (44-168)	76 (56-113)	61 (46,5-86)
	60-64 ans	65 (46-96)	65 (47-98)	65 (43-87)	66 (46-108)	65 (56-86)	64 (47-98)	65 (40,5-89)
	65-69 ans	63 (47-97)	68 (48-101)	57,5 (44-94,5)	62 (47-92)	66 (54-143)	70 (49-102)	55 (43-91)
	70-74 ans	64 (47-94,5)	68,5 (47-99,5)	60 (46,5-84,5)	80,5 (53-110)	70 (44-90)	66 (47-98)	60 (47-83)
	50-74 ans	65 (47-96)	68 (48-103)	61 (45-88)	67 (48-106)	65 (47-95)	69 (48-101)	61 (44-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,0	8,3	7,6	10,5	7,8	3,3	7,1
	55-59 ans	5,2	6,4	3,8	2,3	0,0	7,6	4,6
	60-64 ans	7,9	8,5	7,1	12,0	10,7	7,6	6,5
	65-69 ans	7,3	7,4	7,2	9,1	5,7	7,0	7,5
	70-74 ans	5,6	7,0	3,8	8,8	0,0	6,6	4,1
	50-74 ans	6,9	7,6	6,0	9,2	6,3	6,9	5,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,9	98,4	100,0	97,8	96,6	100,0
	55-59 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	98,7	99,1	98,2	100,0	100,0	98,9	97,9
	65-69 ans	97,7	97,6	97,9	98,0	97,0	97,6	98,1
	70-74 ans	97,9	99,0	96,6	96,7	100,0	99,4	96,4
	50-74 ans	98,5	98,7	98,2	99,3	98,4	98,5	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,8	38,1	56,6	39,8	53,3	34,5	64,9
	55-59 ans	36,6	32,0	42,0	29,3	51,7	32,8	39,7
	60-64 ans	35,5	27,1	46,2	20,5	44,0	28,6	46,5
	65-69 ans	36,4	28,0	47,9	34,7	54,5	26,4	46,5
	70-74 ans	34,0	30,3	38,9	23,3	9,1	31,5	41,3
	50-74 ans	37,4	30,7	46,1	33,0	49,5	29,9	45,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	9,9	10,9	10,6	12,0	8,6	8,1
	55-59 ans	6,2	6,4	6,0	2,4	3,4	7,6	6,6
	60-64 ans	8,4	9,3	7,1	10,3	4,0	9,1	7,6
	65-69 ans	5,4	7,0	3,2	4,1	3,0	7,7	3,2
	70-74 ans	8,1	7,7	8,7	10,0	0,0	7,3	9,4
	50-74 ans	7,5	8,0	6,9	8,2	7,4	8,0	6,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	0,6	1,6	0,8	2,2	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	0,6	1,3	0,0	0,0	0,8	1,7
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,4	1,1	0,5	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,7	11,6	7,0	13,0	6,5	8,6	8,1
	55-59 ans	17,4	16,9	18,0	19,5	20,7	16,0	17,4
	60-64 ans	15,4	16,8	13,6	10,3	20,0	18,3	12,5
	65-69 ans	16,4	14,4	19,1	16,3	15,2	13,9	20,0
	70-74 ans	18,3	20,5	15,4	16,7	27,3	21,2	14,5
	50-74 ans	15,6	16,0	15,0	14,5	13,2	16,6	15,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,3	26,0	14,7	23,6	17,4	31,0	8,1
	55-59 ans	27,0	32,6	20,7	41,5	17,2	29,8	21,5
	60-64 ans	27,9	32,2	22,5	41,0	24,0	30,3	22,2
	65-69 ans	26,7	35,4	14,9	28,6	12,1	37,0	15,5
	70-74 ans	24,7	25,1	24,2	43,3	18,2	21,8	24,6
	50-74 ans	25,7	30,6	19,4	31,6	17,4	30,3	20,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	7,2	6,2	7,3	5,4	6,9	8,1
	55-59 ans	7,5	8,1	6,7	4,9	6,9	9,2	6,6
	60-64 ans	9,4	10,7	7,7	12,8	8,0	10,3	7,6
	65-69 ans	9,4	9,3	9,6	10,2	9,1	9,1	9,7
	70-74 ans	8,1	9,7	6,0	3,3	27,3	10,9	4,3
	50-74 ans	8,4	9,1	7,4	7,8	7,9	9,6	7,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	1,7	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0
	55-59 ans	2,2	1,7	2,7	2,4	0,0	1,5	3,3
	60-64 ans	1,6	2,3	0,6	5,1	0,0	1,7	0,7
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	1,4	1,3
	70-74 ans	2,0	2,6	1,3	0,0	0,0	3,0	1,4
	50-74 ans	1,6	1,9	1,1	1,8	0,0	1,9	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	3,9	2,3	3,3	2,2	5,2	2,7
	55-59 ans	1,9	1,2	2,7	0,0	0,0	1,5	3,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,3	0,9	1,8	0,0	0,0	1,1	2,1
	65-69 ans	3,4	3,9	2,7	4,1	0,0	3,8	3,2
	70-74 ans	3,5	3,1	4,0	0,0	18,2	3,6	2,9
	50-74 ans	2,7	2,6	2,7	2,1	2,1	2,8	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	1,1	0,8	0,0	1,1	3,4	0,0
	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	2,0	0,0	0,0	0,6
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,4	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,0	16,2	6,2	15,2	7,2	18,7	4,1
	55-59 ans	18,1	23,3	13,6	31,0	13,1	21,1	13,7
	60-64 ans	20,1	28,3	13,4	30,7	16,0	27,8	12,9
	65-69 ans	22,3	31,9	13,9	37,0	15,8	31,0	13,6
	70-74 ans	25,0	31,6	19,0	64,1	17,4	28,0	19,2
	50-74 ans	18,9	25,8	12,8	24,5	10,7	26,4	13,6
	50-74 ans **	18,5	25,0	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	11,2	4,2	9,8	5,2	14,6	2,1
	55-59 ans	11,0	15,4	7,3	21,1	5,9	13,7	7,6
	60-64 ans	12,9	18,6	8,3	24,5	8,7	17,3	8,3
	65-69 ans	13,8	22,6	6,1	23,5	7,0	22,5	5,9
	70-74 ans	14,4	17,4	11,6	46,3	7,0	14,2	12,1
	50-74 ans	11,8	17,0	7,2	16,8	6,1	17,0	7,6
	50-74 ans **	11,6	16,4	7,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	10,5	3,6	9,1	4,6	13,8	1,4
	55-59 ans	9,6	13,4	6,3	19,9	5,9	11,6	6,4
	60-64 ans	11,6	17,3	7,0	21,5	8,7	16,4	6,7
	65-69 ans	11,6	18,9	5,2	20,2	7,0	18,7	5,0
	70-74 ans	11,7	14,2	9,3	39,1	7,0	11,4	9,6
	50-74 ans	10,2	14,8	6,1	15,1	5,7	14,7	6,2
	50-74 ans **	10,1	14,4	6,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,9	4,2	10,1	5,2	16,2	2,1
	55-59 ans	11,3	16,5	6,8	22,3	5,9	14,8	7,0
	60-64 ans	13,7	20,2	8,3	27,6	8,7	18,6	8,3
	65-69 ans	13,8	22,2	6,5	21,8	7,0	22,2	6,4
	70-74 ans	13,5	16,3	11,0	42,7	10,5	13,4	11,0
	50-74 ans	11,9	17,4	7,1	17,2	6,3	17,5	7,4
	50-74 ans **	11,8	16,9	7,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,1	1,8	3,0	1,6	3,2	2,1
	55-59 ans	3,0	3,8	2,3	2,5	2,4	4,2	2,3
	60-64 ans	4,4	6,2	2,9	7,7	2,9	5,9	2,8
	65-69 ans	4,9	6,0	3,9	8,4	5,3	5,6	3,7
	70-74 ans	4,7	6,7	2,9	3,6	10,5	7,1	2,1
	50-74 ans	3,8	5,1	2,8	4,2	2,8	5,4	2,8
	50-74 ans **	3,7	4,9	2,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	28,6	38,5	12,5	44,4	20,0	25,0	0,0
	55-59 ans	39,1	23,1	60,0	0,0	100,0	27,3	50,0
	60-64 ans	32,4	27,3	41,7	25,0	50,0	27,8	40,0
	65-69 ans	47,5	31,8	66,7	75,0	33,3	22,2	73,3
	70-74 ans	30,8	33,3	25,0	100,0	33,3	29,4	20,0
	50-74 ans	36,8	30,7	46,4	45,0	40,0	26,5	48,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)