

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	106 665	50 994	55 671	36 578	38 229	14 416	17 442
	55-59 ans	88 396	40 328	48 068	10 432	11 461	29 896	36 607
	60-64 ans	90 482	40 145	50 337	8 084	8 508	32 061	41 829
	65-69 ans	89 166	39 962	49 204	6 249	6 394	33 713	42 810
	70-74 ans	54 121	24 252	29 869	2 860	3 052	21 392	26 817
	<b>50-74 ans</b>	<b>428 830</b>	<b>195 681</b>	<b>233 149</b>	<b>64 203</b>	<b>67 644</b>	<b>131 478</b>	<b>165 505</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	9 906	4 950	4 956	3 865	3 663	1 085	1 293
	55-59 ans	8 099	3 783	4 316	1 095	1 259	2 688	3 057
	60-64 ans	7 529	3 395	4 134	785	858	2 610	3 276
	65-69 ans	7 189	3 139	4 050	613	647	2 526	3 403
	70-74 ans	4 781	2 050	2 731	270	346	1 780	2 385
	<b>50-74 ans</b>	<b>37 504</b>	<b>17 317</b>	<b>20 187</b>	<b>6 628</b>	<b>6 773</b>	<b>10 689</b>	<b>13 414</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	7 043	3 510	3 533	2 659	2 519	851	1 014
	55-59 ans	6 042	2 842	3 200	710	780	2 132	2 420
	60-64 ans	5 732	2 587	3 145	523	557	2 064	2 588
	65-69 ans	5 530	2 452	3 078	427	386	2 025	2 692
	70-74 ans	3 546	1 534	2 012	163	219	1 371	1 793
	<b>50-74 ans</b>	<b>27 893</b>	<b>12 925</b>	<b>14 968</b>	<b>4 482</b>	<b>4 461</b>	<b>8 443</b>	<b>10 507</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 863	1 440	1 423	1 206	1 144	234	279
	55-59 ans	2 057	941	1 116	385	479	556	637
	60-64 ans	1 797	808	989	262	301	546	688
	65-69 ans	1 659	687	972	186	261	501	711
	70-74 ans	1 235	516	719	107	127	409	592
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 611</b>	<b>4 392</b>	<b>5 219</b>	<b>2 146</b>	<b>2 312</b>	<b>2 246</b>	<b>2 907</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	103 802	49 554	54 248	35 372	37 085	14 182	17 163
	55-59 ans	86 339	39 387	46 952	10 047	10 982	29 340	35 970
	60-64 ans	88 685	39 337	49 348	7 822	8 207	31 515	41 141
	65-69 ans	87 507	39 275	48 232	6 063	6 133	33 212	42 099

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	52 886	23 736	29 150	2 753	2 925	20 983	26 225
	<b>50-74 ans</b>	<b>419 219</b>	<b>191 289</b>	<b>227 930</b>	<b>62 057</b>	<b>65 332</b>	<b>129 232</b>	<b>162 598</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	3 960	2 234	1 726	1 646	1 235	588	491
	55-59 ans	3 764	2 157	1 607	653	464	1 504	1 143
	60-64 ans	4 596	2 641	1 955	655	402	1 986	1 553
	65-69 ans	5 107	2 950	2 157	584	361	2 366	1 796
	70-74 ans	3 422	1 947	1 475	306	196	1 641	1 279
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 849</b>	<b>11 929</b>	<b>8 920</b>	<b>3 844</b>	<b>2 658</b>	<b>8 085</b>	<b>6 262</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 925	2 215	1 710	1 637	1 223	578	487
	55-59 ans	3 730	2 142	1 588	650	459	1 492	1 129
	60-64 ans	4 544	2 606	1 938	649	399	1 957	1 539
	65-69 ans	5 038	2 907	2 131	574	356	2 333	1 775
	70-74 ans	3 334	1 896	1 438	300	193	1 596	1 245
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 571</b>	<b>11 766</b>	<b>8 805</b>	<b>3 810</b>	<b>2 630</b>	<b>7 956</b>	<b>6 175</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	3 308	1 863	1 445	1 351	1 009	512	436
	55-59 ans	3 213	1 833	1 380	514	372	1 319	1 008
	60-64 ans	3 969	2 257	1 712	522	339	1 735	1 373
	65-69 ans	4 398	2 538	1 860	483	292	2 055	1 568
	70-74 ans	2 879	1 644	1 235	238	150	1 406	1 085
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 767</b>	<b>10 135</b>	<b>7 632</b>	<b>3 108</b>	<b>2 162</b>	<b>7 027</b>	<b>5 470</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3 236	1 838	1 398	1 334	973	504	425
	55-59 ans	3 156	1 806	1 350	507	365	1 299	985
	60-64 ans	3 858	2 204	1 654	505	327	1 699	1 327
	65-69 ans	4 255	2 470	1 785	463	278	2 007	1 507
	70-74 ans	2 762	1 591	1 171	227	142	1 364	1 029
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 267</b>	<b>9 909</b>	<b>7 358</b>	<b>3 036</b>	<b>2 085</b>	<b>6 873</b>	<b>5 273</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	10	9	1	5	1	4	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	17	12	5	5	1	7	4
	65-69 ans	28	18	10	3	2	15	8

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3 284	1 857	1 427	1 346	998	511	429
	55-59 ans	3 193	1 827	1 366	513	368	1 314	998
	60-64 ans	3 908	2 236	1 672	516	331	1 720	1 341
	65-69 ans	4 339	2 516	1 823	479	287	2 037	1 536
	70-74 ans	2 825	1 625	1 200	236	149	1 389	1 051
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 549</b>	<b>10 061</b>	<b>7 488</b>	<b>3 090</b>	<b>2 133</b>	<b>6 971</b>	<b>5 355</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	24	6	18	5	11	1	7
	55-59 ans	20	6	14	1	4	5	10
	60-64 ans	61	21	40	6	8	15	32
	65-69 ans	59	22	37	4	5	18	32
	70-74 ans	54	19	35	2	1	17	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>74</b>	<b>144</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>115</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	15	6	9	3	8	3	1
	55-59 ans	11	5	6	2	1	3	5
	60-64 ans	14	10	4	5	2	5	2
	65-69 ans	35	20	15	5	3	15	12
	70-74 ans	39	21	18	5	2	16	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>36</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,3	9,7	8,9	10,6	9,6	7,5	7,4
	55-59 ans	9,2	9,4	9,0	10,5	11,0	9,0	8,4
	60-64 ans	8,3	8,5	8,2	9,7	10,1	8,1	7,8
	65-69 ans	8,1	7,9	8,2	9,8	10,1	7,5	7,9
	70-74 ans	8,8	8,5	9,1	9,4	11,3	8,3	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,6	3,3	3,0	1,6	1,6
	55-59 ans	2,3	2,3	2,3	3,7	4,2	1,9	1,7
	60-64 ans	2,0	2,0	2,0	3,2	3,5	1,7	1,6
	65-69 ans	1,9	1,7	2,0	3,0	4,1	1,5	1,7
	70-74 ans	2,3	2,1	2,4	3,7	4,2	1,9	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	70,9	71,3	68,8	68,8	78,4	78,4
	55-59 ans	74,6	75,1	74,1	64,8	62,0	79,3	79,2
	60-64 ans	76,1	76,2	76,1	66,6	64,9	79,1	79,0
	65-69 ans	76,9	78,1	76,0	69,7	59,7	80,2	79,1
	70-74 ans	74,2	74,8	73,7	60,4	63,3	77,0	75,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,4</b>	<b>74,6</b>	<b>74,1</b>	<b>67,6</b>	<b>65,9</b>	<b>79,0</b>	<b>78,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	4,7	3,3	4,1	2,9
	55-59 ans	4,4	5,5	3,4	6,5	4,2	5,1	3,2
	60-64 ans	5,2	6,7	4,0	8,4	4,9	6,3	3,8
	65-69 ans	5,8	7,5	4,5	9,6	5,9	7,1	4,3
	70-74 ans	6,5	8,2	5,1	11,1	6,7	7,8	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,1	99,1	99,5	99,0	98,3	99,2
	55-59 ans	99,1	99,3	98,8	99,5	98,9	99,2	98,8