

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	88 251	43 236	45 015	32 337	32 817	10 899	12 198
	55-59 ans	75 258	34 766	40 492	10 947	12 009	23 819	28 483
	60-64 ans	78 527	35 350	43 177	9 413	10 451	25 937	32 726
	65-69 ans	85 539	38 150	47 389	8 580	9 440	29 570	37 949
	70-74 ans	66 578	29 934	36 644	5 592	6 322	24 342	30 322
	<b>50-74 ans</b>	<b>394 153</b>	<b>181 436</b>	<b>212 717</b>	<b>66 869</b>	<b>71 039</b>	<b>114 567</b>	<b>141 678</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	8 204	4 127	4 077	3 473	3 371	654	706
	55-59 ans	6 970	3 306	3 664	1 756	1 968	1 550	1 696
	60-64 ans	6 830	3 127	3 703	1 602	1 750	1 525	1 953
	65-69 ans	7 224	3 104	4 120	1 455	1 795	1 649	2 325
	70-74 ans	6 694	2 994	3 700	1 271	1 527	1 723	2 173
	<b>50-74 ans</b>	<b>35 922</b>	<b>16 658</b>	<b>19 264</b>	<b>9 557</b>	<b>10 411</b>	<b>7 101</b>	<b>8 853</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	4 298	2 122	2 176	1 558	1 564	564	612
	55-59 ans	3 853	1 874	1 979	513	548	1 361	1 431
	60-64 ans	3 873	1 757	2 116	423	417	1 334	1 699
	65-69 ans	4 236	1 800	2 436	372	391	1 428	2 045
	70-74 ans	3 679	1 658	2 021	270	275	1 388	1 746
	<b>50-74 ans</b>	<b>19 939</b>	<b>9 211</b>	<b>10 728</b>	<b>3 136</b>	<b>3 195</b>	<b>6 075</b>	<b>7 533</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3 906	2 005	1 901	1 915	1 807	90	94
	55-59 ans	3 117	1 432	1 685	1 243	1 420	189	265
	60-64 ans	2 957	1 370	1 587	1 179	1 333	191	254
	65-69 ans	2 988	1 304	1 684	1 083	1 404	221	280
	70-74 ans	3 015	1 336	1 679	1 001	1 252	335	427
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 983</b>	<b>7 447</b>	<b>8 536</b>	<b>6 421</b>	<b>7 216</b>	<b>1 026</b>	<b>1 320</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	84 345	41 231	43 114	30 422	31 010	10 809	12 104
	55-59 ans	72 141	33 334	38 807	9 704	10 589	23 630	28 218
	60-64 ans	75 570	33 980	41 590	8 234	9 118	25 746	32 472
	65-69 ans	82 551	36 846	45 705	7 497	8 036	29 349	37 669

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

2/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	63 563	28 598	34 965	4 591	5 070	24 007	29 895
	<b>50-74 ans</b>	<b>378 170</b>	<b>173 989</b>	<b>204 181</b>	<b>60 448</b>	<b>63 823</b>	<b>113 541</b>	<b>140 358</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 949	1 645	1 304	1 228	971	417	333
	55-59 ans	2 818	1 561	1 257	558	366	1 003	891
	60-64 ans	3 383	1 836	1 547	511	385	1 325	1 162
	65-69 ans	4 169	2 353	1 816	571	361	1 782	1 455
	70-74 ans	3 935	2 127	1 808	345	305	1 782	1 503
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 254</b>	<b>9 522</b>	<b>7 732</b>	<b>3 213</b>	<b>2 388</b>	<b>6 309</b>	<b>5 344</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 923	1 631	1 292	1 218	964	413	328
	55-59 ans	2 796	1 550	1 246	557	360	993	886
	60-64 ans	3 345	1 816	1 529	507	380	1 309	1 149
	65-69 ans	4 120	2 323	1 797	564	359	1 759	1 438
	70-74 ans	3 864	2 083	1 781	337	301	1 746	1 480
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 048</b>	<b>9 403</b>	<b>7 645</b>	<b>3 183</b>	<b>2 364</b>	<b>6 220</b>	<b>5 281</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 528	1 407	1 121	1 035	820	372	301
	55-59 ans	2 459	1 349	1 110	456	300	893	810
	60-64 ans	2 974	1 618	1 356	423	316	1 195	1 040
	65-69 ans	3 678	2 052	1 626	479	315	1 573	1 311
	70-74 ans	3 432	1 873	1 559	281	257	1 592	1 302
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 071</b>	<b>8 299</b>	<b>6 772</b>	<b>2 674</b>	<b>2 008</b>	<b>5 625</b>	<b>4 764</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 372	1 327	1 045	973	768	354	277
	55-59 ans	2 307	1 266	1 041	424	279	842	762
	60-64 ans	2 726	1 495	1 231	387	269	1 108	962
	65-69 ans	3 375	1 891	1 484	438	282	1 453	1 202
	70-74 ans	3 129	1 714	1 415	249	233	1 465	1 182
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 909</b>	<b>7 693</b>	<b>6 216</b>	<b>2 471</b>	<b>1 831</b>	<b>5 222</b>	<b>4 385</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	10	4	6	2	0	2	6
	60-64 ans	15	10	5	4	1	6	4
	65-69 ans	25	11	14	4	3	7	11

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 524	1 406	1 118	1 035	818	371	300
	55-59 ans	2 453	1 344	1 109	455	300	889	809
	60-64 ans	2 961	1 613	1 348	423	314	1 190	1 034
	65-69 ans	3 661	2 045	1 616	476	314	1 569	1 302
	70-74 ans	3 408	1 862	1 546	279	257	1 583	1 289
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 007</b>	<b>8 270</b>	<b>6 737</b>	<b>2 668</b>	<b>2 003</b>	<b>5 602</b>	<b>4 734</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	13	5	8	0	2	5	6
	65-69 ans	17	7	10	3	1	4	9
	70-74 ans	24	11	13	2	0	9	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	10	5	5	3	5	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	10	4	6	1	3	3	3
	65-69 ans	20	11	9	3	2	8	7
	70-74 ans	26	15	11	4	0	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>22</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/5

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,3	9,5	9,1	10,7	10,3	6,0	5,8
	55-59 ans	9,3	9,5	9,0	16,0	16,4	6,5	6,0
	60-64 ans	8,7	8,8	8,6	17,0	16,7	5,9	6,0
	65-69 ans	8,4	8,1	8,7	17,0	19,0	5,6	6,1
	70-74 ans	10,1	10,0	10,1	22,7	24,2	7,1	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,1</b>	<b>14,3</b>	<b>14,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,6	4,2	5,9	5,5	0,8	0,8
	55-59 ans	4,1	4,1	4,2	11,4	11,8	0,8	0,9
	60-64 ans	3,8	3,9	3,7	12,5	12,8	0,7	0,8
	65-69 ans	3,5	3,4	3,6	12,6	14,9	0,7	0,7
	70-74 ans	4,5	4,5	4,6	17,9	19,8	1,4	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,4	51,4	53,4	44,9	46,4	86,2	86,7
	55-59 ans	55,3	56,7	54,0	29,2	27,8	87,8	84,4
	60-64 ans	56,7	56,2	57,1	26,4	23,8	87,5	87,0
	65-69 ans	58,6	58,0	59,1	25,6	21,8	86,6	88,0
	70-74 ans	55,0	55,4	54,6	21,2	18,0	80,6	80,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,5</b>	<b>55,3</b>	<b>55,7</b>	<b>32,8</b>	<b>30,7</b>	<b>85,6</b>	<b>85,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,0	4,0	3,1	3,9	2,8
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	5,8	3,5	4,2	3,2
	60-64 ans	4,5	5,4	3,7	6,2	4,2	5,1	3,6
	65-69 ans	5,1	6,4	4,0	7,6	4,5	6,1	3,9
	70-74 ans	6,2	7,4	5,2	7,5	6,0	7,4	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,1	99,1	99,2	99,3	99,0	98,5
	55-59 ans	99,2	99,3	99,1	99,8	98,4	99,0	99,4