

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 481	7 771	9 710	5 756	6 698	2 015	3 012
	55-59 ans	13 070	5 744	7 326	1 739	1 871	4 005	5 455
	60-64 ans	11 488	5 045	6 443	1 358	1 473	3 687	4 970
	65-69 ans	7 192	3 311	3 881	809	821	2 502	3 060
	70-74 ans	4 233	2 002	2 231	403	449	1 599	1 782
	50-74 ans	53 464	23 873	29 591	10 065	11 312	13 808	18 279
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 099	519	580	411	416	108	164
	55-59 ans	816	398	418	152	128	246	290
	60-64 ans	778	372	406	120	108	252	298
	65-69 ans	582	267	315	74	91	193	224
	70-74 ans	487	226	261	54	70	172	191
	50-74 ans	3 762	1 782	1 980	811	813	971	1 167
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	585	247	338	184	231	63	107
	55-59 ans	465	212	253	57	69	155	184
	60-64 ans	487	234	253	66	57	168	196
	65-69 ans	353	174	179	40	45	134	134
	70-74 ans	249	117	132	27	29	90	103
	50-74 ans	2 139	984	1 155	374	431	610	724
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	514	272	242	227	185	45	57
	55-59 ans	351	186	165	95	59	91	106
	60-64 ans	291	138	153	54	51	84	102
	65-69 ans	229	93	136	34	46	59	90
	70-74 ans	238	109	129	27	41	82	88
	50-74 ans	1 623	798	825	437	382	361	443
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 967	7 499	9 468	5 529	6 513	1 970	2 955
	55-59 ans	12 719	5 558	7 161	1 644	1 812	3 914	5 349
	60-64 ans	11 197	4 907	6 290	1 304	1 422	3 603	4 868
	65-69 ans	6 963	3 218	3 745	775	775	2 443	2 970

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3 995	1 893	2 102	376	408	1 517	1 694
	50-74 ans	51 841	23 075	28 766	9 628	10 930	13 447	17 836
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	576	297	279	219	221	78	58
	55-59 ans	436	215	221	74	63	141	158
	60-64 ans	439	247	192	80	64	167	128
	65-69 ans	388	212	176	62	50	150	126
	70-74 ans	255	135	120	24	36	111	84
	50-74 ans	2 094	1 106	988	459	434	647	554
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	570	294	276	218	219	76	57
	55-59 ans	432	213	219	72	63	141	156
	60-64 ans	436	245	191	80	63	165	128
	65-69 ans	384	211	173	62	49	149	124
	70-74 ans	249	133	116	24	36	109	80
	50-74 ans	2 071	1 096	975	456	430	640	545
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	493	253	240	184	189	69	51
	55-59 ans	397	197	200	65	54	132	146
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	350	192	158	55	42	137	116
	70-74 ans	226	121	105	22	32	99	73
	50-74 ans	1 868	989	879	397	373	592	506
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	483	247	236	179	186	68	50
	55-59 ans	393	194	199	64	54	130	145
	60-64 ans	395	221	174	71	55	150	119
	65-69 ans	336	184	152	50	40	134	112
	70-74 ans	219	119	100	21	30	98	70
	50-74 ans	1 826	965	861	385	365	580	496
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	491	252	239	184	189	68	50
	55-59 ans	396	197	199	65	54	132	145
	60-64 ans	400	225	175	71	56	154	119
	65-69 ans	348	191	157	55	42	136	115
	70-74 ans	225	121	104	22	32	99	72
	50-74 ans	1 860	986	874	397	373	589	501
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,7	6,0	7,1	6,2	5,4	5,4
	55-59 ans	6,2	6,9	5,7	8,7	6,8	6,1	5,3
	60-64 ans	6,8	7,4	6,3	8,8	7,3	6,8	6,0
	65-69 ans	8,1	8,1	8,1	9,1	11,1	7,7	7,3
	70-74 ans	11,5	11,3	11,7	13,4	15,6	10,8	10,7
	50-74 ans	7,0	7,5	6,7	8,1	7,2	7,0	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,5	3,9	2,8	2,2	1,9
	55-59 ans	2,7	3,2	2,3	5,5	3,2	2,3	1,9
	60-64 ans	2,5	2,7	2,4	4,0	3,5	2,3	2,1
	65-69 ans	3,2	2,8	3,5	4,2	5,6	2,4	2,9
	70-74 ans	5,6	5,4	5,8	6,7	9,1	5,1	4,9
	50-74 ans	3,0	3,3	2,8	4,3	3,4	2,6	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,2	47,6	58,3	44,8	55,5	58,3	65,2
	55-59 ans	57,0	53,3	60,5	37,5	53,9	63,0	63,4
	60-64 ans	62,6	62,9	62,3	55,0	52,8	66,7	65,8
	65-69 ans	60,7	65,2	56,8	54,1	49,5	69,4	59,8
	70-74 ans	51,1	51,8	50,6	50,0	41,4	52,3	53,9
	50-74 ans	56,9	55,2	58,3	46,1	53,0	62,8	62,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,0	2,9	4,0	3,4	4,0	2,0
	55-59 ans	3,4	3,9	3,1	4,5	3,5	3,6	3,0
	60-64 ans	3,9	5,0	3,1	6,1	4,5	4,6	2,6
	65-69 ans	5,6	6,6	4,7	8,0	6,5	6,1	4,2
	70-74 ans	6,4	7,1	5,7	6,4	8,8	7,3	5,0
	50-74 ans	4,0	4,8	3,4	4,8	4,0	4,8	3,1
50-74 ans **	4,3	5,0	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,0	98,9	99,5	99,1	97,4	98,3
	55-59 ans	99,1	99,1	99,1	97,3	100,0	100,0	98,7