

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome | 50-54 ans | 196 | 123 | 73 | 87 | 54 | 36 | 19 |
| | 55-59 ans | 233 | 161 | 72 | 52 | 15 | 109 | 57 |
| | 60-64 ans | 399 | 240 | 159 | 64 | 36 | 176 | 123 |
| | 65-69 ans | 443 | 308 | 135 | 66 | 24 | 242 | 111 |
| | 70-74 ans | 385 | 247 | 138 | 41 | 15 | 206 | 123 |
| | 50-74 ans | 1 656 | 1 079 | 577 | 310 | 144 | 769 | 433 |
| A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu | 50-54 ans | 40 | 23 | 17 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| | 55-59 ans | 51 | 36 | 15 | 12 | 2 | 24 | 13 |
| | 60-64 ans | 76 | 39 | 37 | 12 | 9 | 27 | 28 |
| | 65-69 ans | 85 | 59 | 26 | 13 | 8 | 46 | 18 |
| | 70-74 ans | 75 | 42 | 33 | 6 | 1 | 36 | 32 |
| | 50-74 ans | 327 | 199 | 128 | 60 | 31 | 139 | 97 |
| A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus) | 50-54 ans | 156 | 100 | 56 | 70 | 43 | 30 | 13 |
| | 55-59 ans | 182 | 125 | 57 | 40 | 13 | 85 | 44 |
| | 60-64 ans | 323 | 201 | 122 | 52 | 27 | 149 | 95 |
| | 65-69 ans | 358 | 249 | 109 | 53 | 16 | 196 | 93 |
| | 70-74 ans | 310 | 205 | 105 | 35 | 14 | 170 | 91 |
| | 50-74 ans | 1 329 | 880 | 449 | 250 | 113 | 630 | 336 |
| A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif | 50-54 ans | 101 | 59 | 42 | 41 | 31 | 18 | 11 |
| | 55-59 ans | 117 | 80 | 37 | 28 | 5 | 52 | 32 |
| | 60-64 ans | 214 | 128 | 86 | 38 | 22 | 90 | 64 |
| | 65-69 ans | 257 | 170 | 87 | 32 | 14 | 138 | 73 |
| | 70-74 ans | 228 | 145 | 83 | 28 | 10 | 117 | 73 |
| | 50-74 ans | 917 | 582 | 335 | 167 | 82 | 415 | 253 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 55 | 41 | 14 | 29 | 12 | 12 | 2 |
| | 55-59 ans | 65 | 45 | 20 | 12 | 8 | 33 | 12 |
| | 60-64 ans | 109 | 73 | 36 | 14 | 5 | 59 | 31 |
| | 65-69 ans | 101 | 79 | 22 | 21 | 2 | 58 | 20 |
| | 70-74 ans | 82 | 60 | 22 | 7 | 4 | 53 | 18 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 412 | 298 | 114 | 83 | 31 | 215 | 83 |
| A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 46 | 33 | 13 | 22 | 9 | 11 | 4 |
| | 55-59 ans | 56 | 35 | 21 | 14 | 3 | 21 | 18 |
| | 60-64 ans | 95 | 53 | 42 | 12 | 9 | 41 | 33 |
| | 65-69 ans | 119 | 90 | 29 | 18 | 5 | 72 | 24 |
| | 70-74 ans | 107 | 78 | 29 | 14 | 2 | 64 | 27 |
| | 50-74 ans | 423 | 289 | 134 | 80 | 28 | 209 | 106 |
| A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 19 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 28 | 20 | 8 | 6 | 1 | 14 | 7 |
| | 60-64 ans | 54 | 31 | 23 | 11 | 7 | 20 | 16 |
| | 65-69 ans | 42 | 26 | 16 | 6 | 3 | 20 | 13 |
| | 70-74 ans | 58 | 27 | 31 | 6 | 6 | 21 | 25 |
| | 50-74 ans | 201 | 113 | 88 | 35 | 24 | 78 | 64 |
| A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 27 | 12 | 15 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 27 | 19 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 |
| | 60-64 ans | 46 | 32 | 14 | 9 | 3 | 23 | 11 |
| | 65-69 ans | 71 | 39 | 32 | 5 | 3 | 34 | 29 |
| | 70-74 ans | 43 | 26 | 17 | 5 | 1 | 21 | 16 |
| | 50-74 ans | 214 | 128 | 86 | 31 | 20 | 97 | 66 |
| A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| | 65-69 ans | 25 | 15 | 10 | 3 | 3 | 12 | 7 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| | 50-74 ans | 79 | 52 | 27 | 21 | 10 | 31 | 17 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 20,4 | 18,7 | 23,3 | 19,5 | 20,4 | 16,7 | 31,6 |
| | 55-59 ans | 21,9 | 22,4 | 20,8 | 23,1 | 13,3 | 22,0 | 22,8 |
| | 60-64 ans | 19,0 | 16,3 | 23,3 | 18,8 | 25,0 | 15,3 | 22,8 |
| | 65-69 ans | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 33,3 | 19,0 | 16,2 |
| | 70-74 ans | 19,5 | 17,0 | 23,9 | 14,6 | 6,7 | 17,5 | 26,0 |
| | 50-74 ans | 19,7 | 18,4 | 22,2 | 19,4 | 21,5 | 18,1 | 22,4 |
| E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 35,3 | 41,0 | 25,0 | 41,4 | 27,9 | 40,0 | 15,4 |
| | 55-59 ans | 35,7 | 36,0 | 35,1 | 30,0 | 61,5 | 38,8 | 27,3 |
| | 60-64 ans | 33,7 | 36,3 | 29,5 | 26,9 | 18,5 | 39,6 | 32,6 |
| | 65-69 ans | 28,2 | 31,7 | 20,2 | 39,6 | 12,5 | 29,6 | 21,5 |
| | 70-74 ans | 26,5 | 29,3 | 21,0 | 20,0 | 28,6 | 31,2 | 19,8 |
| | 50-74 ans | 31,0 | 33,9 | 25,4 | 33,2 | 27,4 | 34,1 | 24,7 |
| E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 64,7 | 59,0 | 75,0 | 58,6 | 72,1 | 60,0 | 84,6 |
| | 55-59 ans | 64,3 | 64,0 | 64,9 | 70,0 | 38,5 | 61,2 | 72,7 |
| | 60-64 ans | 66,3 | 63,7 | 70,5 | 73,1 | 81,5 | 60,4 | 67,4 |
| | 65-69 ans | 71,8 | 68,3 | 79,8 | 60,4 | 87,5 | 70,4 | 78,5 |
| | 70-74 ans | 73,5 | 70,7 | 79,0 | 80,0 | 71,4 | 68,8 | 80,2 |
| | 50-74 ans | 69,0 | 66,1 | 74,6 | 66,8 | 72,6 | 65,9 | 75,3 |
| E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 45,5 | 55,9 | 31,0 | 53,7 | 29,0 | 61,1 | 36,4 |
| | 55-59 ans | 47,9 | 43,8 | 56,8 | 50,0 | 60,0 | 40,4 | 56,3 |
| | 60-64 ans | 44,4 | 41,4 | 48,8 | 31,6 | 40,9 | 45,6 | 51,6 |
| | 65-69 ans | 46,3 | 52,9 | 33,3 | 56,3 | 35,7 | 52,2 | 32,9 |
| | 70-74 ans | 46,9 | 53,8 | 34,9 | 50,0 | 20,0 | 54,7 | 37,0 |
| | 50-74 ans | 46,1 | 49,7 | 40,0 | 47,9 | 34,1 | 50,4 | 41,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : GRAND EST (Code région : 44)

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 18,8 | 15,3 | 23,8 | 14,6 | 22,6 | 16,7 | 27,3 |
| | 55-59 ans | 23,9 | 25,0 | 21,6 | 21,4 | 20,0 | 26,9 | 21,9 |
| | 60-64 ans | 25,2 | 24,2 | 26,7 | 28,9 | 31,8 | 22,2 | 25,0 |
| | 65-69 ans | 16,3 | 15,3 | 18,4 | 18,8 | 21,4 | 14,5 | 17,8 |
| | 70-74 ans | 25,4 | 18,6 | 37,3 | 21,4 | 60,0 | 17,9 | 34,2 |
| | 50-74 ans | 21,9 | 19,4 | 26,3 | 21,0 | 29,3 | 18,8 | 25,3 |
| E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 26,7 | 20,3 | 35,7 | 19,5 | 38,7 | 22,2 | 27,3 |
| | 55-59 ans | 23,1 | 23,8 | 21,6 | 14,3 | 20,0 | 28,8 | 21,9 |
| | 60-64 ans | 21,5 | 25,0 | 16,3 | 23,7 | 13,6 | 25,6 | 17,2 |
| | 65-69 ans | 27,6 | 22,9 | 36,8 | 15,6 | 21,4 | 24,6 | 39,7 |
| | 70-74 ans | 18,9 | 17,9 | 20,5 | 17,9 | 10,0 | 17,9 | 21,9 |
| | 50-74 ans | 23,3 | 22,0 | 25,7 | 18,6 | 24,4 | 23,4 | 26,1 |
| E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 8,9 | 8,5 | 9,5 | 12,2 | 9,7 | 0,0 | 9,1 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 7,5 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 8,9 | 9,4 | 8,1 | 15,8 | 13,6 | 6,7 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 9,7 | 8,8 | 11,5 | 9,4 | 21,4 | 8,7 | 9,6 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 9,7 | 7,2 | 10,7 | 10,0 | 9,4 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 8,6 | 8,9 | 8,1 | 12,6 | 12,2 | 7,5 | 6,7 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire