

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/4

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome | 50-54 ans | 21 | 7 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| | 55-59 ans | 22 | 13 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| | 60-64 ans | 34 | 11 | 23 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| | 65-69 ans | 19 | 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| | 70-74 ans | 22 | 17 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 |
| | 50-74 ans | 118 | 56 | 62 | 17 | 21 | 39 | 41 |
| A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus) | 50-54 ans | 18 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| | 60-64 ans | 31 | 11 | 20 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| | 65-69 ans | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| | 70-74 ans | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| | 50-74 ans | 103 | 49 | 54 | 13 | 16 | 36 | 38 |
| A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif | 50-54 ans | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 17 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 60 | 31 | 29 | 9 | 12 | 22 | 17 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 14 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 43 | 18 | 25 | 4 | 4 | 14 | 21 |
| A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| | 50-74 ans | 28 | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 |
| A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 14,3 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 13,6 | 7,7 | 22,2 | 33,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 7,7 |
| | 65-69 ans | 15,8 | 12,5 | 18,2 | 0,0 | 100,0 | 14,3 | 10,0 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 11,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,0 |
| | 50-74 ans | 12,7 | 12,5 | 12,9 | 23,5 | 23,8 | 7,7 | 7,3 |
| E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 33,3 | 25,0 | 35,7 | 33,3 | 14,3 | 0,0 | 57,1 |
| | 55-59 ans | 42,1 | 33,3 | 57,1 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 57,1 |
| | 60-64 ans | 45,2 | 36,4 | 50,0 | 0,0 | 37,5 | 44,4 | 58,3 |
| | 65-69 ans | 62,5 | 71,4 | 55,6 | 100,0 | 0,0 | 66,7 | 55,6 |
| | 70-74 ans | 26,3 | 26,7 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 33,3 |
| | 50-74 ans | 41,7 | 36,7 | 46,3 | 30,8 | 25,0 | 38,9 | 55,3 |
| E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 66,7 | 75,0 | 64,3 | 66,7 | 85,7 | 100,0 | 42,9 |
| | 55-59 ans | 57,9 | 66,7 | 42,9 | 50,0 | 0,0 | 70,0 | 42,9 |
| | 60-64 ans | 54,8 | 63,6 | 50,0 | 100,0 | 62,5 | 55,6 | 41,7 |
| | 65-69 ans | 37,5 | 28,6 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 44,4 |
| | 70-74 ans | 73,7 | 73,3 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 70,0 | 66,7 |
| | 50-74 ans | 58,3 | 63,3 | 53,7 | 69,2 | 75,0 | 61,1 | 44,7 |
| E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 27,3 | 37,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 41,2 | 42,9 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 63,6 | 33,3 | 75,0 | 100,0 | 57,1 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 46,7 | 51,6 | 41,4 | 66,7 | 58,3 | 45,5 | 29,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 16,7 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 18,2 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 11,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| | 65-69 ans | 50,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 18,2 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 18,3 | 12,9 | 24,1 | 11,1 | 25,0 | 13,6 | 23,5 |
| E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 8,3 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 45,5 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 41,2 | 42,9 | 40,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 50,0 |
| | 50-74 ans | 26,7 | 22,6 | 31,0 | 11,1 | 16,7 | 27,3 | 41,2 |
| E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 8,3 | 33,3 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 9,1 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 50,0 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 12,9 | 3,4 | 11,1 | 0,0 | 13,6 | 5,9 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire