

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/4

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	115	76	39	56	29	20	10
	55-59 ans	141	95	46	32	11	63	35
	60-64 ans	198	128	70	36	15	92	55
	65-69 ans	310	214	96	56	25	158	71
	70-74 ans	241	165	76	33	13	132	63
	50-74 ans	1 005	678	327	213	93	465	234
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	36	29	7	20	7	9	0
	55-59 ans	48	37	11	13	1	24	10
	60-64 ans	51	36	15	9	3	27	12
	65-69 ans	88	63	25	16	7	47	18
	70-74 ans	65	48	17	10	2	38	15
	50-74 ans	288	213	75	68	20	145	55
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	79	47	32	36	22	11	10
	55-59 ans	93	58	35	19	10	39	25
	60-64 ans	147	92	55	27	12	65	43
	65-69 ans	222	151	71	40	18	111	53
	70-74 ans	176	117	59	23	11	94	48
	50-74 ans	717	465	252	145	73	320	179
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	60	33	27	24	19	9	8
	55-59 ans	68	44	24	13	9	31	15
	60-64 ans	107	62	45	16	10	46	35
	65-69 ans	173	116	57	35	16	81	41
	70-74 ans	150	96	54	17	10	79	44
	50-74 ans	558	351	207	105	64	246	143
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	19	14	5	12	3	2	2
	55-59 ans	25	14	11	6	1	8	10
	60-64 ans	40	30	10	11	2	19	8
	65-69 ans	49	35	14	5	2	30	12
	70-74 ans	26	21	5	6	1	15	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	159	114	45	40	9	74	36
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	24	14	10	12	7	2	3
	55-59 ans	33	23	10	5	4	18	6
	60-64 ans	42	25	17	5	4	20	13
	65-69 ans	71	47	24	14	5	33	19
	70-74 ans	50	33	17	5	4	28	13
	50-74 ans	220	142	78	41	24	101	54
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	16	8	8	7	7	1	1
	55-59 ans	14	7	7	2	2	5	5
	60-64 ans	20	9	11	3	3	6	8
	65-69 ans	43	31	12	10	4	21	8
	70-74 ans	45	26	19	4	1	22	18
	50-74 ans	138	81	57	26	17	55	40
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	12	7	5	3	2	4	3
	55-59 ans	17	12	5	4	2	8	3
	60-64 ans	30	17	13	4	3	13	10
	65-69 ans	44	28	16	8	6	20	10
	70-74 ans	37	24	13	5	2	19	11
	50-74 ans	140	88	52	24	15	64	37
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	18	13	5	3	3	10	2
	50-74 ans	60	40	20	14	8	26	12

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	31,3	38,2	17,9	35,7	24,1	45,0	0,0
	55-59 ans	34,0	38,9	23,9	40,6	9,1	38,1	28,6
	60-64 ans	25,8	28,1	21,4	25,0	20,0	29,3	21,8
	65-69 ans	28,4	29,4	26,0	28,6	28,0	29,7	25,4
	70-74 ans	27,0	29,1	22,4	30,3	15,4	28,8	23,8
	50-74 ans	28,7	31,4	22,9	31,9	21,5	31,2	23,5
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	24,1	29,8	15,6	33,3	13,6	18,2	20,0
	55-59 ans	26,9	24,1	31,4	31,6	10,0	20,5	40,0
	60-64 ans	27,2	32,6	18,2	40,7	16,7	29,2	18,6
	65-69 ans	22,1	23,2	19,7	12,5	11,1	27,0	22,6
	70-74 ans	14,8	17,9	8,5	26,1	9,1	16,0	8,3
	50-74 ans	22,2	24,5	17,9	27,6	12,3	23,1	20,1
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	75,9	70,2	84,4	66,7	86,4	81,8	80,0
	55-59 ans	73,1	75,9	68,6	68,4	90,0	79,5	60,0
	60-64 ans	72,8	67,4	81,8	59,3	83,3	70,8	81,4
	65-69 ans	77,9	76,8	80,3	87,5	88,9	73,0	77,4
	70-74 ans	85,2	82,1	91,5	73,9	90,9	84,0	91,7
	50-74 ans	77,8	75,5	82,1	72,4	87,7	76,9	79,9
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	40,0	42,4	37,0	50,0	36,8	22,2	37,5
	55-59 ans	48,5	52,3	41,7	38,5	44,4	58,1	40,0
	60-64 ans	39,3	40,3	37,8	31,3	40,0	43,5	37,1
	65-69 ans	41,0	40,5	42,1	40,0	31,3	40,7	46,3
	70-74 ans	33,3	34,4	31,5	29,4	40,0	35,4	29,5
	50-74 ans	39,4	40,5	37,7	39,0	37,5	41,1	37,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,7	24,2	29,6	29,2	36,8	11,1	12,5
	55-59 ans	20,6	15,9	29,2	15,4	22,2	16,1	33,3
	60-64 ans	18,7	14,5	24,4	18,8	30,0	13,0	22,9
	65-69 ans	24,9	26,7	21,1	28,6	25,0	25,9	19,5
	70-74 ans	30,0	27,1	35,2	23,5	10,0	27,8	40,9
	50-74 ans	24,7	23,1	27,5	24,8	26,6	22,4	28,0
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20,0	21,2	18,5	12,5	10,5	44,4	37,5
	55-59 ans	25,0	27,3	20,8	30,8	22,2	25,8	20,0
	60-64 ans	28,0	27,4	28,9	25,0	30,0	28,3	28,6
	65-69 ans	25,4	24,1	28,1	22,9	37,5	24,7	24,4
	70-74 ans	24,7	25,0	24,1	29,4	20,0	24,1	25,0
	50-74 ans	25,1	25,1	25,1	22,9	23,4	26,0	25,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,3	12,1	14,8	8,3	15,8	22,2	12,5
	55-59 ans	5,9	4,5	8,3	15,4	11,1	0,0	6,7
	60-64 ans	14,0	17,7	8,9	25,0	0,0	15,2	11,4
	65-69 ans	8,7	8,6	8,8	8,6	6,3	8,6	9,8
	70-74 ans	12,0	13,5	9,3	17,6	30,0	12,7	4,5
	50-74 ans	10,8	11,4	9,7	13,3	12,5	10,6	8,4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire