

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Délai de prise en charge des patients nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007 - Patients sans PBH antérieure et sans traitement antérieur pour lesquels l'année de découverte de la sérologie VHC est connue (délai entre l'année de prise en charge (n) et l'année de la découverte de la sérologie VHC positive)

	2001 N= 2345 (%)	2002 N= 2273 (%)	2003 N= 2191 (%)	2004 N= 2116 (%)	2005 N= 1873 (%)	2006 N= 1793 (%)	2007 N= 1478 (%)	Total (%)
année (n)	47,3	45,6	43,4	44,9	40,7	38,8	38,8	43,2
année (n-1)	19,3	18,2	22,4	20,5	19,1	17,6	18,5	19,4
année (n-2 et n-3)	9,4	9,8	8,7	8,5	10,2	8,6	9,8	9,2
Avant année (n-3)	24,0	26,4	25,5	26,1	30,0	35,0	32,9	28,1

Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

L'année de découverte de la sérologie VHC est connue pour 70% des patients sans prise en charge antérieure.