


Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des génotypes en fonction du ou des expositions à risque - Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007




Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

- (a) transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) utilisation de drogues IV ou drogues nasales : consommation actuelle ou dans le passé
- (c) exposition nosocomiale (chirurgie, endoscopie, dialyse, etc..) et exposition professionnelle
- (d) conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, tatouage, piercing, injections diverses, etc..

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des génotypes en fonction du ou des expositions à risque - Patients virémiques nouvellement pris en charge par les pôles de référence 2001-2007



Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

- (a) transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) utilisation de drogues IV ou drogues nasales : consommation actuelle ou dans le passé
- (c) exposition nosocomiale (chirurgie, endoscopie, dialyse, etc..) et exposition professionnelle
- (d) conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, tatouage, piercing, injections diverses, etc..