


Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition par sexe des expositions à risque des patients nouvellement pris en charge pour une hépatite C au sein des pôles de référence 2001 (N=3336) / 2004 (N=2791) et 2007 (N=2423) - Données 2001-2007



- (a) transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) utilisation de drogues IV ou drogues nasales : consommation actuelle ou passée
- (c) Chirurgies, endoscopies, dialyse, etc.
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing, etc.

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risques des patients nouvellement pris en charge pour une hépatite C au sein des pôles de référence 2001-2007 : chez les hommes

	2001 N= 1870		2002 N= 1924		2003 N= 1770		2004 N= 1563		2005 N= 1454		2006 N= 1475		2007 N= 1367	
	n	(%)												
Transfusion (a)	427	23,4	437	23,4	332	19,8	316	21,1	258	18,5	278	19,8	229	17,8
Drogues IV (b) (intraveineuse)	842	46,1	855	45,6	806	47,5	714	47,2	654	46,8	568	40,4	516	39,6
Drogues nasales (b)	279	16,0	193	10,8	252	15,6	218	15,2	223	16,8	160	13,7	147	11,9
Exposition professionnelle	32	1,9	15	0,9	14	0,9	20	1,3	10	0,7	14	1,1	15	1,2
Exposition nosocomiale (c)	303	16,5	300	15,8	236	13,8	238	15,7	203	14,5	201	16,2	117	10,0
Autre facteur (d)	269	14,6	239	12,6	275	16,1	249	16,4	282	20,0	253	17,9	182	14,1
Aucun facteur retrouvé	258	14,0	285	15,0	287	16,7	236	15,5	194	14,4	233	17,1	225	17,6

Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007 - Total > 100% ; car possibilité de plus d'une exposition.

- (a) transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) utilisation de drogues IV ou drogues nasales : consommation actuelle ou passée
- (c) Chirurgies, endoscopies, dialyse, etc.
- (d) Conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing, etc.

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des expositions à risques des patients nouvellement pris en charge pour une hépatite C au sein des pôles de référence 2001-2007 : chez les femmes

	2001 N= 1464		2002 N= 1521		2003 N= 1392		2004 N= 1228		2005 N= 1035		2006 N= 1070		2007 N= 1056	
	n	(%)												
Transfusion (a)	552	38,9	579	39,0	537	39,7	430	36,2	356	35,5	350	34,2	331	33,2
Drogues IV (b) (intraveineuse)	291	20,7	300	20,3	234	17,3	219	18,6	185	18,7	174	17,2	165	16,6
Drogues nasales (b)	81	6,0	62	4,3	72	5,5	65	5,8	61	6,4	56	6,6	46	4,8
Exposition professionnelle	70	5,3	46	3,5	50	4,1	47	4,0	30	3,1	39	4,1	25	2,6
Exposition nosocomiale (c)	318	22,3	291	19,4	290	21,1	309	25,8	226	22,3	170	18,9	134	14,8
Autre facteur (d)	196	13,8	197	13,2	224	16,3	234	19,5	220	21,7	206	20,0	165	16,6
Aucun facteur retrouvé	224	15,5	285	18,9	251	18,2	193	16,0	192	19,9	194	19,9	194	19,9

Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007 - Total > 100% ; car possibilité de plus d'une exposition

- (a) transfusion de sang ou dérivés sanguins avant 1991
- (b) utilisation de drogues IV ou drogues nasales : consommation actuelle ou passée
- (c) chirurgies, endoscopies, dialyse, etc.
- (d) conjoint VHC, entourage VHC, acupuncture, injections diverses, tatouages, piercing, etc.