

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Répartition des stades histologiques (Classification Métavir) - Patients nouvellement pris en charge pour une hépatite C au sein des pôles de référence - Données 2001-2007

Stade histologique	2001 N= 3336		2002 N= 3445		2003 N= 3162		2004 N= 2791		2005 N= 2489		2006 N= 2545		2007 N= 2423	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Variable renseignée	3131	93,9	3216	93,4	3027	95,7	2701	96,8	2132	85,7	2427	95,4	2281	94,1
Biopsie réalisée	1526	48,7	1281	39,8	1066	35,2	880	32,6	659	30,9	523	21,6	359	15,7
Biopsie réalisée et stade histologique renseigné	1475	96,7	1234	96,3	1037	97,3	857	97,4	632	95,9	490	93,7	340	94,7
Stade Histologique	2001 (n=1475)		2002 (n=1234)		2003 (n=1037)		2004 (n=857)		2005 (n=632)		2006 (n=490)		2007 (n=340)	
Hépatite minime	551	37,4	424	34,4	389	37,5	348	40,6	244	38,6	154	31,4	100	29,4
Hépatite modérée/sévère	753	51,1	686	55,6	513	49,5	416	48,5	301	47,6	255	52,0	177	52,1
Cirrhose	171	11,6	124	10,0	135	13,0	93	10,9	87	13,8	81	16,5	63	18,5

Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Le stade de la maladie a été classé selon les résultats du score histologique de Métavir qui prend en compte l'activité nécrotico-inflammatoire (côtée de 0 à 3) et son retentissement fibreux (côté de 0 à 4) :

- hépatite C chronique minime : Métavir \leq A1F1
- hépatite C chronique modérée ou sévère sans cirrhose : Métavir $A \geq 2$ ou F2,F3 quelque soit A
- hépatite C chronique avec cirrhose : Métavir F4