

Surveillance nationale de l'hépatite C à partir des pôles de référence

Données épidémiologiques 2001-2007

Stade clinique des patients nouvellement pris en charge pour une hépatite C au sein des pôles de référence - Données 2001-2007

	2001 N= 3336		2002 N= 3445		2003 N= 3162		2004 N= 2791		2005 N= 2489		2006 N= 2545		2007 N= 2423	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Stade Renseigné	2901	87,0	2990	86,8	2809	88,8	2599	93,1	2278	91,5	2409	94,7	2166	89,4
Alat normales	498	17,2	672	22,5	790	28,1	405	15,6	359	15,8	324	13,4	346	16,0
Hépatite Chronique	2075	71,5	1960	65,6	1714	61,0	1657	63,8	1407	61,8	1545	64,1	1354	62,5
Cirrhose	253	8,7	263	8,8	246	8,8	216	8,3	217	9,5	257	10,7	202	9,3
Cirrhose décompensée	43	1,5	49	1,6	23	0,8	49	1,9	48	2,1	41	1,7	26	1,2
Carcinome hépatocellulaire	19	0,7	33	1,1	23	0,8	26	1,0	36	1,6	26	1,1	46	2,1
Hépatite aiguë	13	0,4	13	0,4	13	0,5	20	0,8	20	0,9	14	0,6	9	0,4
Guérison	-		-		-		226	8,7	191	8,4	202	8,4	183	8,4

Note : données recueillies par les 23 pôles ayant participé en continu de 2001 à 2007

Le stade de la maladie à la prise en charge est basée sur une classification « clinique-biologique-morphologique » élaborée par les hépatologues du comité de pilotage (**ALAT « normales »** : activité sérique des ALAT normale à plusieurs reprises ; **hépatite C chronique** : absence d'argument clinique biologique ou d'imagerie en faveur d'une cirrhose ou d'un carcinome hépato-cellulaire, activité sérique des ALAT supérieure à la normale ; **cirrhose** : cirrhose décompensée ou non sur la base de critères cliniques, biologiques et d'imagerie ; **carcinome hépato-cellulaire** : critères cliniques, biologiques et d'imagerie) ; **guérison** (mention ajoutée en 2004, ARN VHC négatif)).

L'utilisation d'un critère reposant sur la clinique, des examens biologiques et morphologiques permet de disposer d'un stade d'évolution à la prise en charge pour une proportion importante de patients. La stabilité de cette proportion sur les 7 années en fait un indicateur fiable de suivi ; il n'est pas affecté par des changements de pratiques contrairement à la classification basée sur l'histologie.

En 2001 et 2007, le stade clinique était respectivement renseigné pour 87% et 90% des patients.

Pour plus d'information sur la cirrhose et le carcinome hépato-cellulaire, vous pouvez consulter le site de la fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites : [http:// www.fnprh.com](http://www.fnprh.com)