

Caractéristiques des cas d'infection à *Chlamydia trachomatis*, de gonococcie et de syphilis récente diagnostiqués dans les CeGIDD, France, 2023

Caractéristiques des cas	Chlamydirose (N=19 122) %	Gonococcie (N=10 723) %	Syphilis récente (N=2 536) %
Type de CeGIDD*			
Hospitalier	65,13%	64,29%	69,32%
Non hospitalier	34,87%	35,71%	30,68%
Genre			
Hommes cis	63,0%	84,1%	85,6%
Femmes cis	36,7%	15,1%	12,6%
Personnes trans	0,3%	0,7%	1,8%
<i>Données manquantes</i>	0,4%	0,4%	0,5%
Age médian			
Tous	24	28	34
Hommes cis	26	29	35
Femmes cis	21	22	25
Personnes trans	28	30	29,5
<i>Données manquantes</i>	0,1%	0,0%	0,0%
Classe d'âge			
< 26 ans	61,2%	40,2%	24,0%
26-49 ans	33,9%	51,1%	58,9%
≥50 ans	4,9%	8,7%	17,1%
<i>Données manquantes</i>	0,1%	0,0%	0,0%
Lieu de naissance			
France	80,5%	77,3%	73,7%
Etranger	19,5%	22,7%	26,3%
Afrique subsaharienne	5,5%	4,2%	4,9%
Amérique	7,4%	9,4%	13,2%
Europe (hors France)	2,9%	1,2%	1,7%
Autres	3,9%	5,6%	4,0%
<i>Données manquantes</i>	17,1%	13,9%	15,6%
Pratiques sexuelles au cours des 12 derniers mois			
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	22,1%	60,5%	66,5%
Hommes hétérosexuels	38,8%	22,6%	20,8%
Femmes hétérosexuelles	37,2%	15,4%	11,7%
Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes	1,9%	1,5%	1,1%
<i>Données manquantes</i>	39,7%	48,6%	54,3%
Au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois*			
Oui	82,3%	88,4%	83,2%
Non	17,7%	11,6%	16,9%
<i>Données manquantes</i>	43,6%	53,3%	61,4%
Signes cliniques d'IST lors de la consultation			
Oui	20,5%	32,5%	29,4%
Non	79,5%	67,5%	70,6%
<i>Données manquantes</i>	19,6%	24,3%	21,8%
Antécédent d'IST bactérienne au cours des 12 derniers mois			
Oui	20,0%	36,8%	41,4%
Non	80,0%	63,2%	58,6%
<i>Données manquantes</i>	39,6%	50,6%	53,0%
Découverte concomitante de séropositivité VIH			
Oui	0,4%	0,8%	2,3%
Non	99,6%	99,2%	97,7%
<i>Données manquantes</i>	11,4%	15,8%	23,4%

Les pourcentages sont calculés sans prise en compte des données manquantes.

Source : SurCeGIDD, Santé publique France, données du 31/12/2023,