

## Bilan de l'activité bronchiolite par classe d'âge. Description des données chez les moins de 1 an

Données du réseau Oscour - Données du 30 janvier 2024

**Synthèse :** en semaine 04, l'activité liée à la bronchiolite était en diminution ou se stabilisait à des niveaux bas dans toutes les classes d'âge (moins de 1 mois, 1 à 2 mois, 3 à 5 mois, 6 à 11 mois et 12 à 23 mois).


En comparaison aux données des saisons 2015-2016 à 2022-2023, les activités liées à la bronchiolite chez les moins de 1 mois et les 1 à 2 mois, au cours de l'épidémie, sont restées inférieures à celles des saisons avant l'émergence de la Covid-19. Les activités dans ces classes d'âge sont restées proches ou légèrement inférieures de celles de la saison 2021-2022 et inférieures à celles de la saison 2022-2023.

Les activités chez les 3 à 5 mois et les 6 à 11 mois, au cours de l'épidémie, sont globalement restées supérieures à celles des saisons avant l'émergence de la Covid-19 et se sont rapprochées des activités observées lors de la saison 2022-2023 en termes de nombres et de parts de la bronchiolite parmi les passages aux urgences et hospitalisation après passage tout en y restant inférieures. Les taux d'hospitalisation après passage aux urgences sont restés dans les valeurs des données des saisons avant l'émergence de la Covid-19.


Chez les 12 à 24 mois, les activités sont restées comparables aux données historiques quels que soient les indicateurs.

Les différences en termes d'impact de l'épidémie de bronchiolite sur les recours aux urgences et hospitalisations après passages aux urgences observées entre les nourrissons de moins de 3 mois et les nourrissons de 3 à 11 mois ne peuvent être de façon certaine mises en lien direct avec le déploiement du traitement Nirsevimab (Beyfortus) sur le territoire national, même si ce sont les plus jeunes nourrissons qui ont préférentiellement pu bénéficier du traitement à la maternité. Les données syndromiques du réseau Oscour ne permettent pas d'identifier les nourrissons ayant pu bénéficier de ce traitement préventif, ni d'identifier les nourrissons ayant une bronchiolite à VRS.


## Activité liée à la bronchiolite chez les moins de 1 mois




**Activité liée à la bronchiolite chez les 1 à 2 mois**



## Activité liée à la bronchiolite chez les 3 à 5 mois



**Activité liée à la bronchiolite chez les 6 à 11 mois**



## Activité liée à la bronchiolite chez les 12 à 24 mois

