

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés* des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, tous âges confondus, France, 2022

Région	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,22	[1,16-1,29]	1,17	[1,11-1,24]	1,20	[1,16-1,25]
Bourgogne-Franche-Comté	1,08	[0,99-1,18]	1,15	[1,04-1,26]	1,11	[1,04-1,19]
Bretagne	0,53	[0,47-0,59]	0,63	[0,56-0,70]	0,57	[0,53-0,62]
Centre-Val de Loire	0,72	[0,64-0,81]	0,74	[0,65-0,83]	0,73	[0,67-0,79]
Corse	1,54	[1,26-1,89]	1,79	[1,47-2,19]	1,66	[1,44-1,92]
Grand Est	1,16	[1,09-1,23]	1,21	[1,13-1,30]	1,18	[1,13-1,24]
Guadeloupe	0,88	[0,67-1,16]	0,72	[0,53-0,97]	0,78	[0,64-0,96]
Guyane	0,11	[0,04-0,27]	0,28	[0,14-0,58]	0,19	[0,11-0,34]
Hauts-de-France	1,13	[1,06-1,20]	1,16	[1,09-1,24]	1,15	[1,09-1,20]
Ile-de-France	0,59	[0,55-0,62]	0,61	[0,57-0,65]	0,60	[0,57-0,62]
La Réunion	0,67	[0,54-0,82]	0,57	[0,45-0,72]	0,62	[0,53-0,73]
Martinique	0,38	[0,25-0,59]	0,28	[0,17-0,46]	0,33	[0,24-0,46]
Normandie	0,94	[0,86-1,03]	1,02	[0,93-1,12]	0,98	[0,92-1,04]
Nouvelle-Aquitaine	1,53	[1,45-1,61]	1,47	[1,38-1,56]	1,50	[1,44-1,56]
Occitanie	1,23	[1,16-1,30]	1,17	[1,10-1,25]	1,21	[1,15-1,26]
Pays de la Loire	0,78	[0,72-0,86]	0,85	[0,78-0,94]	0,82	[0,77-0,87]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1,20	[1,13-1,28]	1,08	[1,01-1,16]	1,14	[1,09-1,20]

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé de la région sur le taux d'incidence standardisé national
 * Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)
 Exploitation Santé publique France - Juillet 2023