

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés* des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, 20 à 64 ans, France, 2022

Région	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,19	[1,13-1,26]	1,16	[1,09-1,23]	1,18	[1,13-1,23]
Bourgogne-Franche-Comté	1,09	[0,99-1,21]	1,12	[1,01-1,25]	1,11	[1,03-1,19]
Bretagne	0,53	[0,47-0,60]	0,64	[0,56-0,73]	0,58	[0,53-0,64]
Centre-Val de Loire	0,76	[0,67-0,85]	0,76	[0,66-0,87]	0,76	[0,69-0,83]
Corse	1,61	[1,29-2,00]	1,54	[1,21-1,96]	1,57	[1,34-1,85]
Grand Est	1,12	[1,05-1,20]	1,22	[1,13-1,31]	1,17	[1,11-1,23]
Guadeloupe	0,92	[0,69-1,25]	0,75	[0,54-1,04]	0,82	[0,66-1,03]
Guyane	0,13	[0,05-0,33]	0,25	[0,13-0,48]	0,19	[0,11-0,32]
Hauts-de-France	1,19	[1,12-1,27]	1,23	[1,14-1,32]	1,21	[1,15-1,27]
Ile-de-France	0,56	[0,53-0,60]	0,60	[0,56-0,64]	0,58	[0,55-0,61]
La Réunion	0,67	[0,53-0,83]	0,58	[0,45-0,74]	0,62	[0,53-0,73]
Martinique	0,37	[0,22-0,61]	0,27	[0,16-0,48]	0,32	[0,22-0,46]
Normandie	0,99	[0,90-1,09]	1,05	[0,95-1,16]	1,02	[0,95-1,09]
Nouvelle-Aquitaine	1,55	[1,46-1,64]	1,49	[1,40-1,59]	1,52	[1,46-1,59]
Occitanie	1,25	[1,17-1,33]	1,16	[1,08-1,25]	1,21	[1,15-1,27]
Pays de la Loire	0,84	[0,76-0,92]	0,91	[0,82-1,00]	0,87	[0,81-0,93]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1,19	[1,11-1,28]	1,06	[0,98-1,15]	1,13	[1,07-1,19]

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé de la région sur le taux d'incidence standardisé national

* Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)

Exploitation Santé publique France - Juillet 2023