

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, 20 à 64 ans, France, 2022

Région	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,13	[1,09-1,17]	1,06	[1,03-1,08]	1,08	[1,05-1,10]
Bourgogne-Franche-Comté	1,24	[1,17-1,31]	1,22	[1,17-1,27]	1,22	[1,18-1,26]
Bretagne	0,84	[0,79-0,89]	0,82	[0,79-0,86]	0,82	[0,79-0,85]
Centre-Val de Loire	1,30	[1,23-1,38]	1,28	[1,22-1,33]	1,28	[1,24-1,33]
Corse	0,61	[0,49-0,76]	0,63	[0,54-0,74]	0,62	[0,55-0,71]
Grand Est	1,32	[1,26-1,37]	1,34	[1,31-1,38]	1,33	[1,30-1,36]
Guadeloupe	0,29	[0,21-0,40]	0,55	[0,47-0,64]	0,49	[0,42-0,56]
Guyane	0,30	[0,20-0,46]	0,44	[0,35-0,56]	0,40	[0,33-0,49]
Hauts-de-France	1,10	[1,05-1,15]	1,19	[1,16-1,23]	1,16	[1,13-1,19]
Ile-de-France	0,59	[0,56-0,61]	0,69	[0,68-0,71]	0,66	[0,64-0,67]
La Réunion	0,19	[0,15-0,25]	0,22	[0,19-0,26]	0,22	[0,19-0,25]
Martinique	0,53	[0,42-0,68]	0,98	[0,87-1,10]	0,87	[0,78-0,97]
Normandie	1,33	[1,26-1,40]	1,41	[1,36-1,46]	1,38	[1,34-1,42]
Nouvelle-Aquitaine	1,14	[1,09-1,19]	1,04	[1,00-1,07]	1,07	[1,05-1,10]
Occitanie	0,94	[0,90-0,98]	0,85	[0,83-0,88]	0,88	[0,86-0,91]
Pays de la Loire	1,18	[1,13-1,24]	1,16	[1,12-1,21]	1,17	[1,13-1,20]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1,03	[0,98-1,08]	0,98	[0,95-1,01]	1,00	[0,97-1,03]

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé de la région sur le taux d'incidence standardisé national
 * Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)
 Exploitation Santé publique France - Juillet 2023